



નવસારી કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલય

ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા

કૃષિ હવામાનશાખા કેલ

કૃષિ ઈજનેરી વિભાગ, ન. મ. કૃષિ મઠાવિદાલય

નવસારી કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલય

નવસારી - ૩૬૯૪૫૦, ગુજરાત

E-મેઈલ:- aasnavsari@gmail.com



ભારત મૌસમ વિજ્ઞાન
વિભાગ

(નવસારી કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલય અને ભારત મૌસમ વિજ્ઞાન વિભાગ દ્વારા પ્રસારિત)

તા. ૧૧/૦૨/૨૦૨૫

કૃષિ હવામાન બુલેટીન નં : ૯૧/૨૦૨૪ - ૨૦૨૫

-- નવસારી જિલ્લો --

પાછળનાં સમયનું હવામાન (તા. ૦૭ ફેબ્રુઆરી થી ૧૧ ફેબ્રુઆરી - ૨૦૨૫)

અનું. નં.	હવામાન પરિબળો	Value
૧.	વરસાદની શ્રેણી (મી.મી.)	૦.૦
૨.	મહત્તમ તાપમાનની શ્રેણી (સે.ગ્રે.)	૩૧.૫-૩૫.૦
૩.	લઘુત્તમ તાપમાનની શ્રેણી (સે.ગ્રે.)	૧૩.૦-૧૬.૫
૪.	ભેજની શ્રેણી (%)	૨૬-૬૩
૫.	પવનની ગતિની શ્રેણી (કિ.મી./કલાક)	૧.૫-૬.૭
૬.	વાદળની સ્થિતિની શ્રેણી (ઓક્ટા)	૦-૩
૭.	સુર્જપ્રકાશિત સમયની શ્રેણી (કલાક)	૮.૧-૬.૦
૮.	પાછળના પાંચ દિવસમાં સંચિત વરસાદ (મી.મી.)	૦.૦
કુલ વરસાદ		૦.૦

આઈ. એમ. ડી. દ્વારા પ્રાપ્ત હવામાન આગાહી (તા. ૧૨ ફેબ્રુઆરી થી ૧૬ ફેબ્રુઆરી - ૨૦૨૫)

અનું. નં.	હવામાન પરિબળો	દિવસ-૧ (૧૨/૦૨)	દિવસ-૨ (૧૩/૦૨)	દિવસ-૩ (૧૪/૦૨)	દિવસ-૪ (૧૫/૦૨)	દિવસ-૫ (૧૬/૦૨)
૧.	વરસાદ (મી.મી.)	૦	૦	૦	૦	૦
૨.	મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૩૩	૩૩	૩૪	૩૫	૩૪
૩.	લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૧૯	૧૮	૧૬	૨૦	૧૬
૪.	મહત્તમ ભેજ (%)	૭૦	૭૦	૬૫	૬૫	૬૫
૫.	લઘુત્તમ ભેજ (%)	૬૦	૬૦	૫૫	૫૫	૫૫
૬.	પવનની ગતિ (કિ.મી./કલાક)	૫	૮	૬	૬	૮
૭.	પવનની દિશા (ક્રમપાસ પોઇન્ટ)	૪૮	૩૪	૩૮	૪૮	૫૬
૮.	વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટા)	૦	૦	૦	૦	૦

વિસ્તૃત શ્રેણીની આગાહી મુજબ, ૨૨ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૫ સુધી વરસાદ પડવાની શક્યતા નથી અને મહત્તમ અને લઘુત્તમ તાપમાન સામાન્ય રહેવાની ધારણા છે.

હવામાન સારાંશ / ચેતવણી	<ul style="list-style-type: none"> આઈ. એમ. ડી., દ્વારા મળેલી હવામાનની આગાહી મુજબ આગામી પાંચ દિવસમાં આકાશ ચોખ્યાં રહેશે અને વરસાદ આવવાની સંભાવના નથી. મહત્તમ તાપમાન ઉત્ત સે. થી ઉપ સે. જ્યારે લઘુત્તમ તાપમાન ૧૭ સે. થી ૨૦ સે. આસપાસ હોવાની સંભાવના છે. હવામાન ભેજનું પ્રમાણું પાંચ થી ૭૦ ટકા વચ્ચે રહેવાની સંભાવના છે. પવનની દિશા ઉત્તર-પૂર્વ રહેશે જેની સરેરાશ ગતિ પાંચ થી ૮ કિ.મી./કલાક રહેવાની શક્યતા છે.
-------------------------------	---

-:: દક્ષિણ ગુજરાત ભારે વર્સાડ વિસ્તાર ::-

સામાન્ય સલાહ	સુધીના જો પવનની ગતિ ૧૫ કિમી પ્રતિ કલાક કરતાં વધુ હોય તો ખેતરમાં કેમ્પિકલ જેવાકે પેસ્ટિસાઈડ નો છંટકાવ ન કરવો.
	<ul style="list-style-type: none"> • તેથાં પાકોમાં ભલામણ મુજબના ખાતરો તથા જરૂરિયાત મુજબ પિયત આપવું. આકાશ ચોખ્યાં હોય તથા પવનની ગતિ ઓછી રહે ત્યારે જંતુનાશક તથા ફુગનાશક દવાની જોડે ઈટરજનન્ટ પાઉડર અથવા સ્ટીફર (ગુંડાયુ) નો ઉપયોગ કરીને છંટકાવ કરવો. • ઉનાળું પાકની વાવણી માટે છાણીએં ખાતર નાખી જમીનની તૈયારી કરવી. • કૃષિ હવામાન સવાહકારી બુલેટીન અને હવામાનની આગાહી અંગેની માહિતી મેળવવાં માટે ડાઉનલોડ કરો. મેધદૂત મોબાઈલ એપ્લિકેશન, જે ખેડુતોને તેમની સ્થાનિક ભાષામાં સ્થાન, પાક અને પશુધન વિશે હવામાનાખાંધારિત કૃષિ સલાહ પ્રદાન કરશે. મેધદૂત એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો:
	<p>એન્ડ્રોઇડ યુઝર્સ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot</p> <p>આઈ.ઓ.એસ. યુઝર્સ: https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155</p> <ul style="list-style-type: none"> • દામની મોબાઈલ એપ્લિકેશનનુંવારા આકાશીય વિજણીની અગાઉથી ચેતવણી આપવામાં આવે. છે તેમજ આકાશીય વિજણીથી બચવા શું કરવું અને શું નહિ કરવું તેની વિગતવાર માહિતી પૂરી પાડવામાં આવે છે. આથી ખેડુનમિત્રોને દામની મોબાઈલ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. દામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો: એન્ડ્રોઇડ યુઝર્સ:
	<p>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightening.live.damini</p> <p>આઈ.ઓ.એસ. યુઝર્સ: https://apps.apple.com/app/id1502385645</p>
પાક	હવામાન આધારિત કૃષિ સલાહ
શેરડી	<ul style="list-style-type: none"> • શેરડીની રોપણી માટે બીજ પ્લોટ બનાવેલ હોય તો બીજ માટે શેરડી કાપવાની હોય તેના એક માસ પહેલાં ૫૦ કિગ્રા / હે. નાઈટ્રોજન ખાતર આપવું. નવી રોપણી માટે જમીન તૈયારી/જરમિનેશન/વાનસ્પતિક વિકાસ અવસ્થા • શેરડીની નવી રોપણી માટે યોગ્ય બેજની પરિસ્થિતિમાં જમીન તૈયાર કરવી. • શેરડીની રોપણી ઓકટોબર-ફેબ્રુઆરી માસ દરમાન કરવી. • ખેડ વખતે ખાતર્ય/ક્રમ્પોસ્ટ જમીનમાં બેગવવું. • રોપણી પહેલાં પાયાનું ખાતર આપવું. • ખાતર વ્યવસ્થાપન ૨૫૦-૧૨૫-૧૨૫ કી. ના. ફ્લો. પો. પ્રતિ હે. ખાતરનો ઉપયોગ કરો. મૂળભૂત માત્રા (વાવેતર સમયે) : ડી.એ.પી. : ૨૭૧ કી./હે. અથવા એસ એસ પી : ૭૮૨ કી./હે., મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ : ૨૦૮ કી./હે. અને યુરીયા : જન્યારે એસ એસ પી નો ઉપયોગ કરતાં હોય ત્યારે ૮૧ કી./હે પાયાના ખાતર તરીકી આપો. • પૂર્ણી ખાતરની ભલામણ મુજબ નાઈટ્રોજન ખાતર આપવું.- પ્રથમ ડોઝ - યુરીયા : ૧૬૩ કી./હે. મુજબ વાવણીના ૧.૫ થી ૨.૦ માસે, બીજો ડોઝ - યુરીયા ૧૦૮ કી./હે.મુજબ વાવણીના ૩ થી ૩.૫ માસ, બીજો ડોઝ - યુરીયા : ૧૮૦ કી./હે. મુજબ વાવણીના પદ્ધી ૫.૫ માસ. • રોપણી માટે કુમળું અને તંદુરસ્ત તમારી પસંદગીની જતનું બિયારણ વાપરવું. રોપણી માટે બે લાઈન વચ્ચે ૮૦ થી ૧૨૦ સેમી. અંતર રાખી બે આંખના કટકને બીજમાવજન આપી (કાર્બોનાર્કિસ્મ ૫૦ ડિબલ્યુ પી ૧ ગ્રા./૧ લીટર પાણી) એક પદ્ધી એક કટક ચાસમાં રહેતે રોપણી કરવી. એક આંખના રોપણનું વાવેતર કરવાનું હોય તો રોપા વચ્ચે ૪૫ થી ૬૦ સેમી. અંતર રાખી રોપણીની કરવી. • રોપણી બાદ પિયત આપી ત દિવસમાં એટ્રોઝીન ૫૦ ડિબલ્યુ પી પ્રી ઈમરજન્સ ૮૦ ગ્રામ./૧૦ લી. પાણી નીંદ્રણાશક નો છંટકાવ હવામાન ચોખ્યાં હોય ત્યારે કરવો. • રોપણી સમયે શેરડીમાં ટ્રાઈકોડર્મા વિરાઇઝનો ઉપયોગ કરવો. • જમીન/વાતાવરણ અને પાકની અવસ્થા મુજબ જરૂરી પિયત આપવું. ઉનાગામાં - ૧૫-૧૭ દિવસના ગાળે પિયત આપવું અથવા ટ્રેક પિયત અપનાવી અને બે હર વચ્ચે સૂકી પતારીનું આવરણ (મલચિંગ) કરી પિયત પાણીની બચતન કરવી. • પાકને વાવણીના ચાર માસ સુધી નીંદ્રણ મુક્ત રાખવું, આ માટે સમયાંત્રે આંતરખેડ અને હાથથી નીંદ્રણ કરવું અથવા નીંદ્રણાશક દવા ૨,૪-D - Na સોલ્ટ (૧.૨ કિગ્રા. સાંક્યતનત્વ/હે.) + પેરાક્વોટ (૦.૬૦૦ કિગ્રા. સાંક્યતનત્વ/હે.) અને ૨,૪-D - Na સોલ્ટ ૩૦ ગ્રામ + પેરાક્વોટ (૫૦ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લિટર) ૩૦-૬૦ દિવસ વચ્ચે છંટકાવ કરવો.


	<p>ટોલ્ડેનપાયરાડ ૧૫ ઈસી ૨૦ મિલી પ્રતિ ૧૦ લી પાણી મુજબ આડ ઉપર છંટકાવ કરવો.</p> <ul style="list-style-type: none"> ભૂકીશારા ના નિયંત્રણ માટે હેલ્પકોનોઓવેપ ઈસી ૧૦ મિલી અથવા વેટેબલ સલ્ફર ૨૫ ગ્રા. પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિક્સ કરી હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે છંટકાવ કરવો. આંબામાં ફળનું ભરણ ઘટાડવા નોવેલ ઓગ્રેનિક લિકવીડ ન્યુટ્રિટોન્ટ ૧.૫ % (૧૫ લી./૧૦૦ લી.) અથવા ૨૦ પીપીઓમ એન.એ.એ.(૨ ગ્રામ/૧૦૦ લી.) + ૨ % યુરિયા (૨ ડિ.ગ્રા./૧૦૦ લી.) નો છંટકાવ ફળ વટાણા કંઈ જેવા થાય ત્યારે અને ૨૦-૨૫ ટિવસ બાદ એમ બે છંટકાવ કરવો.
ચીકુ	<ul style="list-style-type: none"> બીજા ખાતરનો હુસ્તો ભલામણ કરેલ ખાતરનો ૨૫ ટકા ભાગ પ્રમાણે રાસાયનિક ખાતર એમોનિયમ સહફેટ ૧.૩ ડિગ્રા અથવા યુરિયા ૦.૬ ડિગ્રા, સિંગલ સુપર સ્ટોસ્ફેટ ૦.૮ ડિગ્રા, મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ ૦.૩ ડિગ્રા, છાણિયુ ખાતર ૨૫ ડિગ્રા આ મહિનામાં હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે આપવું.
પશુપાલન	<ul style="list-style-type: none"> પશુઓને દૂધ ઉત્પાદન અને નિભાવની જરૂરિયાત ધ્યાનમાં લઈ પૂરતા પ્રમાણમાં સમતોલ આહાર આપવો, તેમજ પશુઓના રહેણાણ ચોખ્ખા રાખવા, ટિવસ દરમ્યાન સમયાંતરે મળ-મૂતર નો નિકાલ કરવો. પશુઓને યોગ્ય આહારમા જરૂરીયાત પ્રમાણે ખનિજ્યુકન મિશ્રણના સમાવેશ કરવો જોઈએ. ચાફ્ કટરથી લીલા નથા સૂક્ષ્મ ઘાસચારાને ટુકડા કરીને જ નીરણ કરવું. દુધાણા પશુઓના આઉને દૂધ દોહન પહેલા અને પદી ઝિક ઓક્સાઇડ અથવા બોરીક પાઉડર અથવા પોટેશીયમ પરમેગેનેટ ના દ્રાવણથી બરાબર સાફ્ કરવા. પશુઓનાં ઈતરરીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેન્થીન અથવા એમીટાઇર ૨ મી.લી./લિટર પાણીમાં નાખને છાંટવી (દ્વાની બોટલ ઉપર લેખેલી સૂચનાનો અમલ કરવો). પશુઓ જયારે ઈચ્છ ત્યારે પાણી પી શક તેવી વ્યવસ્થા ઉભી કરવી જોઈએ અથવા ઓછામાં ઓછુ ટિવસમાં ચારથી પાંચ વખત જરૂરીયાત મુજબ પાણી પીવડાવવું જોઈએ. ક્રોફ્ટ/ગમાણની ઉચ્ચાઈ ૧૦ કુટ્થી વધારે રાખવી, જેથી હવાની હેરેફેર સરળતાથી થઈ શક, બફારો/ગરમી ઓછી થાય અને બોયાતિણાનો ભાગ સૂક્ષ્મ રહે. વિયામણ બાદ ગાય/બેસના બચણાને અડધાથી એક કલાકમાં ખીર/ચીક પીવડાવની વ્યવસ્થના કરવી જોઈએ. શિયાળાના હંડા વાતાવરણમાં પશુઓને આરામ/સુવા માટે ઘાસચારા અને પથરીની વ્યવસ્થા કરવી. ખુબ હંડા પચન અથવા રાત્રી દરમ્યાન પશુને ગમાણમાં રાખવા.
વનીકરણ	<ul style="list-style-type: none"> પ્રથમ અને બીજા વર્ષના વાવેતરણમાં નિદામણ, રોપા પર ચેઢેલા વેલાની કાપણી તેમજ રોપાની આસપાસના ભાગમાં સફાઈ કરવી.
દીશરીઝ	<ul style="list-style-type: none"> મીઠા પાણીના મન્સ્ય મીઠા પાણીના છંગા ઉત્પાદન કરતા ખેડૂતોને જણાવવાનું કે, આ સમયગાળા દરમ્યાન પૂર્તી માત્રામાં ખોરાક આપવોકારણ કે આ વાતાવરણ માધ્યમી/મીઠા પાણીના છંગા માટે અનુકૂળ છે. તળાવના તળિયાનું અને સાયાટીનું તાપમાન સરભર કરવા એટેર અથવા પંખ ચલાવવા.

❖ એન્ઝોમેટ સલાહકાર સેવા બુલેટીન કમિટીના સભ્યો :

- ડૉ. એચ. એમ. વિરદીયા, પ્રાધ્યાપક અને વડા (સથય વિજ્ઞાન)
- ડૉ. જે. જે. પસ્નાણીયા, પ્રાધ્યાપક અને વડા (વનસ્પતિ વીટકશાસ્ત્ર)
- ડૉ. કે. બી. રાખોવીયા, સહ પ્રાધ્યાપક (વનસ્પતિ રોગવાસ્ત્ર) :
- ડૉ. સી. જી. ઈટ્ટવાલા, સંશોધન વૈજ્ઞાનિક (શાકભાજી વિજ્ઞાન)
- ડૉ. વાય. એન. ટેલે, સહ પ્રાધ્યાપક (ફળ વિજ્ઞાન)
- ડૉ. વી. આર. પટેલ, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (પશુપાલન)
- ડૉ. એમ. બી. ટેલે, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક અને વડા (વનીકરણ)
- ડૉ. એમ. આર. પટેલ, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (દીશરીઝ સાયન્સ)
- ડૉ. વિભા ટાક, રીસર્ચ એસોસીયેટ (જી.કે.એમ.એસ.)
- ડૉ. પી. કે. પરમાર, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (કૃપિ હવામાનશાસ્ત્ર) અને પ્રિન્સિપાલ નોડલ ઓફિસર (જી.કે.એમ.એસ.)

NOAA/VIIRS/BLENDED NDVI Composite ending on Week no 5
(29.01.2025 to 04.02.2025) over Agricultural region

Gujarat



Agriculture vigour is good at few places of the state.

Source: <https://www.star.nesdis.noaa.gov>



NAVSARI AGRICULTURAL UNIVERSITY

Gramin Krishi Mausam Sewa
Agricultural Meteorological Cell
Department of Agricultural Engineering
N. M. College of Agriculture
Navsari Agricultural University
Navsari – 396450, Gujarat
E-mail :- aasnavsari@gmail.com



(Jointly issued by Navsari Agricultural University & India Meteorological Department)

DATE OF ISSUE: 11/02/2025**Agromet Advisory Bulletin No: 91/2024 - 2025****-- Navsari District --****Weather summary of preceding week (07 February to 11 February - 2025)**

Sr. No.	Name of Weather Parameters	Value
1.	Range of Rainfall (mm)	0.0
2.	Range of Maximum Temperature (°C)	31.5-35.0
3.	Range of Minimum Temperature (°C)	13.0-16.5
4.	Range of Relative Humidity (%)	29-93
5.	Range of Wind Speed (km/hr)	1.5-6.7
6.	Range of Cloud Cover (Okta)	0-3
7.	Range of bright sunshine hours (hrs)	8.1-9.0
8.	Last five days cumulative rainfall (mm)	0.0
Total Rainfall (mm)		0.0

IMD based Weather forecast for (12 February to 16 February - 2025)

Sr. No.	Weathers Parameters	Day - 1 (12/02)	Day - 2 (13/02)	Day - 3 (14/02)	Day - 4 (15/02)	Day - 5 (16/02)
1.	Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
2.	Maximum temperature (°C)	33	33	34	35	34
3.	Minimum Temperature (°C)	17	18	19	20	19
4.	Max. Relative Humidity (%)	70	70	65	65	65
5.	Min. Relative Humidity (%)	60	60	55	55	55
6.	Wind Speed (km/hr.)	5	8	9	9	8
7.	Wind Direction (Compass point)	48	34	38	48	56
8.	Total Cloud Cover (Okta)	0	0	0	0	0

According to the extended range forecast, below normal rainfall is expected and maximum and minimum temperatures are expected to be normal till February 22, 2025.

Weather Summary/ Alert	<ul style="list-style-type: none"> As per the forecast issued by India Meteorological Department over the next five days, the sky will be clear and there are chances of no rainfall. The Maximum temperature is 33 °C to 35 °C, when the Minimum temperature is 17 °C to 20 °C likely to be around. The humidity in the air is likely to be between 55 and 70 percent. The wind direction will be North-East with an average speed of 5 to 9 km/h.
-----------------------------------	---

-:: South Gujarat Heavy Rainfall Zone ::-


General Advisory <ul style="list-style-type: none"> • Wind speed is high >15 kmph, so avoid spraying of pesticide. • Farmers are advised to apply irrigation as per requirement of crops and apply recommended dose of fertilizers and monitor the crop and take plant protection measures against disease-pest incidence. • Carry out land preparation for sowing of summer crops by applying recommended dose of FYM. • Download the MEGHDOOT mobile application for Agromet Advisory Services and information on weather forecasting, which will provide weather based agricultural advice to farmers for their location, crops and livestock in their local language. Click on the following link to download the MEGHDOOT application: Android users: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot IOS users:https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155 • Download the DAMINI Mobile application to ensure the safety through monitoring sky lightning activity. It will provide the alert and detail description of instruction, precaution, Do and Don't. Click on the following link to download the DAMINI application. Android users: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightening.live.damini IOS users:https://apps.apple.com/app/id1502385645 				
Crop <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center; background-color: #cccccc;">Weather based Agro-Advisory</th> </tr> <tr> <td style="width: 10%; vertical-align: top; padding-right: 10px;"> Sugarcane </td><td> <p>Land preparation for new planting/Germination/ Vegetative Stage</p> <ul style="list-style-type: none"> • In seed plot add Nitrogen (50 kg/ha.) Before one month of seed cutting. • New plantation of sugarcane crop should be done after proper preparation of land at proper moisture condition. Deep plough and level the soil. • Planting should be done from October to February. • Apply FYM/ Compost at the time of ploughing. Select healthy, diseases-insect free and immature seed materials of your selected variety. • Apply fertilizer application for plant Crop 250-125-125 kg NPK/ha. Basal dose (At time of planting) : DAP : 271 kg/ha or SSP : 782 kg/ha, MOP : 208 kg/ha. and Urea : When use SSP as basal dose than 81 kg/ha. • Apply split dose of Nitrogen fertilizer as per recommendation- 1st Split (At 1.5 to 2 months after planting) Urea : 163 kg/ha, 2nd split dose Urea 109 kg/ha at 3-3.5 month after planting, 3rd dose urea 190 kg/ha at 5 - 5.5 months after planting (before final earthing up). • Planting should be done at the spacing of 90 to 120 cm. 2 budded setts should be used with end to end method of planting after setts treatment with fungicide (<i>Carbendazim 50 wp @ 1g/1 lit. water</i>). If settling use intra row spacing should be 45 to 60 cm. • Within 3 days after planting and irrigation, spraying of <i>Atrazine 50 WP 80 g/10 li. water</i>. Pre-emergence weedicide should be applied to control weeds in clear weather conditions. • Application of <i>Trichoderma viride</i> in rich sugarcane pressmed @ 8 ton/ha at time of planting. • As per soil/climatic condition and stage of crop irrigation apply- summer at 15-17 day interval or adopt drip method of irrigation and mulching of trash in between two rows of crop to save irrigation water. • Keep crop weed free upto 4 months of planting by interculturing, hand weeding or apply post emergence weedicide like 2,4-D Na Salt (1.2 kg ai/ha)+ <i>Paraquat</i> (0.600 kg ai/ha) or 2,4-D (Na Salt, 30 g/10 lit. water)+ <i>Paraquat</i> (50 g/10 lit.) after 30-60 DAP. • Earthing up should be done at 3-3.5 and 5.5-6 months after planting. • Application of <i>Carbofuron 3 CG @ 33 kg/hac.</i> in soil for control of sugarcane </td></tr> </table>	Weather based Agro-Advisory		Sugarcane	<p>Land preparation for new planting/Germination/ Vegetative Stage</p> <ul style="list-style-type: none"> • In seed plot add Nitrogen (50 kg/ha.) Before one month of seed cutting. • New plantation of sugarcane crop should be done after proper preparation of land at proper moisture condition. Deep plough and level the soil. • Planting should be done from October to February. • Apply FYM/ Compost at the time of ploughing. Select healthy, diseases-insect free and immature seed materials of your selected variety. • Apply fertilizer application for plant Crop 250-125-125 kg NPK/ha. Basal dose (At time of planting) : DAP : 271 kg/ha or SSP : 782 kg/ha, MOP : 208 kg/ha. and Urea : When use SSP as basal dose than 81 kg/ha. • Apply split dose of Nitrogen fertilizer as per recommendation- 1st Split (At 1.5 to 2 months after planting) Urea : 163 kg/ha, 2nd split dose Urea 109 kg/ha at 3-3.5 month after planting, 3rd dose urea 190 kg/ha at 5 - 5.5 months after planting (before final earthing up). • Planting should be done at the spacing of 90 to 120 cm. 2 budded setts should be used with end to end method of planting after setts treatment with fungicide (<i>Carbendazim 50 wp @ 1g/1 lit. water</i>). If settling use intra row spacing should be 45 to 60 cm. • Within 3 days after planting and irrigation, spraying of <i>Atrazine 50 WP 80 g/10 li. water</i>. Pre-emergence weedicide should be applied to control weeds in clear weather conditions. • Application of <i>Trichoderma viride</i> in rich sugarcane pressmed @ 8 ton/ha at time of planting. • As per soil/climatic condition and stage of crop irrigation apply- summer at 15-17 day interval or adopt drip method of irrigation and mulching of trash in between two rows of crop to save irrigation water. • Keep crop weed free upto 4 months of planting by interculturing, hand weeding or apply post emergence weedicide like 2,4-D Na Salt (1.2 kg ai/ha)+ <i>Paraquat</i> (0.600 kg ai/ha) or 2,4-D (Na Salt, 30 g/10 lit. water)+ <i>Paraquat</i> (50 g/10 lit.) after 30-60 DAP. • Earthing up should be done at 3-3.5 and 5.5-6 months after planting. • Application of <i>Carbofuron 3 CG @ 33 kg/hac.</i> in soil for control of sugarcane
Weather based Agro-Advisory				
Sugarcane	<p>Land preparation for new planting/Germination/ Vegetative Stage</p> <ul style="list-style-type: none"> • In seed plot add Nitrogen (50 kg/ha.) Before one month of seed cutting. • New plantation of sugarcane crop should be done after proper preparation of land at proper moisture condition. Deep plough and level the soil. • Planting should be done from October to February. • Apply FYM/ Compost at the time of ploughing. Select healthy, diseases-insect free and immature seed materials of your selected variety. • Apply fertilizer application for plant Crop 250-125-125 kg NPK/ha. Basal dose (At time of planting) : DAP : 271 kg/ha or SSP : 782 kg/ha, MOP : 208 kg/ha. and Urea : When use SSP as basal dose than 81 kg/ha. • Apply split dose of Nitrogen fertilizer as per recommendation- 1st Split (At 1.5 to 2 months after planting) Urea : 163 kg/ha, 2nd split dose Urea 109 kg/ha at 3-3.5 month after planting, 3rd dose urea 190 kg/ha at 5 - 5.5 months after planting (before final earthing up). • Planting should be done at the spacing of 90 to 120 cm. 2 budded setts should be used with end to end method of planting after setts treatment with fungicide (<i>Carbendazim 50 wp @ 1g/1 lit. water</i>). If settling use intra row spacing should be 45 to 60 cm. • Within 3 days after planting and irrigation, spraying of <i>Atrazine 50 WP 80 g/10 li. water</i>. Pre-emergence weedicide should be applied to control weeds in clear weather conditions. • Application of <i>Trichoderma viride</i> in rich sugarcane pressmed @ 8 ton/ha at time of planting. • As per soil/climatic condition and stage of crop irrigation apply- summer at 15-17 day interval or adopt drip method of irrigation and mulching of trash in between two rows of crop to save irrigation water. • Keep crop weed free upto 4 months of planting by interculturing, hand weeding or apply post emergence weedicide like 2,4-D Na Salt (1.2 kg ai/ha)+ <i>Paraquat</i> (0.600 kg ai/ha) or 2,4-D (Na Salt, 30 g/10 lit. water)+ <i>Paraquat</i> (50 g/10 lit.) after 30-60 DAP. • Earthing up should be done at 3-3.5 and 5.5-6 months after planting. • Application of <i>Carbofuron 3 CG @ 33 kg/hac.</i> in soil for control of sugarcane 			

	early shoot borer.
Rabi Pulse crop	<p>Vegetative growth stage :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Weeding should be done as per need or apply recommended weedicide. • Apply irrigation as per soil and climatic condition. • For management of pod borer in chickpea, apply <i>Emamectin benzoate</i> 1.9 EC @ 7.5 ml./10 lit. water. • Spray <i>Chlorantraniliprole</i> 18.5 SC @ 3.0 ml or <i>Flubendiamide</i> 20 WG @ 5 g or <i>Indoxocarb</i> 14.5 SC @ 8 ml. or <i>Lufenuran</i> 5.4 EC @ 12 ml. per 10 lit. of water for management of Pigeonpea pod borer.
Okra	<ul style="list-style-type: none"> • Weeding and intercultural operations should be carried out. • Irrigation should be given as per requirement. • Spraying of Hexaconazole 5 EC @ 10 ml or Carbendazim 50 WP 5 g per 10 Lit of water for control of powdery mildew/leaf spot disease under clear weather condition. • 40 pheromone/hectare trap of okra fruit and shoot borer should be installed. • Up root and burn yellow vein mosaic infected okra plant from field. • Spraying systemic insecticides for whitefly (vector) management. • Spraying of <i>Propargite</i> 57 EC @ 20 ml/10 Lit. or <i>Fenazaquin</i> 10 EC @ 10 ml./10 Lit. of water for red Spider Mite during clear weather condition.
Brinjal	<ul style="list-style-type: none"> • Irrigation should be given as per requirement. • 40 pheromone/hectare trap of okra fruit and shoot borer should be installed. • Spraying of <i>Propargite</i> 57 EC @ 20 ml./10 Lit. or <i>Fenazaquin</i> 10 EC @ 10 ml./10 Lit. of water for red Spider Mite during clear weather condition.
Tomato	<ul style="list-style-type: none"> • Weeding and intercultural operations should be carried out. • 40 pheromone/hectare trap of okra fruit and shoot borer should be installed. • For management of leaf spot disease, spray <i>Mancozeb</i> 75 WP @ 28 g/10 lit. of water under clear weather condition.
Chilli	<ul style="list-style-type: none"> • Weeding and intercultural operations should be carried out. • For management of thrips spray crop with <i>Acetamiprid</i> 20 SP @ 2g or <i>Broflanilide</i> 20 SC @ 2.5 ml or <i>Cyantraniliprole</i> 10.26 OD @ 12 ml or <i>Ethion</i> 50 EC @ 30ml or <i>Isocycloseram</i> 9.2 DC @ 12 ml or <i>Fipronil</i> 5 SC @ 15 ml per 10 liter of water under clear weather condition. • Spraying of <i>Propargite</i> 57 EC @ 20 ml./10 Lit. or <i>Fenazaquin</i> 10 EC @ 10 ml./10 Lit. of water for red Spider Mite during clear weather condition. • Spraying of Carbendazim 50 WP 10 g/10 Lit of water for control of fruit rot disease under clear weather condition.
Pointed gourd	<ul style="list-style-type: none"> • Harvesting should be carried out as per maturity. • Irrigation should be applied as per requirement in 15 to 20 days interval in January.
Little gourd	<ul style="list-style-type: none"> • Harvesting should be carried out as per maturity. • Irrigation should be applied as per requirement in 15 to 20 days interval in January.
Elephant foot yam	<ul style="list-style-type: none"> • Harvesting should be carried out as per maturity.
Greater yam	<ul style="list-style-type: none"> • Harvesting should be carried out as per maturity.
Tannia	<ul style="list-style-type: none"> • Harvest the tender leaves of Tannia for making "paatra". • Irrigation should be given as per requirement.
Mango	<p>General Advise :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Find grubs of stem borer from gallery and holes on the stem and kill them. Do pouring of <i>Chlorpyrifos</i> 20 EC @ 25 ml/ 10 lit in hole and plug it with mud in clear weather condition under clear weather condition. • Application of 10 % Bordeaux paste in cut after pruning branches of fruit tree. • Procure healthy and disease free planting material from authorized and government nursery for the new plantation. • Spray <i>Imidacloprid</i> 17.8 % 3 ml. or <i>Thiamethoxam</i> 25 % 4 g or <i>Lambda-Cyhalothrin</i> 5 EC @ 10 ml. per 10 lit. water on mango tree for control of mango hopper and mango shoot borer during clear weather condition. • As temperature with increased relative humidity to favoring population of thrips, for management Spraying of <i>Tolfenpyrad</i> 15 EC @ 20 ml/10 lit water for thrips mangement.

	<ul style="list-style-type: none"> • Spraying of Hexaconazole 5 EC @ 10 ml. or Wettable sulphur @ 25 g. per 10 lit. for control of powdery mildew in clear weather condition. • Spray Novel Organic Liquid Nutrient (15 Lit./100 lit.) or 200 ppm NAA (2 g/100 lit.) + 2% Urea (2 kg/100lit.) at pea-size mango fruits to reduce fruit drop. Repeat after 20-25 days for a total of two sprays.
Sapota	General Advise : <ul style="list-style-type: none"> • Apply second split of 25% of RDF (Ammonium Sulphate -1.3 kg or Urea 0.6 kg, SSP 0.8 kg and MOP 0.3 kg + FYM 25 kg each tree) in clear weather condition.
Livestock	<ul style="list-style-type: none"> • Provide adequate quantity of balanced ration by considering the milk production and maintenance. • Good quality dry roughage with 15-20 kg green fodder provided to the animals, only after chaffing. • Feed silage & hay materials if available. • Before and after milking udder must be properly clean with zinc oxide or boric powder or potassium permanganate solutions. • For the control of tick and other parasites, spray <i>Deltemethrin</i> or <i>Aemitaz</i> 2 ml in 1 liter of water. • Height of animal shed should keep minimum 10 feet for aeration to maintain the floor dry and to control humidity. • After calving, the young cattle/Buffalo should get colostrums within half to one hour. • Provide bedding material in cold climatic condition.
Forestry	<ul style="list-style-type: none"> • Weeding climber cutting and cleaning should be carried out in first and second year plantations.
Fisheries	<ul style="list-style-type: none"> • Fresh water farmers give proper feed in fish/prawn farming for better growth rate because environment condition is very suitable. • Increase water depth and maintain water level through pond outlet. • Mixing the top and bottom water by using the aerators or pumps.

❖ Members of Agro-Advisory Committee :

- Dr. H. M. Viradia, Professor & Head (Agronomy)
- Dr. J. J. Pastagia, Professor & Head (Entomology)
- Dr. K. B. Rakholiya, Associate Professor (Plant Pathology):
- Dr. C. G. Intwala, Research Scientist (Vegetable Science)
- Dr. Y. N. Tandel, Associate Professor (Fruit Science)
- Dr. V. R. Patel, Assistant Professor (Animal Husbandry)
- Dr. M. B. Tandel, Assistant Professor (Forestry) & I/C Head (SAF) (Forestry)
- Dr. M. R. Patel, Assistant Professor (Fisheries Science)
- Dr. Vibha Tak, Research Associate(GKMS)
- Dr. P. K. Parmar, Assistant Professor (Agricultural Meteorology and Principal Nodal Officer (GKMS))



Source: <https://www.star.nesdis.noaa.gov>

દવામાન આગાહી

વિગત	તારીખ	દાંગ	નવસારી	વલસાડ
વરસાદની શ્રેણી (મી.મી.)	૧૨/૦૨/૨૦૨૫	૦	૦	૦
	૧૩/૦૨/૨૦૨૫	૦	૦	૦
	૧૪/૦૨/૨૦૨૫	૦	૦	૦
	૧૫/૦૨/૨૦૨૫	૦	૦	૦
	૧૬/૦૨/૨૦૨૫	૦	૦	૦
મહત્વમનુષ્ય તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૧૨/૦૨/૨૦૨૫	૩૪	૩૩	૩૩
	૧૩/૦૨/૨૦૨૫	૩૪	૩૩	૩૩
	૧૪/૦૨/૨૦૨૫	૩૫	૩૪	૩૪
	૧૫/૦૨/૨૦૨૫	૩૬	૩૫	૩૫
	૧૬/૦૨/૨૦૨૫	૩૬	૩૪	૩૪
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૧૨/૦૨/૨૦૨૫	૧૬	૧૭	૧૭
	૧૩/૦૨/૨૦૨૫	૧૭	૧૮	૧૮
	૧૪/૦૨/૨૦૨૫	૧૮	૧૬	૧૬
	૧૫/૦૨/૨૦૨૫	૧૬	૨૦	૨૦
	૧૬/૦૨/૨૦૨૫	૧૬	૧૬	૧૬
મહત્વમનુષ્ય ભેજ (%)	૧૨/૦૨/૨૦૨૫	૭૦	૭૦	૭૦
	૧૩/૦૨/૨૦૨૫	૬૫	૭૦	૭૦
	૧૪/૦૨/૨૦૨૫	૬૫	૬૫	૬૫
	૧૫/૦૨/૨૦૨૫	૬૫	૬૫	૬૫
	૧૬/૦૨/૨૦૨૫	૬૫	૬૫	૬૫
લઘુત્તમ ભેજ (%)	૧૨/૦૨/૨૦૨૫	૪૦	૫૦	૫૦
	૧૩/૦૨/૨૦૨૫	૪૫	૫૦	૫૦
	૧૪/૦૨/૨૦૨૫	૪૫	૫૫	૫૫
	૧૫/૦૨/૨૦૨૫	૪૫	૫૫	૫૫
	૧૬/૦૨/૨૦૨૫	૪૫	૫૫	૫૫
પવનની ગતિ(ક્રમી./કલાક)	૧૨/૦૨/૨૦૨૫	૪	૫	૬
	૧૩/૦૨/૨૦૨૫	૪	૮	૮
	૧૪/૦૨/૨૦૨૫	૫	૬	૬
	૧૫/૦૨/૨૦૨૫	૭	૬	૬
	૧૬/૦૨/૨૦૨૫	૭	૮	૭
પવનની દિશા (ક્રમાસ પોઈન્ટ)	૧૨/૦૨/૨૦૨૫	SE	NE	NE
	૧૩/૦૨/૨૦૨૫	E	NE	NE
	૧૪/૦૨/૨૦૨૫	E	NE	NE
	૧૫/૦૨/૨૦૨૫	E	NE	NE
	૧૬/૦૨/૨૦૨૫	E	NE	E
વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટો)	૧૨/૦૨/૨૦૨૫	૦	૦	૦
	૧૩/૦૨/૨૦૨૫	૦	૦	૦
	૧૪/૦૨/૨૦૨૫	૦	૦	૦
	૧૫/૦૨/૨૦૨૫	૦	૦	૦
	૧૬/૦૨/૨૦૨૫	૦	૦	૦