



નવસારી કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલય

ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા

કૃષિ હવામાનશાસ્ત્ર સેલ
કૃષિ ઈજનેરી વિભાગ, ન. મ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય
નવસારી કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલય
નવસારી - ૩૮૬૪૫૦, ગુજરાત
ઇ-મેઇલ:- aasnavsari@gmail.com



(નવસારી કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલય અને ભારત મૌસમ વિજ્ઞાન વિભાગ દ્વારા પ્રસારિત)

તા. ૧૮/૧૦/૨૦૨૪

કૃષિ હવામાન બુલેટીન નં : ૫૯/૨૦૨૪ - ૨૦૨૫

-- નવસારી જિલ્લો --

પાછળનાં સમયનું હવામાન (તા. ૧૫ ઓક્ટોબર થી ૧૮ ઓક્ટોબર - ૨૦૨૪)

અનુ. નં.	હવામાન પરિબલો	Value
૧.	વરસાદની શ્રેણી (મી.મી.)	૦.૦-૨.૦
૨.	મહત્તમ તાપમાનની શ્રેણી (સે.ગ્રે.)	૩૪.૪-૩૫.૨
૩.	લઘુત્તમ તાપમાનની શ્રેણી (સે.ગ્રે.)	૨૩.૫-૨૬.૫
૪.	ભેજની શ્રેણી (%)	૫૫-૯૮
૫.	પવનની ગતિની શ્રેણી (કિ.મી./કલાક)	૦.૯-૧.૮
૬.	વાદળની સ્થિતિની શ્રેણી (ઓક્ટા)	૦-૮
૭.	સુર્યપ્રકાશિત સમયની શ્રેણી (કલાક)	૧.૩-૯.૧
૮.	પાછળના પાંચ દિવસમાં સંચિત વરસાદ (મી.મી.)	૨.૦
કુલ વરસાદ		૨૩૬૨.૦


આઈ. એમ. ડી. દ્વારા પ્રાપ્ત હવામાન આગાહી (તા. ૧૯ ઓક્ટોબર થી ૨૩ ઓક્ટોબર - ૨૦૨૪)

અનુ. નં.	હવામાન પરિબલો	દિવસ-૧ (૧૯/૧૦)	દિવસ-૨ (૨૦/૧૦)	દિવસ-૩ (૨૧/૧૦)	દિવસ-૪ (૨૨/૧૦)	દિવસ-૫ (૨૩/૧૦)
૧.	વરસાદ (મી.મી.)	૪.૩	૩	૪	૬.૩	૦.૯
૨.	મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૩૩	૩૧	૩૧	૩૨	૩૨
૩.	લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૭	૨૬	૨૬	૨૫	૨૫
૪.	મહત્તમ ભેજ (%)	૮૩.૯	૮૮.૫	૮૮.૧	૮૫.૧	૮૦.૯
૫.	લઘુત્તમ ભેજ (%)	૫૫.૧	૫૯.૪	૬૧.૭	૫૬.૭	૫૦.૧
૬.	પવનની ગતિ (કિ.મી./કલાક)	૫.૮	૪.૨	૩.૬	૫.૫	૬.૬
૭.	પવનની દિશા (કમ્પાસ પોઇન્ટ)	૦	૧૨૧	૮૪.૩	૭૮.૭	૭૭.૫
૮.	વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટા)	૬	૭	૫	૨	૧

હવામાન સારાંશ / ચેતવણી

- આઈ. એમ. ડી. , દ્વારા મળેલી હવામાનની આગાહી મુજબ આગામી પાંચ દિવસમાં આકાશ આંશિક વાદળછાયું રહેશે અને ખૂબ હળવો થી હળવો વરસાદ વરસાદ પડવાની સંભાવના છે.
- મહત્તમ તાપમાન ૩૧ સે. થી ૩૩ સે. જ્યારે લઘુત્તમ તાપમાન ૨૫ સે. થી ૨૭ આસપાસ હોવાની સંભાવના છે.
- હવામાં ભેજનું પ્રમાણ ૫૦ થી ૮૮ ટકા વચ્ચે રહેવાની સંભાવના છે.
- પવનની દિશા પૂર્વીય રહેશે જેની સરેરાશ ગતિ ૪ થી ૭ કિ.મી./કલાક રહેવાની શક્યતા છે.
- વિસ્તૃત શ્રેણીની આગાહી મુજબ, ૨૯મી ઓક્ટોબર, ૨૦૨૪ સુધી સામાન્યથી ઓછો વરસાદ અને મહત્તમ અને લઘુત્તમ તાપમાન સામાન્ય રહેવાની ધારણા છે.

-:: દક્ષિણ ગુજરાત ભારે વરસાદ વિસ્તાર ::-

<p>સામાન્ય સલાહ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ખેડુતોને ખેતરની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ હવામાનની સ્થિતિ મુજબ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ખેડુતોએ ખાતર આપવાની અને દવાનો છંટકાવ કરવાની કામગિરી હવામાનની સ્થિતિ મુજબ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ખેડુતોને સલાહ આપવામાં આવે છેકે, ખુલ્લા હવામાનમાં પરિપક્વ ચોમાસું પાકોની લણણી/કાપણી પૂર્ણ કરવી. કાપણી કરેલ પાકની સૂર્યપ્રકાશમાં સુકવણી કરી દાણા છૂટા પાડવા (થ્રેસિંગ) નું કામ કરવું. વધુ ઝડપી પવન અને ભારે વરસાદની સામે રક્ષણ માટે ઊભા બાગાયતી અને શાકભાજી પાકોની જાળવણી માટે લાકડાના અથવા વાંસ વડે યાંત્રિક ટેકા આપવો. કૃષિ હવામાન સલાહકારી બુલેટીન અને હવામાનની આગાહી અંગેની માહિતી મેળવવાં માટે ડાઉનલોડ કરો મેઘદૂત મોબાઇલ એપ્લિકેશન, જે ખેડુતોને તેમની સ્થાનિક ભાષામાં સ્થાન, પાક અને પશુધન વિશે હવામાનઆધારિત કૃષિ સલાહ પ્રદાન કરશે. મેઘદૂત એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો: <p>એન્ડ્રોઇડ યુઝર્સ:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot</p> <p>આઈ.ઓ.એસ. યુઝર્સ:https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155</p> <ul style="list-style-type: none"> દામિની મોબાઇલ એપ્લિકેશનદ્વારા આકાશીય વિજળીની અગાઉથી ચેતવણી આપવામાં આવે છે તેમજ આકાશીય વિજળીથી બચવા શું કરવું અને શું નહિ કરવું તેની વિગતવાર માહિતી પૂરી પાડવામાં આવે છે. આથી ખેડુતમિત્રોને દામિની મોબાઇલ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. દામિની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લીંક પર ક્લિક કરો: એન્ડ્રોઇડ યુઝર્સ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightening.live.damini <p>આઈ.ઓ.એસ. યુઝર્સ:https://apps.apple.com/app/id1502385645</p>
 <p>NOAA/VIRS/BIENED NDVI Composite ending on Week no 39 (23.09.2024 to 29.09.2024) over Agricultural region Gujarat</p> <p>Agriculture vigour is moderate at few places of the state.</p> <p>Source: https://www.star.nesdis.noaa.gov</p>	
<p>પાક</p>	<p>હવામાન આધારિત કૃષિ સલાહ</p>
<p>શેરડી</p>	<ul style="list-style-type: none"> શેરડીની રોપણી માટે બીજ પ્લોટ બનાવેલ હોય તો બીજ માટે શેરડી કાપવાની હોય તેના એક માસ પહેલા ૫૦ કિગ્રા / હે. નાઈટ્રોજન ખાતર આપવું. નવી રોપણી માટે જમીન તૈયારી: શેરડીની નવી રોપણી માટે યોગ્ય ભેજની પરિસ્થિતિમાં જમીન તૈયાર કરવી. શેરડીની રોપણી ઓક્ટોબર-ફેબ્રુઆરી માસ દરમિયાન કરવી. ખેડ વખતે ખાતર/કમ્પોસ્ટ જમીનમાં ભેળવવું. રોપણી પહેલા પાયાનું ખાતર આપવું. રોપણી માટે કુમળ અને તંદુરસ્ત તમારી પસંદગીની જાતનું બિયારણ વાપરવું. રોપણી માટે બે લાઈન વચ્ચે ૮૦ થી ૧૨૦ સેમી. અંતર રાખી બે આંખના કટકાને બીજમાવજત આપી (કાર્બોન્ડાઝિમ ૫૦ ડબલ્યુ પી ૧ ગ્રા./૧ લીટર પાણી) એક પછી એક કટકા ચાસમાં રહે તે રીતે રોપણી કરવી. એક આંખના રોપણું વાવેતર કરવાનું હોય તો લાઈનમાં બે રોપા વચ્ચે ૪૫ થી ૬૦ સેમી. અંતર રાખી રોપણી કરવી. રોપણી બાદ પિયત આપી ૩ દિવસમાં એટ્રાઝીન ૫૦ ડબલ્યુ પી પ્રી ઈમરજન્સ ૮૦ ગ્રામ./૧૦ લી. પાણી નીંદાણનાશક નો છંટકાવ હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે કરવો. રોપણી સમયે શેરડીમાં ટ્રાઈકોડર્મા વિરાઈડનો ઉપયોગ કરવો.
<p>ચોમાસુ ડાંગર</p>	<p>દાણા ભરાવા :</p> <ul style="list-style-type: none"> કાપણીના ૧૦-૧૫ દિવસ પહેલા ક્યારીમાંથી પાણી નિતારી દેવું વરસાદ ની સંભાવના ન હોય ત્યારે કાપણી કરવી. કાપણી કર્યા બાદ સૂર્ય તાપમાં સૂકવી દાણા છૂટા પાડવા અને દાણાનો ભેજ ઓછો થાય ત્યાં સુધી તપાવી સંગ્રહ કરવો. કાપણી બાદ તુરંત જમીન ખેડીએ રબી પાક માટે તૈયાર કરવી. ચોમાસુ ડાંગરના પાનના ટપકા દેખાય તો પ્રોપીકોનાઝોલ ૧ મિલી./૧ લી. અથવા ટ્રાયસાયક્લોઝોલ ૧ ગ્રા./૧ લી. પાણીમાં મીશ્ર કરી હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે છંટકાવ કરવો. જીવાણુથી થતા પાનના સુકારોના રોગ જેવા મળે તો નિયંત્રણ માટે કોપર હાઈડ્રોક્સાઈડ ૫૩.૮% ડીએફ ૩૦ ગ્રામ/૧૦ લી. પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.

શીયાળુ કઠોળ	<p>જમીન તૈયારી/વાવણી :</p> <ul style="list-style-type: none"> શીયાળુ કઠોળના વાવેતર માટે ચોમાસુ પાક કાપ્યા બાદ યોગ્ય ભેજ સમયે જમીન તૈયાર કરવી. શીયાળુ કઠોળના જેવા કે વાલક પાપડીલ ચણાલ મગ (સીઓ -૪) ની વાવણી યોગ્ય સમયે કરવી. જરૂરી બિયારણની સુધારેલ જાત મેળવી લેવી. પાયાનું ભલામણ મુજબ ખાતર આપવું. પાક નીંદણ મુક્ત રાખવું. આ માટે જરૂરી જણાય તો વાવણી બાદ તૂરંત ભલામણ મુજબની નિંદણનાશક દવાનો જમીન ઉપર છંટકાવ કરવો. જરૂરિયાત મુજબ પીયત આપવું. બીજ માવજત થાયરમ ૩ ગ્રા./ કિગ્રા. + રાયઝોબીયમ ૧૦ મિ.લી./કિગ્રા. બીજ થી આપવું.
ભીંડા	<ul style="list-style-type: none"> કુમળા અને વેચાણ લાયક ફળોની વીણી કરતા રેલવું. રોગ-જીવાતવાળા અને બગડેલા ફળો દૂર કરવા જોઈએ. પ્લોટમાંથી નિંદામણ દૂર કરવું. ભીંડામાં ભૂકીછારા અને પાનના ટપકના નિયંત્રણ માટે હેક્સાકોનાઝોલ ૫ ઈસી ૧૦ મિલી. અથવા કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ ડબલ્યુપી ૫ ગ્રા પ્રતિ ૧૦ લી. પાણીમાં મીશ્ર કરી હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે છંટકાવ કરવો. ખેતરમાંથી પીળી નસના વિપાણુ જન્ય છોડ ને ઉપાડી નાશ કરો. રોગનો ફેલાવો સફેદ માખીથી થાતો હોય, શોષક પ્રકારની જંતુ નાશક દવાનો છંટકાવ કરવો. ભીંડામાં પાન કથીરીના નિયંત્રણ માટે પ્રોપર્ગાઈટ ૫૭ ઈસી ૨૦ મિલી./૧૦ લીટર અથવા ફેનાઝાકવીન ૧૦ ઈસી ૧૦ મિલી./૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી પાક ઉપર છંટકાવ હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે કરવો.
રીંગણ	<ul style="list-style-type: none"> ધરૂ ૨૮-૩૦ દિવસનું થાય ત્યારે ફેરરોપણી કરી દેવી. દર બે દિવસ બાદ પાણીના ટુવા આપવા.
ટામેટા	<ul style="list-style-type: none"> ૨૫-૩૦ દિવસનું ધરૂ થાય ત્યારે ફેરરોપણી કરવી. દર બે દિવસ બાદ પાણીના ટુવા આપવા.
મરચી	<ul style="list-style-type: none"> ૩૫ થી ૪૦ દિવસે ધરૂ રોપવા લાયક બને છે એટલે કે ફેરરોપણી કરી દેવી. દર બે દિવસ બાદ પાણીના ટુવા આપવા.
ચોળી	<ul style="list-style-type: none"> ચોળીના પાકમાં નિંદામણ કરી પ્લોટ ચોખ્ખો રાખવો અને ચોળીની વીણી કરતા રેલવું.
પરવળ	<ul style="list-style-type: none"> પરવળના મંડપમાંથી સુકાયેલા વેલા દૂર કરવા તથા વધારાના પીલા કાપી દૂર કરવા. ખાલા પડેલ હોય તો નવા રોપ રોપવા. પરવળના ખામણાં ગોડી, ખાતર અને પાણી આપવું.
ટિંડોળા	<ul style="list-style-type: none"> ટિંડોળાનાં મંડપમાંથી સુકાયેલા વેલા દૂર કરવા તથા વધારાના પીલા કાપી દૂર કરવા. ખાલા પડેલ હોય તો નવા રોપ રોપવા. ટિંડોળાનાં ખામણાં ગોડી, ખાતર અને પાણી આપવું.
સુરણ	<ul style="list-style-type: none"> નિંદામણ દૂર કરી પ્લોટ ચોખ્ખો રાખવો. ખામણે ગોડ કરવી. પિયતની ખેંચ જણાય તો પિયત આપવું.
રતાળુ	<ul style="list-style-type: none"> નિંદામણ દૂર કરી પ્લોટ ચોખ્ખો રાખવો. વેલાની પ્રશાખાઓને ટેકા પર ચઢાવવી.
તાનિયા	<ul style="list-style-type: none"> નિંદામણ દૂર કરી પ્લોટ ચોખ્ખો રાખવો. કુમળા પાનની વીણી વીણી કરતા રેલવું.
આંબા	<p>સામાન્ય સલાહ :</p> <ul style="list-style-type: none"> આંબાના મેઢની ઈયળો થડમાંથી શોધીને મારી નાખો અને કાણાંની અંદર ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦ ઈસી ૨૫ મી.લી./૧૦ લી. દ્રાવણ નાંખી કાદવથી કાણાં બંધ કરી દેવા. આંબાનાં નાના રોપાની જાળવણી માટે ટેકો આપવાની વ્યવસ્થા કરવી જેથી વરસાદ અને વધુ પવનની ઝડપ સામે ટકી શકે. છટણી બાદ કપાયેલ ડાળી પર બોડેક્સ પેસ્ટ ૧૦ ટકા લગાડવું. આંબા નવી વાડી બનાવવા તંદુરસ્ત અને રોગમુક્ત કલમો અધિકૃત અને સરકારી નર્સરી માંથી મેળવવી જોઈએ. નવી કલમો માટે તૈયાર કરેલ ખાડામાં ૧૦ કિગ્રા. છાણિયું ખાતર , ૧ કિગ્રા. સિંગલ સુપર સલ્ફેટ અને ૧ કિગ્રા. મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ ખાતર આપવું. ઉધઈ અને કીડીનો ઉપદ્રવ કલમોમાં જોવા મળે તો ૫૦ મિલી ./૧૦ લી. પાણીમાં ક્લોરપાયરીફોસ ની માવજત ખાડા પૂરતી વખતે કરી દેવી. આંબાવાડીમાં પુખ્ત ઝાડ દિઠ ૧૦૦ કિગ્રા. છાણિયું ખાતર, ૮૦૦ ગ્રામ યુરિયા અથવા ૧.૮ કિગ્રા. અમોનિયમ સલ્ફેટ ૧.૦ કિગ્રા. સિંગલ સુપર સલ્ફેટ અને ૧.૩ કિગ્રા. મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ ખાતર ચોમાસામાં આપવું. આંબામાં મધિયાના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રીન ૨.૮ ઈસી ૫ મિલી અથવા લેમડા-સાયલેલોથ્રીન ૫ ઈસી

	<p>૧૦ મીલી પ્રતિ ૧૦ લિટર પાની સંપૂર્ણ ઝાડ ના થડ અને જાડી ડાળીઓ ઉપર છંટકાવ કરવો.</p> <ul style="list-style-type: none"> આંબાવાડીયામાં રાસાયણિક ખાતર આપ્યાના ૧૫ દિવસ પહેલા અથવા પછી બાયોફિટિલાઈઝર જેવા કે એઝોટોબેક્ટર, ૫૦ મિલી., ફોસ્ફેટ સોલ્યુબિલિઝિંગ બેક્ટેરિયા ૫૦ મિલી., પોટાશ મોબિલિઝિંગ બેક્ટેરિયા ૫૦ મિલી. અને ટ્રાયકોડર્મા ૫૦ ગ્રામ. પ્રતિ ઝાડ આપવું.
ચીકુ	<ul style="list-style-type: none"> બીજા ખાતરનો હુપ્તો ભલામણ કરેલ ખાતરનો ૨૫ ટકા ભાગ પ્રમાણે રાસાયણિક ખાતર એમોનિયમ સલ્ફેટ ૧.૩ કિગ્રા અથવા યુરિયા ૦.૬ કિગ્રા, સિંગલ સુપર ફોસ્ફેટ ૦.૮ કિગ્રા, મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ ૦.૩ કિગ્રા, છાણિયુ ખાતર ૨૫ કિગ્રા આ મહિનામાં હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે આપવું.
પશુપાલન	<p>સામાન્ય સલાહ :</p> <ul style="list-style-type: none"> પશુઓને દૂધ ઉત્પાદન અને નિભાવની જરૂરિયાત ધ્યાનમાં લઈ પૂરતા પ્રમાણમાં સમતોલ આહાર આપવો તેમજ પશુઓના રહેઠાણ ચોખ્ખા રાખવો, દિવસ દરમિયાન સમયાંતરે મળ-મૂતર નો નિકાલ કરવો. પશુઓને યોગ્ય આહારમાં જરૂરીયાત પ્રમાણે ખનિજયુક્ત મિશ્રણના સમાવેશ કરવો જોઈએ. ચાફ કટરથી લીલા તથા સૂકા ઘાસચારાને ટુકડા કરીને જ નીરણ કરવું. દુધાણા પશુઓના આઉને દૂધ દોહન પહેલા અને પછી ઝીંક ઓક્સાઈડ અથવા બોરીક પાઉડર અથવા પોટેશીયમ પરમેંગેનેટ ના ટ્રાવાણથી બરાબર સાફ કરવા. પશુઓનાં ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથીન અથવા એમીટાઝર ૨ મી.લી./લિટર પાણીમાં નાખને છાંટવી (દવાની બોટલ ઉપર લખેલી સૂચનાનો અમલ કરવો). પશુઓ જ્યારે ઈચ્છે ત્યારે પાણી પી શકે તેવી વ્યવસ્થા ઉભી કરવી જોઈએ અથવા ઓછામાં ઓછું દિવસમાં ચારથી પાંચ વખત જરૂરીયાત મુજબ પાણી પીવડાવવું જોઈએ. કોઢ/ગમાણની ઉચાઈ ૧૦ ફૂટથી વધારે રાખવી, જેથી હવાની હેરફેર સરળતાથી થઈ શકે, બફારો/ગરમી ઓછી થાય અને ભોયાતળિયાનો ભાગ સુકો રહે.
વનીકરણ	<ul style="list-style-type: none"> પ્રથમ અને બીજા વર્ષના વાવેતરમાં નિંદામણ, રોપા પર ચઢેલા વેલાની કાપણી તેમજ રોપાની આસપાસના ભાગમાં સફાઈ કરવી.
ફીશરીઝ	<ul style="list-style-type: none"> મીઠા પાણીના મત્સ્ય મીઠા પાણીના જંગા ઉત્પાદન કરતા ખેડૂતોને જાણાવવાનું કે, આ સમયગાળા દરમિયાન પૂરની માત્રામાં ખોરાક આપવોકારણ કે આ વાતાવરણ માછલી/મીઠા પાણીના જંગા માટે અનુકૂળ છે. તળાવમાં પાણીનું લેવલ જાળવવું અને વધુ વરસાદ આવે ત્યારે તળાવના આઉટલેટ થોડી માત્રામાં ખોલવા તેથી પાણીનું લેવલ જાળવાયેલું રહે. તળાવના તળિયાનું અને સપાટીનું તાપમાન સરભર કરવા એરેટર અથવા પંખ ચલાવવા.

❖ એગ્રોમેટ સલાહકાર સેવા બુલેટીન કમિટીના સભ્યો :

- ડૉ. એચ. એમ. વિરડીયા, પ્રાધ્યાપક અને વડા (સશ્ય વિજ્ઞાન)
- ડૉ. જે. જે. પરતાગીયા, પ્રાધ્યાપક અને વડા (વનસ્પતિ કીટકશાસ્ત્ર)
- ડૉ. કે. બી. રાખોલીયા, સહ પ્રાધ્યાપક (વનસ્પતિ રોગશાસ્ત્ર) :
- ડૉ. સી. જી. ઈટવાલા, સંશોધન વૈજ્ઞાનિક (શાકભાજી વિજ્ઞાન)
- ડૉ. વાય. એન. ટેડેલ, સહ પ્રાધ્યાપક (ફળ વિજ્ઞાન)
- ડૉ. વી. આર. પટેલ, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (પશુપાલન)
- ડૉ. એમ. બી. ટેડેલ, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક અને વડા (વનીકરણ)
- ડૉ. એમ. આર. પટેલ, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (ફીશરીઝ સાયન્સ)
- ડૉ. વિભા ટાક, રીસર્ચ એસોસિયેટ (જી.કે.એમ.એસ.)
- ડૉ. પી. કે. પરમાર, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (કૃષિ હવામાનશાસ્ત્ર) અને પ્રિન્સિપાલ નોડલ ઓફિસર (જી.કે.એમ.એસ.)



NAVSARI AGRICULTURAL UNIVERSITY

Gramin Krishi Mausam Sewa

Agricultural Meteorological Cell
Department of Agricultural Engineering
N. M. College of Agriculture
Navsari Agricultural University
Navsari - 396450, Gujarat
E-mail :- aasnavsari@gmail.com



(Jointly issued by Navsari Agricultural University & India Meteorological Department)

DATE OF ISSUE: 18/10/2024

Agromet Advisory Bulletin No: 58/2024 - 2025

-- Navsari District --

Weather summary of preceding week 15 October to 18 October - 2024

Sr. No.	Name of Weather Parameters	Value
1.	Range of Rainfall (mm)	0.0-2.0
2.	Range of Maximum Temperature (°C)	34.4-35.2
3.	Range of Minimum Temperature (°C)	23.5-26.5
4.	Range of Relative Humidity (%)	55-98
5.	Range of Wind Speed (km/hrs)	0.9-1.8
6.	Range of Cloud Cover (Okta)	0-8
7.	Range of bright sunshine hours (hrs)	1.3-9.1
8.	Last five days cumulative rainfall (mm)	2.0
Total Rainfall (mm)		2362.0

Weather summary of preceding week 19 October to 23 October - 2024


Sr. No.	Weathers Parameters	Day - 1 (19/10)	Day - 2 (20/10)	Day - 3 (21/10)	Day - 4 (22/10)	Day - 5 (23/10)
1.	Rainfall (mm)	4.3	3	4	6.3	0.9
2.	Maximum temperature (°C)	33	31	31	32	32
3.	Minimum Temperature (°C)	27	26	26	25	25
4.	Max. Relative Humidity (%)	83.9	88.5	88.1	85.1	80.9
5.	Min. Relative Humidity (%)	55.1	59.4	61.7	56.7	50.1
6.	Wind Speed (km/hr.)	5.8	4.2	3.6	5.5	6.6
7.	Wind Direction (Compass point)	0	121	84.3	78.7	77.5
8.	Total Cloud Cover (Okta)	6	7	5	2	1

Weather Summary/ Alert

- As per the forecast issued by India Meteorological Department over the next five days, the sky will be cloudy and there are chances of very light to light rainfall at isolated places.
- The Maximum temperature is 31 °C to 33 °C, when the Minimum temperature is 25 °C to 27 °C likely to be around.
- The humidity in the air is likely to be between 50 and 89 percent.
- The wind direction will be Easterly with an average speed of 4 to 7 km/h.
- As per extended range forecast, below normal rainfall and maximum and minimum normal temperature are expected till 29th October, 2024.

-:: South Gujarat Heavy Rainfall Zone ::-

General Advisory	<ul style="list-style-type: none"> • Provide mechanical support to horticultural and vegetable crops during forecast of high wind velocity and heavy rain. • Farmers are advised to carry out different activities of farm as per the weather condition. • Farmers are advised to complete the harvesting of kharif crops at maturity stage in clear and dry weather condition, threshing is done by drying the harvested crop in sunlight. • Farmers are advised to do the chemical spray and fertilizer application activity as per the weather condition • Download the MEGHDOOT mobile application for Agromet Advisory Services and information on weather forecasting, which will provide weather based agricultural advice to farmers for their location, crops and livestock in their local language. Click on the following link to download the MEGHDOOT application: Android users: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot IOS users: https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155 • Download the DAMINI Mobile application to ensure the safety through monitoring sky lightning activity. It will provide the alert and detail description of instruction, precaution, Do and Don't. Click on the following link to download the DAMINI application. Android users: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lighteninglive.damini IOS users: https://apps.apple.com/app/id1502385645
-------------------------	---



Crop	Weather based Agro-Advisory
Sugarcane	<ul style="list-style-type: none"> • In seed plot add Nitrogen (50 kg/ha.) Before one month of seed cutting. • Prop the sugarcanes with strong bamboos or by tying together the canes in clump to protect against rain. <p>Land preparation for new planting:</p> <ul style="list-style-type: none"> • New plantation of sugarcane crop should be done after proper preparation of land at proper moisture condition. Deep plough and level the soil. • Planting should be done from October to February. • Apply FYM/ Compost at the time of ploughing. Select healthy, diseases-insect free and immature seed materials of your selected variety. • Planting should be done at the spacing of 90 to 120 cm. 2 budded setts should be used with end to end method of planting after setts treatment with fungicide (<i>Carbendazim 50 wp @ 1g/1 lit. water</i>). If settling use intra row spacing should be 45 to 60 cm. • Within 3 days after planting and irrigation, spraying of <i>Atrazine 50 WP 80 g/10 li. water</i>. Pre-emergence weedicide should be applied to control weeds in clear weather conditions. • Application of <i>Trichoderma viride</i> in rich sugarcane pressedmed at time of planting.
Kharif Paddy	<p>Maturity Stage/Grain filling:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drain the water from the kyari 10-15 days prior to the harvesting. • Harvest the crop when there is no possibility of rainfall and sky is clear. • After harvesting properly dry the crop and threshed the grains, also dry the grains to remove moisture before storage. • After harvesting land should be plough immediately for <i>Rabi</i> crops. • If leaf Blast observed in the field, spraying of <i>Propiconazole 1 ml/lit</i> or <i>Tricychlozole 1gm/lit</i> in water under clear weather condition. • If Bacterial leaf blight observed in the field, spraying of Copper Hydroxide 53.8% DF @ 30 gm/10 lit. in water clear weather condition.

Rabi Pulse crop	<p>Land preparation/Sowing:</p> <ul style="list-style-type: none"> • After harvesting of kharif crop land should be prepared at proper moisture condition. • Rabi pulses like Indian bean, Gram, Green gram (CO-4) should be sown earliest. • Procure seed of improved varieties. • Basal recommended fertilizer applied. • Weeding should be done as per need or apply recommended pre emergence weedicide. • Apply irrigation as per soil and climatic condition. • Seed treatment with Thiram 3g/kg seed. Rhizobium seed treatment 10 ml/kg seed.
Okra	<ul style="list-style-type: none"> • Harvesting should be carried out as per the tenderness of marketable fruit • Discard damaged and diseased fruit. • Weeding should be carried out from the plot/field. • Spraying of Hexaconazole 5 EC @ 10 ml or Carbendazim 50 WP 5 g per 10 Lit of water for control of powdery mildew/leaf spot disease under clear weather condition. • Up root and burn yellow vein mosaic infected okra plant from field. • Spraying systemic insecticides for whitefly (vector) management. • Spraying of <i>Propargite</i> 57 EC @ 20 ml./10 Lit. or <i>Fenazaquin</i> 10 EC @ 10 ml./10 Lit. of water for red Spider Mite during clear weather condition.
Brinjal	<ul style="list-style-type: none"> • Transplanting should be carried out when the seedlings are 28-30 days old. • After every two days, give a water to the plants.
Tomato	<ul style="list-style-type: none"> • Transplanting should be carried out when the seedlings are 25-30 days old. • After every two days, give a water to the plants.
Chilli	<ul style="list-style-type: none"> • Seedlings of chilli become suitable for transplanting in about 35 to 40 days. • After every two days, give a water to the plants.
Cow Pea	<ul style="list-style-type: none"> • Keep the plot clean by weeding and harvesting should be carried out time to time.
Pointed gourd	<ul style="list-style-type: none"> • Remove the dried vines from the mandap of pointed gourd and to remove the excess sprouting. • Plant new saplings in gap. • Hoeing, fertilizing and irrigation should be applied in pointed gourd field.
Little gourd	<ul style="list-style-type: none"> • Remove the dried vines from the mandap of little gourd and to remove the excess sprouting. • Plant new saplings in gap. • Hoeing, fertilizing and irrigation should be applied in little gourd field.
Elephant foot yam	<ul style="list-style-type: none"> • Keeping plot clean by removing weed. • Hoeing should be carried out. • Irrigation should be given as and when required..
Greater yam	<ul style="list-style-type: none"> • Keeping plot clean by removing weed. • Give proper support or train branches of vines.
Tannia	<ul style="list-style-type: none"> • Keeping plot clean by removing weed. • Harvest the tender leaves of Tannia
Mango	<p>General Advise :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Find grubs of stem borer from gallery and holes on the stem and kill them. Do pouring of Chlorpyriphos 20 EC @ 25 ml/ 10 lit in hole and plug it with mud in clear weather condition under clear weather condition. • Provide support to the young plants of mango to protect against rain and high wind speed. • Application of 10 % Bordeaux paste in cut after pruning branches of fruit tree. • Procure healthy and disease free planting material from authorized and government nursery for the new plantation. • Prepare pit for plantation of new grafts by filling 10 kg FYM, 1 kg SSP and 1 kg MOP. Give 50 ml/10 lit water Chlorpyriphos to manage termite and ants. • Spraying of <i>Deltamethrin</i> 2.8 EC @ 5 ml. or <i>Lambda-Cyhalothrin</i> 5 EC @ 10 ml. per 10 Lit. water on tree trunk and branches for management mango hopper.

	<ul style="list-style-type: none"> • Apply recommended dose of fertilizer per tree @ 800 g Urea or 1.8 kg Ammonium Sulphate, 1.0 kg SSP and 1.3 kg MOP along with 100 kg FYM to adult tree. • In addition RDF, give biofertilizers viz., Azotobactor 50 ml, PSB 50 ml, KMB 50 ml and Trichoderma 50 g per adult tree in monsoon. Before or after 15 days of fertilizer application.
Sapota	<p>General Advise :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apply second split of 25% of RDF (Ammonium Sulphate -1.3 kg or Urea 0.6 kg, SSP 0.8 kg and MOP 0.3 kg + FYM 25 kg each tree) in clear weather condition.
Livestock	<ul style="list-style-type: none"> • Provide adequate quantity of balanced ration by considering the milk production and maintenance. • Good quality dry roughage with 15-20 kg green fodder provided to the animals, only after chaffing. • Feed silage & hay materials if available. • Before and after milking udder must be properly clean with zinc oxide or boric powder or potassium permanganate solutions. • For the control of tick and other parasites, spray <i>Deltemethrin</i> or <i>Aemitaz</i> 2 ml in 1 liter of water. • Height of animal shed should keep minimum 10 feet for aeration to maintain the floor dry and to control humidity.
Forestry	<ul style="list-style-type: none"> • Weeding climber cutting and cleaning should be carried out in first and second year plantations.
Fisheries	<ul style="list-style-type: none"> • Fresh water farmers give proper feed in fish/prawn farming for better growth rate because environment condition is very suitable. • Increase water depth and maintain water level through pond outlet. • Mixing the top and bottom water by using the aerators or pumps.

❖ **Members of Agro-Advisory Committee :**

- Dr. H. M. Viradia, Professor & Head (Agronomy)
- Dr. J. J. Pastagia, Professor & Head (Entomology)
- Dr. K. B. Rakholiya, Associate Professor (Plant Pathology):
- Dr. C. G. Intwala, Research Scientist (Vegetable Science)
- Dr. Y. N. Tandel, Associate Professor (Fruit Science)
- Dr. V. R. Patel, Assistant Professor (Animal Husbandry)
- Dr. M. B. Tandel, Assistant Professor (Forestry) & I/C Head (SAF) (Forestry)
- Dr. M. R. Patel, Assistant Professor (Fisheries Science)
- Dr. Vibha Tak, Research Associate (GKMS)
- Dr. P. K. Parmar, Assistant Professor (Agricultural Meteorology and Principal Nodal Officer (GKMS))

હવામાન આગાહી

વિગત	તારીખ	ડાંગ	નવસારી	વલસાડ
વરસાદની શ્રેણી (મી.મી.)	૧૯/૧૦/૨૦૨૪	૫.૯	૪.૩	૫.૯
	૨૦/૧૦/૨૦૨૪	૪	૩	૪
	૨૧/૧૦/૨૦૨૪	૭.૨	૪	૪
	૨૨/૧૦/૨૦૨૪	૮.૬	૬.૩	૬
	૨૩/૧૦/૨૦૨૪	૨.૧	૦.૯	૨.૭
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૧૯/૧૦/૨૦૨૪	૩૪	૩૩.૨	૩૪
	૨૦/૧૦/૨૦૨૪	૩૪	૩૧.૪	૩૫
	૨૧/૧૦/૨૦૨૪	૩૩	૩૧.૧	૩૪
	૨૨/૧૦/૨૦૨૪	૩૩	૩૧.૬	૩૫
	૨૩/૧૦/૨૦૨૪	૩૩	૩૨.૪	૩૫
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૧૯/૧૦/૨૦૨૪	૨૫	૨૬.૭	૨૭
	૨૦/૧૦/૨૦૨૪	૨૫	૨૬.૨	૨૬
	૨૧/૧૦/૨૦૨૪	૨૫	૨૫.૭	૨૬
	૨૨/૧૦/૨૦૨૪	૨૫	૨૫.૨	૨૬
	૨૩/૧૦/૨૦૨૪	૨૪	૨૫	૨૫
મહત્તમ ભેજ (%)	૧૯/૧૦/૨૦૨૪	૮૬.૮	૮૩.૯	૮૬.૯
	૨૦/૧૦/૨૦૨૪	૮૮.૭	૮૮.૫	૯૦.૪
	૨૧/૧૦/૨૦૨૪	૯૦.૫	૮૮.૧	૯૦.૫
	૨૨/૧૦/૨૦૨૪	૮૫.૭	૮૫.૧	૮૭.૬
	૨૩/૧૦/૨૦૨૪	૮૨.૪	૮૦.૯	૮૩.૬
લઘુત્તમ ભેજ (%)	૧૯/૧૦/૨૦૨૪	૫૨.૬	૫૫.૧	૫૬.૧
	૨૦/૧૦/૨૦૨૪	૫૭.૩	૫૯.૪	૬૦.૨
	૨૧/૧૦/૨૦૨૪	૬૧.૧	૬૧.૭	૬૧.૨
	૨૨/૧૦/૨૦૨૪	૫૩.૨	૫૬.૭	૫૯.૬
	૨૩/૧૦/૨૦૨૪	૪૬.૩	૫૦.૧	૫૧.૮
પવનની ગતિ(કિ.મી./કલાક)	૧૯/૧૦/૨૦૨૪	૪.૭	૫.૮	૫.૨
	૨૦/૧૦/૨૦૨૪	૩.૫	૪.૨	૩.૯
	૨૧/૧૦/૨૦૨૪	૨.૭	૩.૬	૪
	૨૨/૧૦/૨૦૨૪	૪.૧	૫.૫	૪.૭
	૨૩/૧૦/૨૦૨૪	૪.૮	૬.૬	૫.૮
પવનની દિશા. (કમ્પાસ પોઈન્ટ)	૧૯/૧૦/૨૦૨૪	E	E	E
	૨૦/૧૦/૨૦૨૪	SE	SE	E
	૨૧/૧૦/૨૦૨૪	SE	E	E
	૨૨/૧૦/૨૦૨૪	E	E	E
	૨૩/૧૦/૨૦૨૪	E	E	E
વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	૧૯/૧૦/૨૦૨૪	૬	૬	૭
	૨૦/૧૦/૨૦૨૪	૭	૭	૭
	૨૧/૧૦/૨૦૨૪	૬	૫	૬
	૨૨/૧૦/૨૦૨૪	૪	૨	૩
	૨૩/૧૦/૨૦૨૪	૨	૧	૧