



નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી

ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા

કૃષિ હવામાન સેવા

નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી

નવસારી - ૩૮૬૪૫૦, ગુજરાત.

ઈ-મેઇલ:- aasnaysari@gmail.com

(નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી અને ભારત મૌસમ વિજ્ઞાન વિભાગ દ્વારા પ્રસારિત)

તા. ૨૭/૦૮/૨૦૨૧

કૃષિ હવામાન બુલેટીન નં : ૪૩/૨૦૨૧ - ૨૦૨૨

-- નવસારી જિલ્લો --

પાછળનાં સમયનું હવામાન (તા. ૨૪ ઓગષ્ટ થી ૨૭ ઓગષ્ટ - ૨૦૨૧)

અનું. નં.	હવામાન પરિબળો	Value
૧.	વરસાદની શ્રેણી (મી.મી.)	૦.૦-૫.૦
૨.	મહત્તમ તાપમાનની શ્રેણી (સે.ગ્રે.)	૩૦.૫-૩૧.૫
૩.	લઘુત્તમ તાપમાનની શ્રેણી (સે.ગ્રે.)	૨૩.૦-૨૪.૦
૪.	ભેજની શ્રેણી (%)	૮૦-૮૫
૫.	પવનની ગતિની શ્રેણી (કિ.મી./કલાક)	૩.૫-૫.૦
૬.	વાદળની સ્થિતિની શ્રેણી (ઓક્ટા)	૪-૭
૭.	સુર્યપ્રકાશિત સમયની શ્રેણી (કલાક)	૬.૨-૮.૭
૮.	પાછળના પાંચ દિવસમાં સંચિત વરસાદ (મી.મી.)	૬.૦
કુલ વરસાદ		૧૧૨૧.૦

આઈ. એમ. ડી. દ્વારા પ્રાપ્ત હવામાન આગાહી (તા. ૨૮ ઓગષ્ટ થી ૦૧ સપ્ટેમ્બર - ૨૦૨૧)

અનું. નં.	હવામાન પરિબળો	દિવસ-૧ (૨૮/૦૮)	દિવસ-૨ (૨૯/૦૮)	દિવસ-૩ (૩૦/૦૮)	દિવસ-૪ (૩૧/૦૮)	દિવસ-૫ (૦૧/૦૯)
૧.	વરસાદ (મી.મી.)	૨	૨	૧	૮૮	૨૫
૨.	મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૩૨	૩૨	૩૨	૩૩	૩૦
૩.	લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૬	૨૬	૨૭	૨૬	૨૪
૪.	મહત્તમ ભેજ (%)	૮૮	૮૮	૮૫	૮૮	૮૧
૫.	લઘુત્તમ ભેજ (%)	૭૨	૭૧	૬૮	૭૮	૮૧
૬.	પવનની ગતિ (કિ.મી./કલાક)	૧૪	૧૨	૧૧	૮	૮
૭.	પવનની દિશા (કમ્પાસ પોઈન્ટ)	૨૧૨	૨૧૨	૨૧૨	૨૪૩	૧૬૮
૮.	વાદળની સ્થિતિની (ઓક્ટા)	૮	૮	૬	૮	૮

હવામાન સારાંશ / ચેતવણી	<ul style="list-style-type: none"> આઈ. એમ. ડી., દ્વારા મળેલી હવામાનની આગાહી મુજબ આગામી પાંચ દિવસમાં આકાશમાં વાદળાનું રહેશે અને છુટા છવાયા ભાગોમાં તારીખ ૩૧ ઓગષ્ટ ની રોજ ભારે વરસાદ ની અને તારીખ ૨૮ થી ૩૦ ઓગષ્ટ ની રોજ અતિ હળવા અને તારીખ ૦૧ સપ્ટેમ્બર ની રોજ મધ્યમ વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. મહત્તમ તાપમાન ૩૦ થી ૩૩ સે. જ્યારે લઘુત્તમ તાપમાન ૨૪ થી ૨૭ સે. આસપાસ રહેવાની સંભાવના છે. હવામાન ભેજનું પ્રમાણ ૮૮ થી ૮૧ ટકા વચ્ચે રહેવાની સંભાવના છે. પવનની દિશા દક્ષિણ-પર્યિયમ રહેશે જેની સરેરાશ ગતિ ૮ થી ૧૪ કિ.મી./કલાક રહેવાની શક્યતા છે. તારીખ ૪ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧ સુધી, લાંબા ગાળાની આગાહી મુજબ સામાન્ય થી ઉપર (૮.૭૨ મિમી.) વરસાદ પડવાની સંભાવના છે.
------------------------	--

-:: દક્ષિણ ગુજરાત ભારે વરસાદ વિસ્તાર ::-

સામાન્ય સલાહ	<ul style="list-style-type: none"> કોરોના (કોવીડ-૧૯) રોગચાળાની મહામારીના લીધે, ખેડૂત મિત્રોએ ખેતર પર જેતીની કામગીરી દરમયાન ખેત સાધનો/ઓજરો અને ખેત મજૂરો સાથે એકબીજાથી સામાજિક અંતર રાખવું અને તે માટેની સાવધાની અને સલાહમતી રાખવી તેમજ અગમયેતી જગ્યાવી. રાસાયણિક દવાઓ અને ખાતર નાખવાની પ્રવૃત્તિ હવામાનની સ્થિતિ પ્રમાણે ફર્જી. ખેડૂતોને ખેતરની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ હવામાનની સ્થિતિ મુજબ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ખેડૂત મિત્રોને એગ્રોમેટ સલાહકાર સેવા બુલેટીન સેવા માટે મેધદૂત મોબાઈલ અપલિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે, જેમાં તાપમાન, વરસાદ, ઝેજ, પવનની ગતિ અને દિશા સંબંધિત ખેડૂતોને આગાહી પૂરી પાડશે, જે કૃપિ કામગીરીમાં પાક અને પશુધનની સંભાળ કેવી રીતે લેવી તે માટે નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવે છે. <p>એન્ડ્રોઇડ યુર્જર્સ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot આઈ.ઓ.એસ. યુર્જર્સ: https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155</p>
પાક	હવામાન આધારિત કૃપિ સલાહ
ચોમાસુ ડાંગર	<p>વાનસ્પતિકવૃદ્ધિ / ફૂલ અવસ્થા:</p> <ul style="list-style-type: none"> વાનસ્પતિકવૃદ્ધિ દરમયાન ક્યારીમાં ૨-૩ સે. મી. જેટલું જ્યારે ફૂલ અવસ્થા પછી ૪-૫ સે. મી. જેટલું પાણી ભરી રાખવું ભલામણ મુજબ નાઈટ્રોજન ખાતરના હૃતા સમયસર આપવાં. પ્રથમ હપ્તો ફેરાંસાથી ૨૦-૨૫ દિવસે અને બીજે હપ્તો ફેરાંસાથી ૪૦-૪૫ દિવસે આપવો. નાઈટ્રોજન ખાતર આપતા પહેલા આગલા દિવસે ક્યારીમાંથી પાણી નિતારી દેવું. ફેરાંસાથી બાદ ૪૫ દિવસ સુધી પાક નિદાન મુક્ત રાખવો જરૂરિયાત મુજબ હાથથી નિદાન અને પેડી વીડરથી આંતરખેડ કરવી..
શેરડી	<p>વાનસ્પતિકવૃદ્ધિ અવસ્થા:</p> <ul style="list-style-type: none"> વરસાદની ખેચ સમયે પિયત આપવું. શેરડીના વધેકો માટે કાર્બોક્સ્યુરાન ઉછ ઉછ કી.ગ્રા./લે. જમીનમાં આપવું શેરડીની સફેદમાખીના નિયંત્રણ માટે ખેતરમાં ભરાયેલ પાણીનો નિકાલ કરવો.
ભીડા	<ul style="list-style-type: none"> નિદાનમણના નાશ માટે યોગ્ય પગલાં લેવા. ખેતરમાં પાણીની ભરાવો ટાળવો.

શક્કભાજુ	<ul style="list-style-type: none"> નોવેલ ૧ લિટર/૧ વીધામાં આપવું. નોવેલ પ્રવાહી ખાતર ૧૫૦ મી.લી./૧૫ લિટર પાણીમાં નાખી ઊભા પાકમાં છંટકાવ કરવો. નોવેલ પ્રવાહી ખતરનો ભાવ રૂ. ૧૨૦/- પ્રતિ લિટર છે. નોવેલ પ્લસ તથા નોવેલ પ્રાઇમ નો ભાવ રૂ. ૨૦૦/- પ્રતિ લિટર છે.
રીગણ	<ul style="list-style-type: none"> ધર્ઢવાડીયામાં જરૂર જાણાય તારે નીંદામણ, રોગ અને જીવાતનું નિયંત્રણ સમયસર કરવું. ધર્ઢના કોહવારા માટે મેન્કોઝેબ + મેટાલેકઑલ ૭૫ ડબલ્યુપી ૨૦ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. ધર્ઢ ૨૮-૩૦ દિવસનું થાય ત્યારે ફેરરોપણી કરવી.
ટામેટાં	<ul style="list-style-type: none"> ધર્ઢવાડીયામાં જરૂર જાણાય તારે નીંદામણ, રોગ અને જીવાતનું નિયંત્રણ સમયસર કરવું. ધર્ઢના કોહવારા માટે મેન્કોઝેબ + મેટાલેકઑલ ૭૫ ડબલ્યુપી ૨૦ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. ધર્ઢ ૨૫-૩૦ દિવસનું થાય ત્યારે ફેરરોપણી કરવી
મરચાં	<ul style="list-style-type: none"> સામાન્ય રીતે એક લેક્ટર વિસ્તારની ફેરરોપણી માટે એક ગુંડા વિસ્તાર માં ધર્ઢવાડિયુ તૈયાર કરવું. ધર્ઢના કોહવારા માટે મેન્કોઝેબ + મેટાલેકઑલ ૭૫ ડબલ્યુપી ૨૦ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. મરચીનું ધર્ઢ લગભગ ૩૫ થી ૪૦ દિવસે રોપવા લાયક બને છે.
ચોળી	<ul style="list-style-type: none"> ચોમાસાની ઋતુ માટે વાવણી કરી શકાય છે. ચોળીનું વાવેતર બે હાર વચ્ચે 30×45 સે.મી. અંતર રાખી કરવું. એક લેક્ટરના વિસ્તાર માટે ૧૨-૧૫ કિ.ગ્રા. બિયારણની જરૂર પડે છે.
વેલાવાળા શક્કભાજુ પાકો	<ul style="list-style-type: none"> વાવણીબાદ ૧૦ થી ૧૨ દિવસે કરબడીથી આંતર એડ કરવી. ત્યારબાદ ૨ થી ૩ વખત હાથથી નીંદામણ કરતાં રહેવું.
સુરણ	<ul style="list-style-type: none"> નિદાંમણના નાશ માટે યોગ્ય પગલાં લેવા. ખેતરમાં પાણીની ભરાવો ટાળવો.
રતાળુ	<ul style="list-style-type: none"> નિદાંમણના નાશ માટે યોગ્ય પગલાં લેવા. વેલાની પ્રશાખાઓને ટેકા પર ચઢાવવી અને ખેતરમાં પાણીની ભરાવો ટાળવો.
તાનિયા	<ul style="list-style-type: none"> નિદાંમણના નાશ માટે યોગ્ય પગલાં લેવા. ખેતરમાં પાણીની ભરાવો ટાળવો. “પાતરા” નામની વાનગી બનાવવા માટે કુમળા પાનની વીણી શરૂ કરી દેવી જોઈએ.
આંબા	<p>સામાન્ય સલાહ:</p> <ul style="list-style-type: none"> આંબાના મેઠની ઈયણો થડમાંથી શોધીને મારી નાખો અને કાણાંની અંદર મી.લી./લી. ટ્રાવણ નાંખી કાદવથી કાણાં બંધ કરી દેવા. <p style="text-align: right;">કલોરપાયરોફોસ ૨૫</p>

	<ul style="list-style-type: none"> આંબા નવી વાડી બનાવવા તંદુરસ્ત અને રોગમુક્ત કલમો અધિકૃત અને સરકારી નર્સરી માંથી મેળવવી જોઈએ. નવી કલમો માટે તૈયાર કરેલ ખાડામાં ૧૦ કિગ્રા. છાણિયું ખાતર, ૧ કિગ્રા. સુપર અને ૧ કિગ્રા. પોટાશ ખાતર આપવું. ઉધૃઠ અને કીડીનો ઉપદ્રવ કલમોમાં જોવા મળે તો ૫૦ મિલી પ્રતિ ૧૦ લીટર લોરપાયરેફોસ ની માવજત ખાડા પૂરતી વખતે કરી દેવી. આંબાવાડીમાં પુષ્ટ ઝડપ હિં ૧૦૦ કિગ્રા. છાણિયું ખાતર, ૧૦૦ ગ્રામ યુરિયા અથવા ૧.૮ કિગ્રા. સુપર અને ૧.૨ કિગ્રા. સ્યુરેટ ઓફ પોટાશ ખાતર ચોમાસામાં આપવું. આંબાવાડીયામાં રાસાયણિક ખાતર આપ્યાના ૧૫ દિવસ પહેલા અથવા પછી બાયોકેર્ટિવાઈઝર જેવા કે એઝોટોબેક્ટર, ૫૦ મિલી., ફોસ્ફેટ સોલ્યુબિલિઝિંગ બેક્ટેરિયા, ૫૦ મિલી., પોટાશ મોબિ લિઝિંગ બેક્ટેરિયા ૫૦ મિલી. અને ટ્રાયકોર્મા ૧૦૦ ગ્રામ. પ્રતિ ઝડપ આપવું. ૩૦ વર્ષ થી વધુ જૂની આંબાવાડીયામાં વહેલો મોર લાવવા માટે ઓગસ્ટના પહેલા અઠવાડિયામાં પેકલોબ્યુટ્રાઝોલ પ ગ્રામ સંક્રિય નત્વ (કલ્ટાર ૨૦ મિલી. પ્રતિ ૧૦ લીટર) ને પ્રતિ ઝડપ પ્રમાણે ફરતે રોંગ બનાવી દરેરીને આપવું. ડાળીનો સુકારો : રોગીએ ડાળીઓ કાપી, કપાયેલા ભાગ પર ૧૦ ટકા બોરેક્સ પેસ્ટ લગાડવું તેમજ કાર્બન્ડાઝિમ ૫૦ ડબલ્યુ પી ૧૦ ગ્રા. પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.
ચીકુ	<p>સામાન્ય સલાહ:</p> <ul style="list-style-type: none"> બીજા હપ્તામાં ભલામણ કરેલ ખાતરનો ૫૦ ટકા ભાગ પ્રમાણે રાસાયણિક ખાતર એમોનિયમ સફ્ટેક્ટ ૨.૫ કિગ્રા. અથવા યુરિયા ૧.૩ કિગ્રા., સિંગલ સુપર ફોસ્ફેટ ૧-૨ કિગ્રા., સ્યુરેટ ઓફ પોટાશ ૦.૫ કિગ્રા., છાણિયું ખાતર ૫૦ કિગ્રા. અને બાયોકેર્ટિવાઈઝર (૫૦ મી.લી. - ૫૦ મી.લી. એઝોટોબેક્ટર, ફોસ્ફેટ સોલ્યુબિલિઝિંગ બેક્ટેરિયા અને પોટાશ મોબિ લિઝિંગ બેક્ટેરિયા) આ મહિનામાં આપવું.
પશુપાલન	<p>સામાન્ય સલાહ:</p> <ul style="list-style-type: none"> પશુઓને પૂરતા પ્રમાણમાં સમતોલ આહાર આપવો, જેમાં દાણ તેમજ પશુઓના રહેઠાણ ચોખા રાખવા, દિવસ દરમયાન સમયાંતરે મળ-મૂતર નો નિકાલ કરવો. પશુઓને ઘોગ્ય આહારમાં જરૂરીયાત પ્રમાણે ખનિજયુક્ત મિશ્રણના સમાવેશ કરવો જોઈએ. ચાદ્ર કટરથી ધાસચારાને ટુકડા કરીને જ નીરણ કરવું. દૂધાળા પશુઓના આઉને દૂધ દોહન પહેલા અને પછી ઝીક ઓક્સાઈટ અથવા બોરીક પાઉડર અથવા પોટેશીયમ પરમેગેનેટ ના ટ્રાવાળથી બરાબર સાદ્ધ કરવા. પશુઓના ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેવટમેથીન અથવા એમીટાઇર ૨ મી.લી./લિટર પાણીમાં નાખોની છાંટવી (દવાની બોટલ ઉપર લખેલી સૂચનાનો અમલ કરવો). પશુઓ જયારે છંદ્ધે ત્યારે પાણી પી શકે તેવી વ્યવસ્થા ઉભી કરવી જોઈએ અથવા ઓછામાં ઓછુ દિવસમાં ચારથી પાંચ વખત જરૂરીયાત મુજબ પાણી પીવડાવવું જોઈએ.

	<ul style="list-style-type: none"> યોમાસાની શરૂઆત થતી હોઈ પશુઓના રહેઠાણમાં વરસાદી પાણીનો ભરાવો ના થાય તે ગ્રમાણે કોઢ/ગમાણના ભોયાતળિયાનો ઢોળાવ અપાવો. કોઢ/ગમાણની ઉચાઈ ૧૦ ફૂટથી વધારે રાખવી, જેથી હવાની હેરફેર સરળતાથી થઈ શકે, બજારો/ગરમી ઓછી થાય અને ભોયાતળિયાનો ભાગ સુકો રહે. સતત પુષ્કળ વરસાદમાં નાના વાધરડા-પાડીયા કે અન્ય પુષ્ણત પશુ સતત લાંબા સમય સુધી ભીજાય નહિ તે માટે તાપત્રી/પતરાનો શેડ કે પાકી ગમાણ હેઠળ રાખવા. ખૂબ વીજળી અને વરસાદના સમયે પશુ વૃક્ષ નીચે બાંધવા નહિ.
વનીકરણ	<p>કૃષિ વનીકરણ : વાવેતર :</p> <ul style="list-style-type: none"> પ્રથમ બને બીજા વર્ષના વાવેતર દરમ્યાનમાં નિદાન અને સફાય કરવી જોઈએ. જરૂરિયાત મુજબ વાવેતરમાં સિંચાઈ કરવી જોઈએ.
ફીશરીઝ	<p>સામાન્ય સલાહ :</p> <ul style="list-style-type: none"> મીઠા પાણીના મરસ્ય/મીઠા પાણીના છંગા ઉત્યાદન કરતા ખેડૂતોને જણાવવાનું કે , આ સમયગાળા દરમ્યાન પૂરતી માત્રામાં ખોરાક આપવોકારણ કે આ વાતાવરણ માછલી/મીઠા પાણીના છંગા માટે અનુકૂળ છે. તળાવમાં પાણીનું લેવલ જાળવવું. તળાવના તળિયાનું અને સપાટીનું તાપમાન સરખર કરવા એરેટર અથવા પંખ ચલાવવા.

❖ એગ્રોમેટ સલાહકાર સેવા બુલેટીન કમિટીના સભ્યો :

- ડૉ. એચ. એમ. વિરદીયા, સંશોધન વૈજ્ઞાનિક (સથય વિજ્ઞાન)
- ડૉ. એલ. વી. ઘેર્ટીયા, સહ પ્રાધ્યાપક (વનસ્પતિ કીટકશાસ્ત્ર)
- ડૉ. કે. બી. રાખોલીયા, સહ પ્રાધ્યાપક (વનસ્પતિ રોગશાસ્ત્ર)
- ડૉ. એસ. એન. સરવૈયા, પ્રધ્યાપક (શાકભાજી વિજ્ઞાન)
- ડૉ. વાય. એન. ટેલ, સહ પ્રાધ્યાપક (ફળ વિજ્ઞાન)
- ડૉ. વી. આર. પટેલ, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (પશુપાલન)
- ડૉ. હિલેશ્વર નાયક, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (વનીકરણ)
- ડૉ. એમ. આર. પટેલ, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (ફીશરીઝ સાયન્સ)
- ડૉ. વિભા ટાક, રીસર્ચ એસોસીયેટ (જ.કે.એમ.એસ.)
- ડૉ. પી. કે. પરમાર , મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (કૃષિ હવામાનશાસ્ત્ર) અને પ્રિન્સિપાલ નોટ્સ ઓફિસર (જ.કે.એમ.એસ.)



NAVSARI AGRICULTURAL UNIVERSITY

Gramin Krishi Mausam Sewa

Agricultural Meteorological Cell
 Navsari Agricultural University
 Navsari – 396450, Gujarat
 E-mail :- aasnnavsari@gmail.com



(Jointly issued by Navsari Agricultural University & India Meteorological Department)

DATE OF ISSUE: 27/08/2021

Agromet Advisory Bulletin No: 43/2021 - 2022

-- Navsari District --

Weather summary of preceding week 24 August to 27 August - 2021

Sr. No.	Name of Weather Parameters	Value
1.	Range of Rainfall (mm)	0.0-6.0
2.	Range of Maximum Temperature (°C)	30.5-31.5
3.	Range of Minimum Temperature (°C)	23.0-24.0
4.	Range of Relative Humidity (%)	80-96
5.	Range of Wind Speed (km/hr)	3.6-5.0
6.	Range of Cloud Cover (Okta)	4-7
7.	Range of bright sunshine hours (hrs)	6.2-8.7
8.	Last five days cumulative rainfall (mm)	6.0
Total Rainfall (mm)		1121.0

IMD based Weather forecast for 28 August to 01 September - 2021


Sr. No.	Weathers Parameters	Day - 1 (28/08)	Day - 2 (29/08)	Day - 3 (30/08)	Day - 4 (31/08)	Day - 5 (01/09)
1.	Rainfall (mm)	2	2	1	88	25
2.	Maximum temperature (°C)	32	32	32	33	30
3.	Minimum Temperature (°C)	26	26	27	26	24
4.	Max. Relative Humidity (%)	89	88	85	88	91
5.	Min. Relative Humidity (%)	72	71	68	68	81
6.	Wind Speed (km/hr.)	14	12	11	9	9
7.	Wind Direction (Compass point)	212	212	212	243	198
8.	Total Cloud Cover (Okta)	8	8	6	8	8

Weather Summary/ Alert	<ul style="list-style-type: none"> As per IMD weather forecasts over the next five days, the sky will be cloudy and there is chance of heavy rainfall on 31th August and very light rainfall on 28th – 30th August and medium rainfall on 01st September occurs at isolated places . The Maximum temperature 30 to 33 °C. when the Minimum temperature is 24 to 27 °C. likely to be around. The humidity in the air is likely to be between 68 and 91 percent. The wind direction will be South-West with an average speed of 9 to 14 km/h. As per Extended range forecast, possibility of rainfall in Gujarat region is likely to be above normal (6.72 mm) up to 4th September, 2021.
-----------------------------------	---

-:: South Gujarat Heavy Rainfall Zone ::-

General Advisory	<ul style="list-style-type: none"> • Due to pandemic of CORONA (COVID-19), Farmers should maintain social distancing and safety precaution while handling farm machines and labour in the field. • Do the activity of spraying chemical and applying fertilizer as per the weather condition. • Farmers are advised to carry out different activities of farm as per the weather condition. • Download the MEGHDOOT mobile application, We will provide forecast to farmers relating to temperature, rainfall, humidity, wind speed and direction which play critical roles in agricultural operations and how to take care of the crops and livestock. Click on the following link to download the MEGHDOOT application. <p>Android users: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot IOS users: https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155</p>
-------------------------	---

NOAA/VIIRS/BLENDED NDVI Composite ending on Week no 33
(13.08.2021 to 19.08.2021) over Agricultural region



Agricultural vigour is moderate over isolated places of the state.

Crop	Weather based Agro-Advisory
Kharif Paddy	<p>Vegetative stage/Flowering stage:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keeps 2-3 cm standing water in field during vegetative growth and 4-5 cm during flowering onward. • Apply split dose of Nitrogen fertilizer as per recommendation. i.e. 1st dose at 20-25 days after transplanting - 40 kg N/ ha and 2nd dose at 40-45 days after transplanting - 20 kg/ha. • Drain the water from field one day before application of fertilizer. • Keep field weed free by hand weeding and interculturing with paddy weeder upto 45 days after transplanting.
Sugarcane	<p>Vegetative stage:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In case of extended dry spell of rainfall apply irrigation as per requirement. • Application of <i>Carbofuran 3G</i> @ 33 kg/ha. in soil for control of sugarcane borer. • Drain stagnant water from the field for management of sugarcane whitefly.
Okra	<ul style="list-style-type: none"> • Take measures for weed control.

	<ul style="list-style-type: none"> Avoid water logging in the field.
Vegetable Crop	<ul style="list-style-type: none"> Give Novel 1 lit./Vigha in soil. Spray Novel 150 ml./15 lit. of water on standing crop. The rate of NOLF for 1 lit. is 120 Rs. NOLF (Novel plus) and NOLF (Novel prime) 200 Rs/lit.
Brinjal	<ul style="list-style-type: none"> Timely take control measures of weeds, diseases and pests when required in the nursery. Spraying of <i>Mancozeb + Metalaxyl 75wp</i> 20gm/10 lit.water for management of damping off. Improve drainage. Transplanting should be carried out when the seedlings are 28-30 days old.
Tomato	<ul style="list-style-type: none"> Timely take control measures of weeds, diseases and pests when required in the nursery. Spraying of <i>Mancozeb + Metalaxyl 75wp</i> 20gm/10 lit.water for management of damping off. Improve drainage. Transplanting should be carried out when the seedlings are 25-30 days old.
Chilli	<ul style="list-style-type: none"> Nursery is usually prepared in one Goontha area for transplanting of one hectare area. Spraying of <i>Mancozeb + Metalaxyl 75wp</i> 20gm/10 lit.water for management of damping off. Improve drainage. Seedlings of chilli become suitable for transplanting in about 35 to 40 days.
Cowpea	<ul style="list-style-type: none"> Sowing of seed is carried out. Spacing: 30 x 45 cm. 12-15 kg seeds are required for one hectare area.
Gourds	<ul style="list-style-type: none"> Ten to twelve days after sowing, intercultural operations can be carried out with hoe (gardening tool). Then manual weeding can be carried out 2-3 times.
Elephant foot yam	<ul style="list-style-type: none"> Take measures for weed control. Avoid water logging in the field.
Greater yam	<ul style="list-style-type: none"> Take measures for weed control. Give proper support or train branches of vines and avoid water-logging condition in field.
Tannia	<ul style="list-style-type: none"> Take measures for weed control. Avoid water logging in the field. Harvest the tender leaves of Tannia for making “paatra”.
Mango	<p>General Advise :</p> <ul style="list-style-type: none"> Find grubs of stem borer from gallery and holes on the stem and kill them. Do pouring of <i>Chlorpyrifos 20 EC</i> @ 25 ml/ 10 lit. in hole and plug it with mud. Procure healthy and disease free planting material from authorized and government nursery for the new plantation.

	<ul style="list-style-type: none"> • Prepare pit for plantation of new grafts by filling 10 kg <i>FYM</i>, 1 kg <i>SSP</i> and 1 kg <i>MOP</i>. Give 50 ml. /10 lit. <i>Chlorpyrifos</i> to manage termite and ants. • Apply recommended dose of fertilizer per tree @ 700 g <i>Urea</i> or 1.8 kg <i>Ammonium Sulphate</i>, 1.0 kg <i>SSP</i> and 1.2 kg <i>MOP</i> along with 100 kg <i>FYM</i> to adult tree. • In addition RDF, give biofertilizers viz., <i>Azotobacter</i> 50 ml, <i>PSB</i> 50 ml, <i>KMB</i> 50 ml and <i>Trichoderma</i> 100 g per adult tree in monsoon. Before or after 15 days of fertilizer application. • Do drenching of <i>Paclobutrazol</i> 5 g a.i. (Cultar 20 ml. per 10 lit.) per tree in the first week of August to get early flowering in mango of more than 30 years old orchard. • Die back disease: Pruning of infected branches, apply 10 % Bordeaux paste and spraying <i>Carbendazim</i> 50 wp, 10gm/10 lit water.
Sapota	<p>General Advise :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apply second split of 50% of RDF (<i>Ammonium Sulphate</i> -2.5 kg or <i>Urea</i> 1.3 kg, <i>SSP</i> 1-2 kg and <i>MOP</i> 0.5 kg + <i>FYM</i> 50kg + <i>Azotobacter</i>, <i>PSB</i> and <i>KMB</i> @ 50 ml of each tree).
Livestock	<p>General Advise :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provide adequate quantity of balanced ration, including compound concentrate mixture 6-8 kg good quality dry roughage with 15-20 kg green fodder to the animals. • Feed silage & hay materials if available. • Before and after milking udder must be properly clean with zinc oxide or boric powder or potassium permanganate solutions. • For the control of tock and other parasites, spray <i>Deltemethrin</i> or <i>Aemitaz</i> 2 ml in 1 liter of water. • In rainy season, give sufficient slop on the floor of animal shed to avoid water logging. • Height of animal shed should keep minimum 10 feet for aeration to maintain the floor dry and to control humidity. • Don't keep the animal under tree when there is heavy lightning during rain.
Forestry	<p>Agro Forestry : Plantations :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Weeding and cleaning should be done during first and second year plantations. • Irrigation should be done as per the requirement in tree plantation.
Fisheries	<p>General Advise :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fresh water farmers give proper feed in fish/prawn farming for better growth rate because environment condition is very suitable. • Increase water depth.

- Mixing the top and bottom water by using the aerators or pumps.

❖ **Members of Agro-Advisory Committee :**

- Dr. H. M. Viradia, Research Scientist (Agronomy)
- Dr. L. V. Ghetiya, Associate Professor (Entomology)
- Dr. K. B. Rakholiya, Associate Professor (Plant Pathology):
- Dr. S. N. Saravaiya, Professor (Vegetable Science)
- Dr. Y. N. Tandel, Associate Professor (Fruit Science)
- Dr. V. R. Patel, Assistant Professor (Animal Husbandry)
- Dr. Dileswar Nayak, Assistant Professor (Forestry)
- Dr. M. R. Patel, Assistant Professor (Fisheries Science)
- Dr. Vibha Tak, Research Associate(GKMS)
- Dr. P. K. Parmar, Assistant Professor (Agricultural Meteorology and Principal Nodal Officer (GKMS))



NAVSARI AGRICULTURAL UNIVERSITY
AMFU_Navsari

જવામાન આગાહી

વિગત	તારીખ	દંગ	નવસારી	વલસાડ
વરસાદ (મી.મી.)	૨૮/૦૮/૨૦૨૧	૧	૨	૨
	૨૯/૦૮/૨૦૨૧	૧	૨	૨
	૩૦/૦૮/૨૦૨૧	૧	૧	૨
	૩૧/૦૮/૨૦૨૧	૧૬	૮૮	૭૮
	૦૧/૦૯/૨૦૨૧	૨૦	૨૫	૨૫
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૮/૦૮/૨૦૨૧	૩૨	૩૨	૩૨
	૨૯/૦૮/૨૦૨૧	૩૨	૩૨	૩૨
	૩૦/૦૮/૨૦૨૧	૩૨	૩૨	૩૨
	૩૧/૦૮/૨૦૨૧	૩૩	૩૩	૩૩
	૦૧/૦૯/૨૦૨૧	૩૦	૩૦	૩૦
વધુતમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૮/૦૮/૨૦૨૧	૨૬	૨૬	૨૬
	૨૯/૦૮/૨૦૨૧	૨૬	૨૬	૨૬
	૩૦/૦૮/૨૦૨૧	૨૭	૨૭	૨૭
	૩૧/૦૮/૨૦૨૧	૨૬	૨૬	૨૬
	૦૧/૦૯/૨૦૨૧	૨૪	૨૪	૨૪
મહત્તમ ભેજ (%)	૨૮/૦૮/૨૦૨૧	૮૮	૮૮	૮૮
	૨૯/૦૮/૨૦૨૧	૮૭	૮૮	૮૭
	૩૦/૦૮/૨૦૨૧	૮૩	૮૫	૮૩
	૩૧/૦૮/૨૦૨૧	૮૮	૮૮	૮૮
	૦૧/૦૯/૨૦૨૧	૮૦	૮૧	૮૦
વધુતમ ભેજ (%)	૨૮/૦૮/૨૦૨૧	૬૮	૭૨	૬૮
	૨૯/૦૮/૨૦૨૧	૬૬	૭૧	૬૬
	૩૦/૦૮/૨૦૨૧	૬૩	૬૮	૬૩
	૩૧/૦૮/૨૦૨૧	૬૫	૬૮	૬૫
	૦૧/૦૯/૨૦૨૧	૬૬	૭૧	૭૬
પવનની ગતિ(ક્રિ.મી./કલાક)	૨૮/૦૮/૨૦૨૧	૧૪.૭	૧૪.૨	૧૪.૭
	૨૯/૦૮/૨૦૨૧	૧૨.૪	૧૨	૧૨.૪
	૩૦/૦૮/૨૦૨૧	૧૧.૧	૧૦.૫	૧૧.૧
	૩૧/૦૮/૨૦૨૧	૮.૬	૮.૭	૮.૬
	૦૧/૦૯/૨૦૨૧	૮.૪	૮	૮.૪
પવનની દિશા (ક્રમપાસ પોઈન્ટ)	૨૮/૦૮/૨૦૨૧	SW	SW	SW
	૨૯/૦૮/૨૦૨૧	SW	SW	SW
	૩૦/૦૮/૨૦૨૧	SW	SW	SW
	૩૧/૦૮/૨૦૨૧	SW	SW	SW
	૦૧/૦૯/૨૦૨૧	NW	S	NW
વાદળની સ્થિતિની (ઓક્ટા)	૨૮/૦૮/૨૦૨૧	૯	૮	૯
	૨૯/૦૮/૨૦૨૧	૯	૮	૯
	૩૦/૦૮/૨૦૨૧	૯	૯	૯
	૩૧/૦૮/૨૦૨૧	૮	૮	૮
	૦૧/૦૯/૨૦૨૧	૮	૮	૮