



ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા

કૃષિ હવામાન સેવા

નવસારી કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલય

નવસારી - ૩૮૬૪૫૦, ગુજરાત.

E-mail:- aasnavsari@gmail.com



(નવસારી કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલય અને ભારત મૌસમ વિજ્ઞાન વિભાગદ્વારા પ્રસારિત)

તા. ૨૩/૧૨/૨૦૨૨

કૃષિ હવામાન બુલેટીન નં : ૭૭/ ૨૦૨૨ - ૨૦૨૩

-- નવસારી જિલ્લો --

પાછળનાં સમયનું હવામાન (તા. ૨૦ ડિસેમ્બર થી ૨૩ ડિસેમ્બર-૨૦૨૨)

અનું. નં.	હવામાન પરિબળો	Value
૧.	વરસાદની શ્રેણી (મી.મી.)	૦.૦
૨.	મહત્તમ તાપમાનની શ્રેણી (સે.ગ્રે.)	૩૨.૦-૩૩.૦
૩.	લઘુત્તમ તાપમાનની શ્રેણી (સે.ગ્રે.)	૧૩.૫-૧૮.૦
૪.	ભેજની શ્રેણી (%)	૩૨-૭૯
૫.	પવનની ગતિની શ્રેણી (કિ.મી./કલાક)	૨.૨-૩.૩
૬.	વાદળની સ્થિતિની શ્રેણી (ઓક્ટાક)	૦-૦
૭.	સુર્યપ્રકાશિત સમયની શ્રેણી (કલાક)	૮.૦-૮.૧
૮.	પાછળના પાંચ દિવસમાં સંચિત વરસાદ (મી.મી.)	૦.૦
કુલ વરસાદ		૨૪૨૦.૦

આઈ. એમ. ડી. દ્વારા પ્રાપ્ત હવામાન આગાહી (તા ૨૪ ડિસેમ્બર થી ૨૮ ડિસેમ્બર-૨૦૨૨)


અનું. નં.	હવામાન પરિબળો	દિવસ-૧ (૨૪/૧૨)	દિવસ-૨ (૨૫/૧૨)	દિવસ-૩ (૨૬/૧૨)	દિવસ-૪ (૨૭/૧૨)	દિવસ-૫ (૨૮/૧૨)
૧.	વરસાદ (મી.મી.)	૦	૦	૦	૦	૦
૨.	મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૩૦	૩૧	૩૨	૩૨	૩૩
૩.	લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૧૭	૧૭	૧૮	૧૮	૧૮
૪.	મહત્તમ ભેજ (%)	૩૨	૩૫	૪૫	૫૦	૫૧
૫.	લઘુત્તમ ભેજ (%)	૨૭	૨૨	૨૮	૩૦	૩૩
૬.	પવનની ગતિ (કિ.મી./કલાક)	૧૨.૪	૧૦.૬	૮.૪	૮.૭	૮.૬
૭.	પવનની દિશા (ક્રમાસ પોઇન્ટ)	૧૫	૨૨	૬૮	૬૮	૬૪
૮.	વાદળની સ્થિતિની (ઓક્ટાક)	૦	૦	૦	૧	૦

હવામાન સારાંશ/ ચેતવણી	<ul style="list-style-type: none"> આઈ. એમ. ડી. , દ્વારા મળેલી હવામાનની આગાહી મુજબ આગામી પાંચ દિવસમાં આકાશ ચોખ્ખું રહેશે વરસાદ પડવાની સંભાવના નથી. મહત્તમ તાપમાન ૩૦ થી ૩૩ સે . જ્યારે લઘુત્તમ તાપમાન ૧૭ થી ૧૮ સે . આસપાસ રહેવાની સંભાવના છે. હવામાન ભેજનું પ્રમાણ ૨૨ થી ૫૧ ટકા વરચે રહેવાની સંભાવના છે. પવનની દિશા ઉત્તર-પૂર્વિય રહેશે જેની સરેરાશ ગતિ ૮.૪ થી ૧૨.૪ કિ.મી./કલાક રહેવાની શક્યતા છે.
--------------------------	--

-:: દક્ષિણ ગુજરાત ભારે વરસાદ વિસ્તાર ::-

સામાન્ય સલાહ <ul style="list-style-type: none"> કોરોના (કોવીડ-૧૯) રોગચાળાની મહામારીના લીધે, બેદૂત મિત્રોએ બેનર પર બેતીની કામગીરી દરમાન બેત સાધનો/ઓજરો અને બેત મજૂરો સાથે એકબીજાથી સામાજિક અંતર રાખવું અને તે માટેની સાવધાની અને સલામતી રાખવી તેમજ અગમયેતી જગવવી. જો પવનની ગતિ ૧૫ કિમી પ્રતિ કલાક કરતાં વધુ હોય તો બેનરમાં કેમિકલ જેવાં જંતુનાશક તથા કૂગનાશક દવાની જોડે ડીટરજન્ટ પાઉર અથવા સ્ટીકર (ગુંદરીયુ)નો છંટકાવ ન કરવો ઉભા પાકોમાં રોગ-જીવાતના ઉપદ્રવનું નિયમિત નિરીક્ષણ કરી ભલામણ મુજબના પાક સંરક્ષણના પગલા વેવા જો પિયત ની સગવડના હોય તો પાણી અને ખાતર જરૂરિયાત મુજબ આપવા. કૃષિ હવામાન સલાહકારી બુલેટિન અને હવામાનની આગાહી અંગેની મેળવવાં માટે ડાઉનલોડ કરો મેઘદૂત મોબાઈલ એપ્લિકેશન, જે બેદૂતોને તેમની સ્થાનિક ભાષામાં સ્થાન, પાક અને પશુધન વિશે હવામાનાધારિત કૃષિ સલાહ પ્રદાન કરશે . મેઘદૂત એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો:
<p>અન્ડ્રોઇડ યુર્જર્સ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot</p> <p>આઈ.ઓ.એસ. યુર્જર્સ: https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155</p> <p>આઈ.ઓ.એસ. યુર્જર્સ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightening.live.damini</p> <p>આઈ.ઓ.એસ. યુર્જર્સ: https://apps.apple.com/app/id1502385645</p>

NOAA/VIRS/BLENDED NDVI Composite ending on Week no 50
(10.12.2022 to 16.12.2022) over Agricultural region



પાક	હવામાન આધારિત કૃષિ સલાહ
શેરડી <ul style="list-style-type: none"> શેરડીના પાકમાં આજુભાજુના સાંદાઓને બાંધી ટેવા જેથી વધુ પવનની ઝડપ સામે ટકી શકે. નવી રોપણી માટે જરૂરી તૈયારી: શેરડીની નવી રોપણી માટે યોગ્ય બેજની પરિસ્થિતિમાં જમીન તૈયાર કરવી. શેરડીની રોપણી ઓક્ટોબર-ફેબ્રુઆરી માસ દરમાન કરવી. બેડ વખતે ખાતર/ક્રમોસ્ટ જમીનમાં ભેગવવું. રોપણી પહેલા પાયાનું ખાતર આપવું. રોપણી માટે કુમળું અને તંદુરસ્ત નમારી પસંદગીની જાતનું બિયારણ વાપરવું. રોપણી માટે બે લાઈન વરચે ૮૦ થી ૧૨૦ સેમી. અંતર રાખી બે આંખના કટકાને બીજમાવજત આપી (કાર્બનાયિમ ૫૦ ડબલ્યુ પી ૧ ગ્રા./૧ લીટર પાણી) એક પછી એક કટક ચાસમાં રહે તે રીતે રોપણી કરવી. એક આંખના રોપણનું વાવેતર કરવાનું હોય તો લાઈનમાં બે રોપા વરચે ૪૫ થી ૬૦ સેમી. અંતર ચાંખી રોપણી કરવો. રોપણી બાદ પિયત આપી ત દિવસમાં એટ્રાઇન/મ ૫૦ ડબલ્યુ પી પ્રી ઈમરજન્સ (૮૦ ગ્રામ./૧૦ લી. પાણી) નીદણનાશક નો છંટકાવ હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે કરવો. રોપણી સમયે શેરડીમાં ટ્રાઇક્સર્મા વિરાઇઝનો ઉપયોગ કરવો. 	
શીયાળ કઢોળ <p>વાનસ્પતિક વિકાસ અવસ્થા:</p> <ul style="list-style-type: none"> પાક નીદણ મુકત રાખવું. આ માટે જરૂરી જણાય તો વાવળી બાદ તૂરેત ભલામણ મુજબની નીદણનાશક દવાનો જમીન ઉપર છંટકાવ કરવો. જરૂરિયાત મુજબ પ્રિયત આપવું. 	
રીંગણુ <ul style="list-style-type: none"> જરૂરિયાત મુજબ પ્રિયત આપવું. પાન કથીરીના નિયંત્રણ માટે પ્રોપર્ટીએટ ૫૭ ઈસી ૨૦ મિલી./૧૦ લીટર અથવા ફેનાઝાકવીન ૧૦ ઈસી ૧૦ મિલી./૧૦ લીટર પાણીમાં ભેગવી પાક ઉપર શાંત પવનની સ્થિતિમાં છંટકાવ કરવો. 	
ટામેટાં <ul style="list-style-type: none"> જરૂરિયાત મુજબ પ્રિયત આપવું. 	
મરચાં <ul style="list-style-type: none"> જરૂરિયાત મુજબ પ્રિયત આપવું. 	

	<ul style="list-style-type: none"> મરચાંના પાકમાં કાલવાણ રોગનાં નિયંત્રણ માટે ૧૦ ગ્રામ/૧૦ લી. કાર્બેન્ડાજીમ અથવા ૧૦ મિલી./૧૦ લી. પ્રોપીકોનોઝોલ પાણીમાં બેળવી ૧૦ દિવસ ની અંતરે એ વાર છંટકાવ કરવો.
પરવળ	<ul style="list-style-type: none"> નિદાંમણુના નાશ માટે યોગ્ય પગલાં લેવા. જરૂરિયાત મુજબ પિયત આપવું. ફળોની વીજુણી સમયાંતરે કરતા રેહવું.
દિંગોળા	<ul style="list-style-type: none"> નિદાંમણુના નાશ માટે યોગ્ય પગલાં લેવા. જરૂરિયાત મુજબ પિયત આપવું. ફળોની વીજુણી સમયાંતરે કરતા રેહવું.
સુરણ	<ul style="list-style-type: none"> નિદાંમણુના નાશ માટે યોગ્ય પગલાં લેવા. જરૂરિયાત મુજબ પિયત આપવું. કન્દની લાણણી શરૂ કરવી.
રતાળુ	<ul style="list-style-type: none"> નિદાંમણુના નાશ માટે યોગ્ય પગલાં લેવા. જરૂરિયાત મુજબ પિયત આપવું. રતાળુના કન્દની લાણણી શરૂ કરવી.
તાનિયા	<ul style="list-style-type: none"> નિદાંમણુના નાશ માટે યોગ્ય પગલાં લેવા. યોગ્ય કુમળા પાનની વીજુણી શરૂ કરવી. જરૂરિયાત મુજબ પિયત આપવું.
શક્કરિયા	<ul style="list-style-type: none"> જરૂરિયાત મુજબ પિયત આપવું.
આંબા	<p>સામાન્ય સલાહ:</p> <ul style="list-style-type: none"> આંબાના મેઠની દીયળો થડમાંથી શોધીને મારી નાખો અને કાણુંની અંદર કલોરપાયરીફોસ ૨૦ ઈસી ૨૫ મી.લી./૧૦ લી. દ્રાવણ નાંખી કાદવથી કાણું બંધ કરી દેવા હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે આપવું. આંબામાં વહેલો મોર લાવવા માટે પોટેશિયમ નાઈટ્રોટ ૧% (૧ કિગ્રા./૧૦૦ લિટર પાણીમાં) ૧૫ દિવસના અંતરે છંટકાવ કરવો. આંબા નવી વાડી બનાવવા તંદુરસ્ત અને રોગમુક્ત કલમો અધિકૃત અને સરકારી નર્સરી માંથી મેળવવી જોઈએ. આંબાનાં નાના રોપાની જળવણી માટે ટેકો આપવાની વ્યવસ્થા કરવી જેથી વરસાદ અને વધુ પવનની ઝડપ સામે ટકી શકે. આંબામાં મધ્યિયાના નિયંત્રણ માટે ઈમિડાકલોપ્રિડ ૧૭.૮% ૩ મિલી અથવા થાયોમેથોક્ઝામ ૨૫% ૪ ગ્રા./૧૦ લિટર પાણીમાં સંપૂર્ણ ઝડપ ઉપર છંટકાવ હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે કરવો. આંબામાં મધ્યિયાના નિયંત્રણ તથા પરગવાહકોની જળવણી કરવા માટે બ્યુવેરિયા બેઝિયાના અથવા લેકાનીસિલિયમ લેકાની નો છંટકાવ હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે કરવો. ડાળીનો સુકારો : રોગીએ ડાળીઓ કાપી, કપાયેલા ભાગ પર ૧૦ ટકા બોર્ડક્સ પેસ્ટ લગાડવું તેમજ કાર્બેન્ડાજિમ ૫૦ ડબલ્યુ પી ૧૦ ગ્રા. પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરી હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે છંટકાવ કરવો. ભૂકીછારા ના નિયંત્રણ માટે હેક્સકોનોઝોલ પ ૯સી ૧૦ મિલી/૧૦ લિટર પાણી માં મિક્સ કરી હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે છંટકાવ કરવો. આંબામાં મોર વહેલા લાવવા માટે વાડીમાં લીમડા સહિતની વિવિધ વનસ્પતિઓનું ધૂમાડિયું હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે કરવું.
ચીકુ	<p>સામાન્ય સલાહ:</p> <ul style="list-style-type: none"> બીજા વિભાજનમાં ભલામણ કરેલ ખાતરનો ૨૫ ટકા ભાગ પ્રમાણે રાસાયણિક ખાતર એમોનિયમ સંફેટ ૧.૩ કિગ્રા. અથવા યુરિયા ૦.૬ કિગ્રા., સિંગલ સુપર ફોસ્ફેટ ૦.૮ કિગ્રા., મ્યુનેટ ઓફ પોટાશ ૦.૩ કિગ્રા., છાણિયુ ખાતર ૨૫ કિગ્રા. આ મહિનામાં હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે આપવું.
પશુપાલન	<p>સામાન્ય સલાહ:</p> <ul style="list-style-type: none"> પશુઓને દૂધ ઉત્પાદન અને નિભાવની જરૂરિયાત ધ્યાનમાં લઈ પૂરતા પ્રમાણમા સમતોલ આહાર આપવો . તેમજ પશુઓના રહેણાણ ચોખ્ખા રાખવા, દિવસ દરમાન સમયાંતરે મળ-મુતર નો નિકાલ કરવો. પશુઓને યોગ્ય આહારમા જરૂરીયાત પ્રમાણે ખનિજ્યુક્ત મિશ્રણના સમાવેશ કરવો જોઈએ. ચાદ્ર કટરથી લીલા તથા સૂકા ધાસચારાને ટુકડા કરીને જ નીરણ કરવું. દુંધાળુ પશુઓના આઉને દૂધ દોહન પહેલા અને પછી ઝીક ઓક્સાઈડ અથવા બોરીક પાઉડર અથવા પોટેશીયમ પરમેગેનેટ ના દ્રાવણથી ભરાબર સાફુ કરવા. પશુઓનાં ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ટેલ્ટામેથીન અથવા એમીટાઇર ૨ મી.લી./લિટર પાણીમાં નાખને છાંટવી (દવાની બોટલ ઉપર લખેલી સૂચનાનો અમલ કરવો). પશુઓ જ્યારે દીચ્છે ત્યારે પાણી પી શકે તેવી વ્યવસ્થા ઉભી કરવી જોઈએ અથવા ઓછામાં ઓછુ દિવસમાં

	<p>ચારથી પાંચ વખત જરૂરીયાત મુજબ પાણી પીવડાવવું જોઈએ.</p> <ul style="list-style-type: none"> કોઢ/ગમાણની ઉચ્ચાઈ ૧૦ ફૂટથી વધારે રાખવી, જેથી હવાની હેઠેકર સરળતાથી થઈ શકે, બફ્ફરો/ગરમી ઓછી થાય અને ભોયાતનિયાનો ભાગ સુકો રહે. વિયાળ બાદ વાઇરા/પાડીયાને અડધાથી એક કલાકની અંદર ૫૦૦ મી.લી. જેટલું ચીક / ખીસું પીવડાવવું તારબાદ પંદર દિવસ સુધી વધરા/પાડીયાં કુલ વજન ના ૧૦ માં ભાગનું દૂધ/દિવસ પીવડાવવું. પશુ દીચ્છે ત્યારે પાણી પી તેવી વ્યવસ્થા રાખવી અથવા દિવસમાં ઓછા માં ઓછું ચાર વાર પશુની જરૂરીયાત મુજબ પાણી આપવું. શિયાળાના ઠંડા વાતાવરણમાં પશુઓને આરામ/સુવા માટે ઘાસચારા અને પથારીની વ્યવસ્થા કરવી. ખુબ ઠંડા પવન અથવા રાત્રી દરમ્યાન પશુને ગમાણમાં રાખવા.
વનીકરણ	<ul style="list-style-type: none"> પ્રથમ બને બીજા વર્ષના વાવેતર દરમ્યાનમાં નિંદણ અને સફ્ફાય કરવી જોઈએ.
દીશરીજ	<p>સામાન્ય સલાહ:</p> <ul style="list-style-type: none"> મીઠા પાણીના મંત્સ્ય મીઠા પાણીના જુંગા ઉત્યાદન કરતા ખેડૂતોને જાણાવવાનું કે, આ સમયગાળા દરમ્યાન પૂર્તી માત્રામાં ખોરાક આપવોકારણ કે આ વાતાવરણ માછલી/મીઠા પાણીના જુંગા માટે અનુકૂળ છે. તળાવમાં પાણીનું લેવલ જગવવું અને વધુ વરસાદ આવે ત્યારે તળાવના આઉટલેટ થોડી માત્રામાં ખોલવા તેથી પાણીનું લેવલ જગવાયેલું રહે. તળાવના તળિયાનું અને સપાટીનું તાપમાન સરભર કરવા એરેટર અથવા પંખ ચલાવવા.

❖ એગ્રોમેટ સલાહકાર સેવા બુલેટીન કમિટીના સભ્યો :

- ડૉ. એચ. એમ. વિરદીયા, સંશોધન વૈજ્ઞાનિક (સશ્ય વિજ્ઞાન)
- ડૉ. એલ. વી. ઘેરીયા, સહ પ્રાધ્યાપક (વનસ્પતિ કીટકશાસ્ત્ર)
- ડૉ. કે. બી. રાખોલીયા, સહ પ્રાધ્યાપક (વનસ્પતિ રોગશાસ્ત્ર) :
- ડૉ. સી. જી. ઈટવાલા, સંશોધન વૈજ્ઞાનિક (શાકભાજ વિજ્ઞાન)
- ડૉ. વાય. એન. ટેલેલ, સહ પ્રાધ્યાપક (ફણ વિજ્ઞાન)
- ડૉ. વી. આર. પટેલ, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (પશુપાલન)
- ડૉ. દિલેશ્વર નાયક, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (વનીકરણ)
- ડૉ. એમ. આર. પટેલ, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (દીશરીજ સાયન્સ)
- ડૉ. વિભા ટાક, રીસર્ચ એસોસીયેટ (જી.કે.એમ.એસ.)
- ડૉ. પી. કે. પરમાર, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (કૃષી હવામાનશાસ્ત્ર) અને પ્રિન્સિપાલ નોડલ ઓફિસર (જી.કે.એમ.એસ.)

NAVSARI AGRICULTURAL UNIVERSITY

AMFU_Navsari



NAVSARI AGRICULTURAL UNIVERSITY

Gramin Krishi Mausam Sewa

Agricultural Meteorological Cell
 Navsari Agricultural University
 Navsari – 396450, Gujarat
 E-mail :- aasnnavsari@gmail.com



(Jointly issued by Navsari Agricultural University & India Meteorological Department)

DATE OF ISSUE: 23/12/2022

Agromet Advisory Bulletin No: 77/2022 - 2023

-- Navsari District --

Weather summary of preceding week 20 December to 23 December - 2022

Sr. No.	Name of Weather Parameters	Value
1.	Range of Rainfall (mm)	0.0
2.	Range of Maximum Temperature (°C)	32.0-33.0
3.	Range of Minimum Temperature (°C)	13.5-18.0
4.	Range of Relative Humidity (%)	32-76
5.	Range of Wind Speed (km/hr)	2.2-3.3
6.	Range of Cloud Cover (Okta)	0-0
7.	Range of bright sunshine hours (hrs)	8.0-9.1
8.	Last five days cumulative rainfall (mm)	0.0
Total Rainfall (mm)		2420.0

IMD based Weather forecast for 24 December to 28 December - 2022


Sr. No.	Weathers Parameters	Day - 1 (24/12)	Day - 2 (25/12)	Day - 3 (26/12)	Day - 4 (27/12)	Day - 5 (28/12)
1.	Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
2.	Maximum temperature (°C)	30	31	32	32	33
3.	Minimum Temperature (°C)	17	17	18	18	19
4.	Max. Relative Humidity (%)	32	35	45	50	51
5.	Min. Relative Humidity (%)	27	22	28	30	33
6.	Wind Speed (km/hr.)	12.4	10.9	8.4	8.6	9.9
7.	Wind Direction (Compass point)	15	22	68	68	64
8.	Total Cloud Cover (Okta)	0	0	0	1	0

Weather Summary/ Alert	<ul style="list-style-type: none"> As per IMD weather forecasts over the next five days, the sky will be clear and there are chances of no rainfall. The Maximum temperature is 30 to 33 °C, when the Minimum temperature is 17 to 19 °C. likely to be around. The humidity in the air is likely to be between 22 and 51 percent. The wind direction will be North-East with an average speed of 8.4 to 12.4 km/h.
-----------------------------------	--

-:: South Gujarat Heavy Rainfall Zone ::-

General Advisory	<ul style="list-style-type: none"> • Due to pandemic of CORONA (COVID-19), Farmers should maintain social distancing and safety precaution while handling farm machines and labour in the field. • Wind speed is high >15 kmph, so avoid spraying of pesticide. • Farmers are advised to monitor the standing crop regularly for pest disease incidence and use the suitable recommended control measures, apply irrigation as per requirement of crops and apply recommended dose of fertilizers. • Download the MEGHDOOT mobile application for Agromet Advisory Services and information on weather forecasting, which will provide weather based agricultural advice to farmers for their location, crops and livestock in their local language. Click on the following link to download the MEGHDOOT application: <p>Android users: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoott</p> <p>IOS users:https://apps.apple.com/in/app/meghdoott/id1474048155</p> <ul style="list-style-type: none"> • Download the DAMINI Mobile application to ensure the safety through monitoring sky lightning activity. It will provide the alert and detail description of instruction, precaution, Do and Don't. Click on the following link to download the DAMINI application. <p>Android users: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightening.live.damini</p> <p>IOS users:https://apps.apple.com/app/id1502385645</p>
-------------------------	---

NOAA/VIRS/BLENDED NDVI Composite ending on Week no 50
(10.12.2022 to 16.12.2022) over Agricultural region



Agriculture vigour is good over isolated pockets and moderate over many places of the state.

Crop	Weather based Agro-Advisory
Sugarcane	<ul style="list-style-type: none"> • Prop the sugarcanes by tying together the canes in clump to protect against high wind speed. <p>Land preparation for new planting:</p> <ul style="list-style-type: none"> • New plantation of sugarcane crop should be done after proper preparation of land at proper moisture condition. Deep plough and level the soil. • Planting should be done from October to February. • Apply FYM/ Compost at the time of ploughing. Select healthy, diseases-insect free and immature seed materials of your selected variety. • Planting should be done at the spacing of 90 to 120 cm. 2 budded setts should be used with end to end method of planting after setts treatment with fungicide (<i>Carbendazim 50 wp @ 1g/1 lit. water</i>). If settling use intra row spacing should be 45 to 60 cm. • Within 3 days after planting and irrigation, pre-emergence weedicide should be applied to control weeds, spraying of <i>Atrazine 50 WP (80 g/10 li. water)</i> in clear weather conditions. • Application of <i>Trichoderma viride</i> in rich sugarcane pressmed at time of planting.
Rabi Pulse crop	<p>Vegetative growth stage :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Weeding should be done as per need or apply recommended pre emergence weedicide. • Apply irrigation as per soil and climatic condition.
Brinjal	<ul style="list-style-type: none"> • Apply irrigation as per need. • Spraying of <i>Propargite 57 EC @ 20 ml./10 Lit.</i> or <i>Fenazaquin 10 EC @ 10 ml./10 Lit.</i> of water for red Spider Mite during calm windy condition.

Tomato	<ul style="list-style-type: none"> • Apply irrigation as per need.
Chilli	<ul style="list-style-type: none"> • Apply irrigation as per need. • For Anthracnose disease spray <i>Propiconazole 25 EC</i> 10 ml./10 lit. or <i>Carbendazim 50% WP</i> @ 10 g/10 lit. in two spray between 10 days interval in clear weather condition.
Pointed gourd	<ul style="list-style-type: none"> • Take measures for weed control. • Apply irrigation as per need. • Harvesting should be carried out time to time.
Little gourd	<ul style="list-style-type: none"> • Take measures for weed control. • Apply irrigation as per need. • Harvesting should be carried out time to time.
Elephant foot yam	<ul style="list-style-type: none"> • Take measures for weed control. • Apply irrigation as per need. • Harvesting should be carried out
Greater yam	<ul style="list-style-type: none"> • Take measures for weed control. • Apply irrigation as per need. • Harvesting should be carried out
Tannia	<ul style="list-style-type: none"> • Take measures for weed control. • Harvest the suitable tender leaves of Tannia • Apply irrigation as per need.
Sweet Potato	<ul style="list-style-type: none"> • Apply irrigation as per need.
Mango	<p>General Advise :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Find grubs of stem borer from gallery and holes on the stem and kill them. Do pouring of <i>Chlorpyriphos 20 EC</i> @ 25 ml/ 10 lit. in hole and plug it with mud in clear weather condition under clear weather condition.. • Procure healthy and disease free planting material from authorized and government nursery for the new plantation. • Spray KNO_3 1% (1 kg/100 Lit. water) in evening cool hours to get early flowering at 15 days interval. • Provide support to the young plants of mango to protect against rain and high wind speed. • Spray Imidacloprid 17.8 % 3 ml. or Thiamethoxam 25 % 4 g/10 lit. water on entire mango tree for control of mango hopper during clear weather condition. • Spray Beauveria bassiana or Lecanicillium lacni for management of mango hopper and pollinators protection during clear weather condition. • Die back disease: Pruning of infected branches, apply 10 % Bordeaux paste and spraying Carbendazim 50 wp, 10gm/10 lit water in clear weather condition. • Spraying of Hexaconazole 5 EC 10 ml./10 lit. for control of powdery mildew in clear weather condition. • Do smudging with some neem based and other botanicals to get early flowering in mango during clear weather condition.
Sapota	<p>General Advise :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apply second split of 25% of RDF (<i>Ammonium Sulphate</i> -1.3 kg or <i>Urea</i> 0.6 kg, <i>SSP</i> 0.8 kg and <i>MOP</i> 0.3 kg + <i>FYM</i> 25 kg each tree) in clear weather condition.
Livestock	<p>General Advise :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provide adequate quantity of balanced ration by considering the milk production and maintenance. • Good quality dry roughage with 15-20 kg green fodder provided to the animals, only after chaffing. • Feed silage & hay materials if available. • Before and after milking udder must be properly clean with zinc oxide or boric powder or potassium permanganate solutions. • For the control of tick and other parasites, spray <i>Deltemethrin</i> or <i>Aemitaz</i> 2 ml in 1 liter of water. • Height of animal shed should keep minimum 10 feet for aeration to maintain the floor dry and to control humidity. • Young calves should be offered with approximate 500 ml. of Colostrums

	<p>within half an hour of calving. Thereafter for next 15 days, milk should be offered at the amount of 1/10th of body weight in a day.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keep drinking water facility for 24 hrs. of period or offered adlib water four times in a day. • Provide bedding material in cold climatic condition. • Keep animals under shed/covered area during extreme clod weather.
Forestry	<ul style="list-style-type: none"> • Weeding and cleaning should be done during first and second year plantations.
Fisheries	<p>General Advise :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fresh water farmers give proper feed in fish/prawn farming for better growth rate because environment condition is very suitable. • Increase water depth and maintain water level through pond outlet. • Mixing the top and bottom water by using the aerators or pumps.

❖ **Members of Agro-Advisory Committee :**

- Dr. H. M. Viradia, Research Scientist (Agronomy)
- Dr. L. V. Ghetiya, Associate Professor (Entomology)
- Dr. K. B. Rakholiya, Associate Professor (Plant Pathology):
- Dr. C. G. Intwala, Research Scientist (Vegetable Science)
- Dr. Y. N. Tandel, Associate Professor (Fruit Science)
- Dr. V. R. Patel, Assistant Professor (Animal Husbandry)
- Dr. Dileswar Nayak, Assistant Professor (Forestry)
- Dr. M. R. Patel, Assistant Professor (Fisheries Science)
- Dr. Vibha Tak, Research Associate(GKMS)
- Dr. P. K. Parmar, Assistant Professor (Agricultural Meteorology and Principal Nodal Officer (GKMS))



NAVSARI AGRICULTURAL UNIVERSITY
AMFU_Navsari

હવામાન આગાહી

વિગત	તારીખ	ડાંગ	નવસારી	વલસાડ
વરસાદ (મી.મી.)	૨૪/૧૨/૨૦૨૨	૦	૦	૦
	૨૫/૧૨/૨૦૨૨	૦	૦	૦
	૨૬/૧૨/૨૦૨૨	૦	૦	૦
	૨૭/૧૨/૨૦૨૨	૦	૦	૦
	૨૮/૧૨/૨૦૨૨	૦	૦	૦
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૪/૧૨/૨૦૨૨	૩૦	૩૦	૩૦
	૨૫/૧૨/૨૦૨૨	૩૧	૩૧	૩૧
	૨૬/૧૨/૨૦૨૨	૩૨	૩૨	૩૨
	૨૭/૧૨/૨૦૨૨	૩૨	૩૨	૩૨
	૨૮/૧૨/૨૦૨૨	૩૩	૩૩	૩૩
લધુતમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૪/૧૨/૨૦૨૨	૧૭	૧૭	૧૭
	૨૫/૧૨/૨૦૨૨	૧૭	૧૭	૧૭
	૨૬/૧૨/૨૦૨૨	૧૮	૧૮	૧૮
	૨૭/૧૨/૨૦૨૨	૧૮	૧૮	૧૮
	૨૮/૧૨/૨૦૨૨	૧૯	૧૯	૧૯
મહત્તમ લેજ (%)	૨૪/૧૨/૨૦૨૨	૩૪	૩૨	૩૮
	૨૫/૧૨/૨૦૨૨	૩૩	૩૫	૪૦
	૨૬/૧૨/૨૦૨૨	૪૪	૪૫	૫૧
	૨૭/૧૨/૨૦૨૨	૪૪	૫૦	૫૪
	૨૮/૧૨/૨૦૨૨	૫૨	૫૧	૫૧
લધુતમ લેજ (%)	૨૪/૧૨/૨૦૨૨	૨૩	૨૭	૨૮
	૨૫/૧૨/૨૦૨૨	૧૭	૨૨	૨૨
	૨૬/૧૨/૨૦૨૨	૨૩	૨૮	૨૮
	૨૭/૧૨/૨૦૨૨	૨૪	૩૦	૩૧
	૨૮/૧૨/૨૦૨૨	૨૭	૩૩	૩૨
પ્રણની ગતિ(ક્રિ.મી./કલાક)	૨૪/૧૨/૨૦૨૨	૫.૭	૧૨.૪	૧૧.૮
	૨૫/૧૨/૨૦૨૨	૬.૭	૧૦.૬	૧૦.૪
	૨૬/૧૨/૨૦૨૨	૬.૬	૮.૪	૭.૩
	૨૭/૧૨/૨૦૨૨	૬.૫	૮.૬	૭.૬
	૨૮/૧૨/૨૦૨૨	૬.૧	૮.૬	૮.૯
પ્રણની દિશા (ક્રમાસ પોઈન્ટ)	૨૪/૧૨/૨૦૨૨	SE	NE	NE
	૨૫/૧૨/૨૦૨૨	E	NE	NE
	૨૬/૧૨/૨૦૨૨	SE	E	E
	૨૭/૧૨/૨૦૨૨	SE	E	E
	૨૮/૧૨/૨૦૨૨	SE	NE	E
પાણની સ્થિતિની (ઓક્ટા)	૨૪/૧૨/૨૦૨૨	૦	૦	૦
	૨૫/૧૨/૨૦૨૨	૦	૦	૦
	૨૬/૧૨/૨૦૨૨	૦	૦	૦
	૨૭/૧૨/૨૦૨૨	૧	૧	૧
	૨૮/૧૨/૨૦૨૨	૦	૦	૦