



ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા

કૃષિ હવામાનશાસ્ત્ર એલ
નવસારી કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલય
નવસારી - ૩૬૭૪૫૦, ગુજરાત
ઈ-મેઇલ:- aasnavsari@gmail.com



નવસારી કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલય

(નવસારી કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલય અને ભારત મૌસમ વિજ્ઞાન વિભાગ દ્વારા પ્રસારિત)

તા. ૦૮/૦૮/૨૦૨૪

કૃષિ હવામાન બુલેટીન નં : ૩૮/૨૦૨૪ - ૨૦૨૫

-- નવસારી જિલ્લો --

પાછળનાં સમયનું હવામાન (તા. ૦૯ ઓગસ્ટ થી ૧૮ ઓગસ્ટ - ૨૦૨૪)


અનું. નં.	હવામાન પરિબળો	Value
૧.	વરસાદની શ્રેણી (મી.મી.)	૦.૦-૧.૦
૨.	મહત્તમ તાપમાનની શ્રેણી (સે.ગ્રે.)	૨૬.૬-૩૧.૩
૩.	લઘુત્તમ તાપમાનની શ્રેણી (સે.ગ્રે.)	૨૪.૬-૨૫.૭
૪.	લેજની શ્રેણી (%)	૭૬-૮૪
૫.	પવનની ગતિની શ્રેણી (કિ.મી./કલાક)	૬.૫-૯.૭
૬.	વાદળની સ્થિતિની શ્રેણી (ઓક્ટા)	૬-૮
૭.	સુર્યપ્રકાશિત સમયની શ્રેણી (કલાક)	૦.૨-૩.૫
૮.	પાછળના પાંચ દિવસમાં સંચિત વરસાદ (મી.મી.)	૨.૦
કુલ વરસાદ		૧૬૬૮.૦

આઈ. એમ. ડી. દ્વારા પ્રાપ્ત હવામાન આગાહી (તા. ૧૦ ઓગસ્ટ થી ૧૪ ઓગસ્ટ - ૨૦૨૪)

અનું. નં.	હવામાન પરિબળો	દિવસ-૧ (૧૦/૦૮)	દિવસ-૨ (૧૧/૦૮)	દિવસ-૩ (૧૨/૦૮)	દિવસ-૪ (૧૩/૦૮)	દિવસ-૫ (૧૪/૦૮)
૧.	વરસાદ (મી.મી.)	૧૫	૧૬	૧૨	૧૪	૧૬
૨.	મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૩૧	૩૧	૩૧	૩૧	૩૨
૩.	લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૬	૨૭	૨૭	૨૭	૨૭
૪.	મહત્તમ ભેજ (%)	૮૮	૮૮	૮૮	૮૮	૮૮
૫.	લઘુત્તમ ભેજ (%)	૭૮	૭૮	૮૧	૮૪	૭૮
૬.	પવનની ગતિ (કિ.મી./કલાક)	૨૨	૨૬	૨૭	૨૬	૨૭
૭.	પવનની દિશા (ક્રમાસ પોઇન્ટ)	૨૪૮	૨૪૮	૨૪૮	૨૪૩	૨૪૮
૮.	વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટા)	૯	૮	૮	૮	૯

હવામાન સારાંશ / ચેતવણી	<ul style="list-style-type: none">આઈ. એમ. ડી. , દ્વારા મળેલી હવામાનની આગાહી મુજબ આગામી પાંચ દિવસમાં આકાશ વાદળાંથું રહેશે અને છૂટછવાયા જગ્યાઓમાં હળવા વરસાદ પડવાની સંભાવના છે.મહત્તમ તાપમાન ૩૧ સે. થી ૩૨ સે. જ્યારે લઘુત્તમ તાપમાન ૨૬ થી ૨૭ સે. આસપાસ હોવાની સંભાવના છે.હવામાં ભેજનું પ્રમાણ ૭૮ થી ૮૮ ટકા વચ્ચે રહેવાની સંભાવના છે.પવનની દિશા દક્ષિણ-પ્રિયમ રહેશે જેની સરેરાશ ગતિ ૨૨ થી ૨૪ કિ.મી./કલાક રહેવાની શક્યતા છે.વિસ્તૃત રેન્જની આગાહી મુજબ , ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૨૪ સુધી સામાન્ય થી ઉપર વરસાદ પડ વાની શક્યતા છે અને મહત્તમ અને લઘુત્તમ તાપમાન સામાન્ય રહેવાની શક્યતા છે.
---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-:: દક્ષિણ ગુજરાત બારે વરસાદ વિસ્તાર ::-

સમાન્ય સલાહ	<ul style="list-style-type: none"> • જો પવનની ગતિ ૧૫ કિમી પ્રતિ કલાક કરતાં વધુ હોય તો ખેતરમાં કેમિકલ જેવાંકે પેસ્ટિસાઈડ નો છંટકાવ ન કરવો. • ખેડુતોને ખેતરની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ હવામાનની સ્થિતિ મુજબ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. • ખેડુતોએ ખાતર આપવાની અને દવાનો છંટકાવ કરવાની કામગિરી હવામાનની સ્થિતિ મુજબ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. • ખેડુતોએ વરસાદનાં વધારાનાં પાણીનાં નિકાલ માટે વ્યવસ્થા કરવી. • વધુ જરૂરી પવન અને ભારે વરસાદની સામે રક્ષણ માટે ઊભા બાગાયતી અને શાકભાજ પાકોની જાળવણી માટે લાકડાના અથવા વાંસ વડે યાંત્રિક ટેકા આપવો. • કૃષિ હવામાન હવામાન સલાહકારી બુલેટીન અને હવામાનની આગાહી અંગેની માહિતી મેળવવાં માટે ડાઉનલોડ કરો મેધફૂટ મોબાઇલ એપ્લિકેશન, જે ખેડુતોને તેમની સ્થાનિક ભાષામાં સ્થાન, પાક અને પશુધન વિશે હવામાનાધારિત કૃષિ સલાહ પ્રદાન કરશે. મેધફૂટ એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો: <p>એન્ડ્રોઈડ યુર્જર્સ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot</p> <p>આઈ.ઓ.એસ. યુર્જર્સ: https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155</p> <ul style="list-style-type: none"> • દામિની મોબાઇલ એપ્લિકેશન દ્વારા આકાશીય વિજણીની અગાઉથી ચેતવણી આપવામાં આવે છે તેમજ આકાશીય વિજણીથી બચવા શું કરવું અને શું નહિ કરવું તેની વિગતવાર માહિતી પૂરી પાડ વામાં આવે છે. આથી ખેડુતમિત્રોને દામિની મોબાઇલ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. દામિની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો: એન્ડ્રોઈડ યુર્જર્સ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightening.live.damini <p>આઈ.ઓ.એસ. યુર્જર્સ: https://apps.apple.com/app/id1502385645</p> 								
 <p>NOAA/VIIRS/BLENDED NDVI Composite ending on Week no 31 (29.07.2024 to 04.08.2024) over Agricultural region Gujarat</p> <p>NDVI could not be captured due dense cloud cover or rainfall.</p> <p>Source: https://www.star.nesdis.noaa.gov</p>									
પાક	<h3 style="text-align: center;">હવામાન આધારિત કૃષિ સલાહ</h3> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;"> શેરડી </td><td style="padding: 5px;"> <p>વાનસ્પતિક વિકાસ અવસ્થા/મહત્તમ પ્રથિ અવસ્થા</p> <ul style="list-style-type: none"> • રોપણીના દ, ઉ અને ૮ માસ બાદે સૂક્ષ્મ પાન કાઢીને તેનો ઉપયોગ આપવાનું તરીકે કરો. • શેરડીના પાકમાં આજુભાજુના સાંદાઓને બાંધી ટેવા જેથી વરસાદ અને વધુ પવનની ઝડપ સામે ટકી શકે. • શેરડીની રોપણી માટે બીજ પ્લોટ બનાવેલ હોય તો બીજ માટે શેરડી કાપવાની હોય તેના એક માસ પહેલા પ૦ કિગ્રા / લે. નાઈટ્રોજન ખાતર આપવું. </td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> ચોમાસુ ડાંગર </td><td style="padding: 5px;"> <p>વાનસ્પતિકવૃદ્ધિ અવસ્થા:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ક્રારીમાં ૨-૩ સે. મી. જેટલું પાણી ભરી રાખવું. • ભલામાણ મુજબ નાઈટ્રોજન ખાતરના હપ્તા સમયસર આપવાં. પ્રથમ હપ્તો ફેરસોપણીના ૨૦-૨૫ દિવસે અને બીજો હપ્તો ફેરસોપણીના ૪૦-૪૫ દિવસે આપવો. • નાઈટ્રોજન ખાતર આપતા પહેલા આગલા દિવસે કારીમાંથી પાણી નિતારી દેવું. • ફેરસોપણી બાદ ૪૫ દિવસ સુધી પાક નિંદાણ મુક્ત રાખવો જરૂરિયાત મુજબ હાથથી નિંદાણ અને પેડી વીડરથી આંતરખેડ કરવી. • ચોમાસુ ડાંગરના ધર્ઘવાડિમાં પાનના ટપકા દેખાય તો પ્રોપીકોનાઝોલ ૧ મિલી./૧ લી. અથવા ટ્રાયસાયકલોઝોલ ૧ ગ્રા./૧ લી. પાણીમાં મીશ્ર કરી હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે છંટકાવ કરવો. </td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> ભીડા </td><td style="padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> • કુમળા અને વેચાળાલાયક ફુળોની વીળી હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે કરવી જોઈએ. • રોગ-જીવતવાળા અને બગડેલા ફુળો દૂર કરવા જોઈએ. • નિદાંમણના નાશ માટે યોગ્ય પગલાં વેવા. • ભીડામાં ભૂકીછારા અને પાનના ટપકા નિયંત્રણ માટે ડેક્સાકોનોઝોલ ૮ એસી ૧૦ મિલી. અથવા કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ ડબલ્યુપી ૮ ગ્રા. પ્રતિ ૧૦ લી. પાણીમાં મીશ્ર કરી હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે છંટકાવ કરવો. • ખેતરમાંથી પીળી નસના વિષાળુ જાની છોડ ને ઉપાડી નાશ કરો. • રોગનો ફેલાવો સંક્રાન્ત માખીથી થાતો હોય, શોપક પ્રકારની જંતુ નાશક દવાનો છંટકાવ કરવો. • ખેતરમાંથી વરસાદનું વધારાના પાણીના નિકાલ કરવી. </td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> રીગણ </td><td style="padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> • પહેલા વાવેતર કરેલ રીગણ પાકમાં જો ફુળ આવ્યા હોય તો વીળી કરવી. </td></tr> </table>	શેરડી	<p>વાનસ્પતિક વિકાસ અવસ્થા/મહત્તમ પ્રથિ અવસ્થા</p> <ul style="list-style-type: none"> • રોપણીના દ, ઉ અને ૮ માસ બાદે સૂક્ષ્મ પાન કાઢીને તેનો ઉપયોગ આપવાનું તરીકે કરો. • શેરડીના પાકમાં આજુભાજુના સાંદાઓને બાંધી ટેવા જેથી વરસાદ અને વધુ પવનની ઝડપ સામે ટકી શકે. • શેરડીની રોપણી માટે બીજ પ્લોટ બનાવેલ હોય તો બીજ માટે શેરડી કાપવાની હોય તેના એક માસ પહેલા પ૦ કિગ્રા / લે. નાઈટ્રોજન ખાતર આપવું. 	ચોમાસુ ડાંગર	<p>વાનસ્પતિકવૃદ્ધિ અવસ્થા:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ક્રારીમાં ૨-૩ સે. મી. જેટલું પાણી ભરી રાખવું. • ભલામાણ મુજબ નાઈટ્રોજન ખાતરના હપ્તા સમયસર આપવાં. પ્રથમ હપ્તો ફેરસોપણીના ૨૦-૨૫ દિવસે અને બીજો હપ્તો ફેરસોપણીના ૪૦-૪૫ દિવસે આપવો. • નાઈટ્રોજન ખાતર આપતા પહેલા આગલા દિવસે કારીમાંથી પાણી નિતારી દેવું. • ફેરસોપણી બાદ ૪૫ દિવસ સુધી પાક નિંદાણ મુક્ત રાખવો જરૂરિયાત મુજબ હાથથી નિંદાણ અને પેડી વીડરથી આંતરખેડ કરવી. • ચોમાસુ ડાંગરના ધર્ઘવાડિમાં પાનના ટપકા દેખાય તો પ્રોપીકોનાઝોલ ૧ મિલી./૧ લી. અથવા ટ્રાયસાયકલોઝોલ ૧ ગ્રા./૧ લી. પાણીમાં મીશ્ર કરી હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે છંટકાવ કરવો. 	ભીડા	<ul style="list-style-type: none"> • કુમળા અને વેચાળાલાયક ફુળોની વીળી હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે કરવી જોઈએ. • રોગ-જીવતવાળા અને બગડેલા ફુળો દૂર કરવા જોઈએ. • નિદાંમણના નાશ માટે યોગ્ય પગલાં વેવા. • ભીડામાં ભૂકીછારા અને પાનના ટપકા નિયંત્રણ માટે ડેક્સાકોનોઝોલ ૮ એસી ૧૦ મિલી. અથવા કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ ડબલ્યુપી ૮ ગ્રા. પ્રતિ ૧૦ લી. પાણીમાં મીશ્ર કરી હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે છંટકાવ કરવો. • ખેતરમાંથી પીળી નસના વિષાળુ જાની છોડ ને ઉપાડી નાશ કરો. • રોગનો ફેલાવો સંક્રાન્ત માખીથી થાતો હોય, શોપક પ્રકારની જંતુ નાશક દવાનો છંટકાવ કરવો. • ખેતરમાંથી વરસાદનું વધારાના પાણીના નિકાલ કરવી. 	રીગણ	<ul style="list-style-type: none"> • પહેલા વાવેતર કરેલ રીગણ પાકમાં જો ફુળ આવ્યા હોય તો વીળી કરવી.
શેરડી	<p>વાનસ્પતિક વિકાસ અવસ્થા/મહત્તમ પ્રથિ અવસ્થા</p> <ul style="list-style-type: none"> • રોપણીના દ, ઉ અને ૮ માસ બાદે સૂક્ષ્મ પાન કાઢીને તેનો ઉપયોગ આપવાનું તરીકે કરો. • શેરડીના પાકમાં આજુભાજુના સાંદાઓને બાંધી ટેવા જેથી વરસાદ અને વધુ પવનની ઝડપ સામે ટકી શકે. • શેરડીની રોપણી માટે બીજ પ્લોટ બનાવેલ હોય તો બીજ માટે શેરડી કાપવાની હોય તેના એક માસ પહેલા પ૦ કિગ્રા / લે. નાઈટ્રોજન ખાતર આપવું. 								
ચોમાસુ ડાંગર	<p>વાનસ્પતિકવૃદ્ધિ અવસ્થા:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ક્રારીમાં ૨-૩ સે. મી. જેટલું પાણી ભરી રાખવું. • ભલામાણ મુજબ નાઈટ્રોજન ખાતરના હપ્તા સમયસર આપવાં. પ્રથમ હપ્તો ફેરસોપણીના ૨૦-૨૫ દિવસે અને બીજો હપ્તો ફેરસોપણીના ૪૦-૪૫ દિવસે આપવો. • નાઈટ્રોજન ખાતર આપતા પહેલા આગલા દિવસે કારીમાંથી પાણી નિતારી દેવું. • ફેરસોપણી બાદ ૪૫ દિવસ સુધી પાક નિંદાણ મુક્ત રાખવો જરૂરિયાત મુજબ હાથથી નિંદાણ અને પેડી વીડરથી આંતરખેડ કરવી. • ચોમાસુ ડાંગરના ધર્ઘવાડિમાં પાનના ટપકા દેખાય તો પ્રોપીકોનાઝોલ ૧ મિલી./૧ લી. અથવા ટ્રાયસાયકલોઝોલ ૧ ગ્રા./૧ લી. પાણીમાં મીશ્ર કરી હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે છંટકાવ કરવો. 								
ભીડા	<ul style="list-style-type: none"> • કુમળા અને વેચાળાલાયક ફુળોની વીળી હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે કરવી જોઈએ. • રોગ-જીવતવાળા અને બગડેલા ફુળો દૂર કરવા જોઈએ. • નિદાંમણના નાશ માટે યોગ્ય પગલાં વેવા. • ભીડામાં ભૂકીછારા અને પાનના ટપકા નિયંત્રણ માટે ડેક્સાકોનોઝોલ ૮ એસી ૧૦ મિલી. અથવા કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ ડબલ્યુપી ૮ ગ્રા. પ્રતિ ૧૦ લી. પાણીમાં મીશ્ર કરી હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે છંટકાવ કરવો. • ખેતરમાંથી પીળી નસના વિષાળુ જાની છોડ ને ઉપાડી નાશ કરો. • રોગનો ફેલાવો સંક્રાન્ત માખીથી થાતો હોય, શોપક પ્રકારની જંતુ નાશક દવાનો છંટકાવ કરવો. • ખેતરમાંથી વરસાદનું વધારાના પાણીના નિકાલ કરવી. 								
રીગણ	<ul style="list-style-type: none"> • પહેલા વાવેતર કરેલ રીગણ પાકમાં જો ફુળ આવ્યા હોય તો વીળી કરવી. 								
સમાન્ય સલાહ	<ul style="list-style-type: none"> • જો પવનની ગતિ ૧૫ કિમી પ્રતિ કલાક કરતાં વધુ હોય તો ખેતરમાં કેમિકલ જેવાંકે પેસ્ટિસાઈડ નો છંટકાવ ન કરવો. • ખેડુતોને ખેતરની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ હવામાનની સ્થિતિ મુજબ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. • ખેડુતોએ ખાતર આપવાની અને દવાનો છંટકાવ કરવાની કામગિરી હવામાનની સ્થિતિ મુજબ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. • ખેડુતોએ વરસાદનાં વધારાના પાણીના નિકાલ માટે વ્યવસ્થા કરવી. • વધુ જરૂરી પવન અને ભારે વરસાદની સામે રક્ષણ માટે ઊભા બાગાયતી અને શાકભાજ પાકોની જાળવણી માટે લાકડાના અથવા વાંસ વડે યાંત્રિક ટેકા આપવો. • કૃષિ હવામાન હવામાન સલાહકારી બુલેટીન અને હવામાનની આગાહી અંગેની માહિતી મેળવવાં માટે ડાઉનલોડ કરો મેધફૂટ મોબાઇલ એપ્લિકેશન, જે ખેડુતોને તેમની સ્થાનિક ભાષામાં સ્થાન, પાક અને પશુધન વિશે હવામાનાધારિત કૃષિ સલાહ પ્રદાન કરશે. મેધફૂટ એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લિંક પર કરવી જોઈએ: <p>એન્ડ્રોઈડ યુર્જર્સ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot</p> <p>આઈ.ઓ.એસ. યુર્જર્સ: https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155</p> <ul style="list-style-type: none"> • દામિની મોબાઇલ એપ્લિકેશન દ્વારા આકાશીય વિજણીની અગાઉથી ચેતવણી આપવામાં આવે છે તેમજ આકાશીય વિજણીથી બચવા શું કરવું અને શું નહિ કરવું તેની વિગતવાર માહિતી પૂરી પાડ વામાં આવે છે. આથી ખેડુતમિત્રોને દામિની મોબાઇલ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. દામિની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો: એન્ડ્રોઈડ યુર્જર્સ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightening.live.damini <p>આઈ.ઓ.એસ. યુર્જર્સ: https://apps.apple.com/app/id1502385645</p> 								

	<ul style="list-style-type: none"> રોગ-જીવાતવાળા અને બગડેલા ફુળો દૂર કરવા જોઈએ. રીંગાળની ફુળ અને દુખ ની ઈયળના ૪૦ ફ્રોમોન ટ્રેપ પ્રતિ હકેટરદીએ મુકવા. લઘુપણું રોગ: રોગીસ્ટ છોડ ને ઉપાડી નાશ કરવો. ખેતરમાંથી વરસાદનું વધારાના પાણીના નિકાલ કરવી.
ચોળી	<ul style="list-style-type: none"> ચોળીના પાકમાં નિદામણ કરી ખ્લોટ ચોખ્ખો રાખવો, ખેતરમાંથી વરસાદનું વધારાના પાણી ના નિકાલ કરવો.
ગુવાર	<ul style="list-style-type: none"> કુમળા અને વેચાણલાયક ફુળોની વીણી કરવી . જરૂરિયાત મુજબ આંતરખેડ અને નિદામણ કરવી. ખેતરમાંથી વરસાદનું વધારાના પાણીના નિકાલ કરવી.
પરવળ	<ul style="list-style-type: none"> ફુલ તૈયાર થયા બાદ તેની વીણી કરવી. વરસાદના કારણે વેલા સુકાયેલા હોયતો તેને દૂર કરવા. નાઈટ્રોજન યુક્ત ખાતરને પાકમાં આપવું. ખેતરમાંથી વરસાદનું વધારાના પાણીના નિકાલ કરવો.
ટિંડોળા	<ul style="list-style-type: none"> ફુલ તૈયાર થયા બાદ તેની વીણી કરવી. વરસાદના કારણે વેલા સુકાયેલા હોયતો તેને દૂર કરવા. નાઈટ્રોજન યુક્ત ખાતરને પાકમાં આપવું. ખેતરમાંથી વરસાદનું વધારાના પાણીના નિકાલ કરવો.
સુરણ	<ul style="list-style-type: none"> નિદામણના નાશ માટે યોગ્ય પગલાં વેવા. રાસાયણિક ખાતરનો ડોઝ આપવો. ખેતરમાંથી વરસાદનું વધારાના પાણીના નિકાલ કરવો.
રતાળુ	<ul style="list-style-type: none"> વેલાની પ્રશાખાઓને ટેકા પર ચઢાવવી. નિદામણના નાશ માટે યોગ્ય પગલાં વેવા. રાસાયણિક ખાતરનો ડોઝ આપવો. ખેતરમાંથી વરસાદનું વધારાના પાણીના નિકાલ કરવો.
તાનિયા	<ul style="list-style-type: none"> નિદામણના નાશ માટે યોગ્ય પગલાં વેવા. રાસાયણિક ખાતરનો ડોઝ આપવો. ખેતરમાંથી વરસાદનું વધારાના પાણીના નિકાલ કરવો.
આંબા	<p>સામાન્ય સલાહ:</p> <ul style="list-style-type: none"> આંબાના મેઠની ઈયળો થડમાંથી શોધિને મારી નાખો અને કાળાંની અંદર કલોરપાયરફોસ ૨૦ ઈસી રૂપ મી.લી./૧૦ લી. દ્રાવણ નાંખી કાદવથી કાણાં બંધ કરી દેવા. આંબાનાં નાના રોપાની જાગવણી માટે ટેકો આપવાની વ્યવસ્થા કરવી જેથી વરસાદ અને વધુ પવનની જરૂર સામે ટકી શકે. કપાયેલ ડાળી પર બોડેક્સ પેસ્ટ ૧૦ ટકા લગાડવું. આંબા નવી વાડી બનાવવા તંદુરસ્ત અને રોગમુકન કલમો અભિકૃત અને સરકારી નર્સરી માંથી મેળવવી જોઈએ. નવી કલમો માટે તૈયાર કરેલ ખાડામાં ૧૦ કિગ્રા. છાણિયું ખાતર, ૧ કિગ્રા. સિંગલ સુપર સલ્ફેટ અને ૧ કિગ્રા. મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ ખાતર આપવું. ઉધાર અને કીડીનો ઉપદ્રવ કલમોમાં જોવા મળે તો ૫૦ મિલી લોરપાયરફોસ અથવા ૧૦૦ ગ્રામ મિથાઈલ પેરાથીઓન ની માવજત ખાડા પૂર્તી વાખતે કરી દેવી. આંબાવાડીમાં પુંજ ઝાડ દિદ ૧૦૦ કિગ્રા. છાણિયું ખાતર, ૮૦૦ ગ્રામ યુરિયા અથવા ૧.૮ કિગ્રા. અમોનિયમ સલ્ફેટ ૧.૦ કિગ્રા. સિંગલ સુપર સલ્ફેટ અને ૧.૩ કિગ્રા. મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ ખાતર ચોમાસામાં આપવું. આંબાવાડીયામાં રાસાયણિક ખાતર આપ્યાના ૧૫ દિવસ પહેલા અથવા પછી બાયોફાસ્ટિલાઇઝર જેવા કે એઝોટોનેક્ટર, ૫૦ મિલી., શેરફેટ સોલ્યુબિલિઝિંગ બેક્ટેરિયા ૫૦ મિલી., પોટાશ મોબિલિઝિંગ બેક્ટેરિયા ૫૦ મિલી.. અને ટ્રાયકોર્ડર્મા ૫૦ ગ્રામ. પ્રતિ ઝાડ આપવું. આંબાવાડીમાં વરસાદનું વધારાના પાણીના નિકાલ કરવી.
ચીકુ	<ul style="list-style-type: none"> બીજા વિભાજનમાં ભલામણ કરેલ ખાતરનો ૨૫ ટકા ભાગ પ્રમાણે રાસાયણિક ખાતર અમોનિયમ સલ્ફેટ ૧.૩ કિગ્રા અથવા યુરિયા ૦.૬ કિગ્રા. સિંગલ સુપર ફોસ્ફેટ ૦.૮ કિગ્રા. મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ ૦.૩ કિગ્રા. છાણિયું ખાતર ૨૫ કિગ્રા આ મહિનામાં હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે આપવું. ચીકુવાડીમાં વરસાદનું વધારાના પાણીના નિકાલ કરવી.
પશુપાલન	<p>સામાન્ય સલાહ:</p> <ul style="list-style-type: none"> પશુઓને દૂધ ઉત્પાદન અને નિભાવની જરૂરિયાત ધ્યાનમાં લઈ પૂરતા પ્રમાણમાં સમતોલ આહાર

	<p>આપવો. તેમજ પશુઓના રહેઠાણ ચોખ્ખા રાખવા , દિવસ દરમ્યાન સમયાંતરે મળ-મૂતર નો નિકાલ કરવો.</p> <ul style="list-style-type: none"> પશુઓને ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળું ખનીજક્ષાર મિશ્રણ દૈનિક આપવું જોઈએ. જેની માત્રા પશુચિકિત્સક સલાહ મુજબ અથવા તેનું પેટિંગ પરના નિર્દેશાનુસાર આપવાનો રહે છે. પશુઓને યોગ્ય આડારમા જરૂરીયાત પ્રમાણે ખનીજયુક્ત મિશ્રણના સમાવેશ કરવો જોઈએ. ચાદ્ર કટથી લીલા તથા સૂક્ષ્મ ધાસચારાને ટુકડા કરીને જ નીરણ કરવું. દુધાણા પશુઓના આઉને દૂધ દોહન પહેલા અને પછી ઝીક ઓક્સાઈડ અથવા બોરીક પાઉડર અથવા પોટેશીયમ પરમેગેનેટ ના દ્રાવણથી ભરાબર સાદ્ય કરવા. પશુઓનાં ઈંતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેવટામેથીન અથવા એમીટાઇર 2 મી.લી./લિટર પાણીમાં નાખને છાંટવી (દ્વાની બોટલ ઉપર લાખેલી સૂચનાનો અમલ કરવો). પશુઓ જયારે ઈચ્છિ તારે પાણી પી શકે તેવી વ્યવસ્થા ઉભી કરવી જોઈએ અથવા ઓછામાં ઓછુ દિવસમાં ચારથી પાંચ વખત જરૂરીયાત મુજબ પાણી પીવડાવવું જોઈએ. કોઢ/ગમાણની ઉચાઈ ૧૦ ફૂટથી વધારે રાખવી, જેથી હવાની હેરફેર સરળતાથી થઈ શકે, બફારો/ગરમી ઓછી થાય અને ભોયાતળિયાનો ભાગ સુકો રહે. વિયાળ બાદ વાઇરડા/પાડીયાને અડધાથી એક કલાકની અંદર ૫૦૦ મી.લી. જેટલું ચીક / ખીરની પીવડાવવું ત્યારાદ પંદર દિવસ સુધી વાઇરડા/પાડીયાં કુલ વજન ના ૧૦ માં ભાગનું દૂધ/દિવસ પીવડાવવું. ચોમાસાની શરૂઆત થતી હોઈ પશુઓના રહેઠાણમાં વરસાદી પાણીનો ભરાવો ના થાય તે પ્રમાણે કોઢ/ગમાણના ભોયાતળિયાનો ટોળાવ અપાવો. કોઢ/ગમાણની ઉચાઈ ૧૦ ફૂટથી વધારે રાખવી, જેથી હવાની હેરફેર સરળતાથી થઈ શકે, બફારો/ગરમી ઓછી થાય અને ભોયાતળિયાનો ભાગ સુકો રહે. સતત પુષ્કળ વરસાદમાં નાના વાઇરડા-પાડીયા કે અન્ય પુષ્ત પશુ સતત લાંબા સમય સુધી ભીજાય નહિ તે માટે તાડપત્રી/પતરાનો શેડ કે પાકી ગમાણ હેઠળ રાખવા. ખુબ વીજળી અને વરસાદના સમયે પશુ વૃક્ષ નીચે બાંધવા નહિ.
વનીકરણ	<ul style="list-style-type: none"> પ્રથમ બને બીજા વર્ષના વાવેનર દરમ્યાનમાં નિદાન અને સફાય કરવી જોઈએ. ધરુવાદિયામાં ઉછેરેલા સાગના રોપાને સાગ સ્ટેમ્પની તૈયારી માટે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરી શકાય છે. ખેતરમાંથી વરસાદનું વધારાના પાણીના નિકાલ કરવી.
ફીશરીઝ	<p>સામાન્ય સલાહ :</p> <ul style="list-style-type: none"> મીઠા પાણીના મન્ત્સય મીઠા પાણીના જુંગા ઉત્યાદન કરતા ખેડૂતોને જાળવવાનું કે, આ સમયગાળા દરમ્યાન પૂર્ણી માત્રામાં ખોરાક આપવોકારણ કે આ વાતાવરણ માછલી/મીઠા પાણીના જુંગા માટે અનુકૂળ છે. તળાવમાં પાણીનું લેવલ જાળવવું અને વધુ વરસાદ આવે તથાવના આઉટલેટ થોડી માત્રામાં ખોલવા તેથી પાણીનું લેવલ જાળવાયેલું રહે તળાવના તળિયાનું અને સપાટીનું તાપમાન સરભર કરવા એરેટર અથવા પંખ્ય ચલાવવા.

❖ એગ્રોમેટ સલાહકાર સેવા બુલેટીન કમિટીના સભ્યો :

- ડૉ. એચ. એમ. વિરટીયા, પ્રાધ્યાપક અને વડા (સશ્ય વિજ્ઞાન)
- ડૉ. એલ. વી. ઘેર્ટીયા, સહ પ્રાધ્યાપક (વનસ્પતિ શીટકશાસ્ત્ર)
- ડૉ. કે. બી. રાખોલીયા, સહ પ્રાધ્યાપક (વનસ્પતિ રોગશાસ્ત્ર) :
- ડૉ. સી. જી. ઇટવાલા, સંશોધન વૈજ્ઞાનિક (શાકભાજી વિજ્ઞાન)
- ડૉ. વાય. એન. ટેલે, સહ પ્રાધ્યાપક (હળ વિજ્ઞાન)
- ડૉ. વી. આર. પટેલ, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (પશુપાલન)
- ડૉ. દિવેશ્વર નાયક, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (વનીકરણ)
- ડૉ. એમ. આર. પટેલ, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (ફીશરીઝ સાયન્સ)
- ડૉ. વિભા ટાક, રીસર્ચ એસોસીયેટ (જી.કે.એમ.એસ.)
- ડૉ. પી. કે. પરમાર, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (કૃષ્ણ હવામાનશાસ્ત્ર) અને પ્રિન્સિપાલ નોડલ ઓફિસર (જી.કે.એમ.એસ.)

Gramin Krishi Mausam Sewa



NAVSARI AGRICULTURAL UNIVERSITY

Agricultural Meteorological Cell

Navsari Agricultural University

Navsari – 396450, Gujarat

E-mail :- aasnnavsari@gmail.com



NAVSARI AGRICULTURAL UNIVERSITY

(Jointly issued by Navsari Agricultural University & India Meteorological Department)

DATE OF ISSUE: 09/08/2024

Agromet Advisory Bulletin No: 38/2024 - 2025

-- Navsari District --

Weather summary of preceding week **06 August to 09 August - 2024**

Sr. No.	Name of Weather Parameters	Value
1.	Range of Rainfall (mm)	0.0-1.0
2.	Range of Maximum Temperature (°C)	29.9-31.3
3.	Range of Minimum Temperature (°C)	24.6-25.7
4.	Range of Relative Humidity (%)	79-94
5.	Range of Wind Speed (km/hr)	6.5-7.7
6.	Range of Cloud Cover (Okta)	6-8
7.	Range of bright sunshine hours (hrs)	0.2-3.5
8.	Last five days cumulative rainfall (mm)	2.0
Total Rainfall (mm)		1668.0

IMD based Weather forecast for **10 August to 14 August - 2024**

Sr. No.	Weathers Parameters	Day - 1 (10/08)	Day - 2 (11/08)	Day - 3 (12/08)	Day - 4 (13/08)	Day - 5 (14/08)
1.	Rainfall (mm)	15	16	12	14	16
2.	Maximum temperature (°C)	31	31	31	31	32
3.	Minimum Temperature (°C)	26	27	27	27	27
4.	Max. Relative Humidity (%)	88	88	88	88	88
5.	Min. Relative Humidity (%)	78	78	81	84	78
6.	Wind Speed (km/hr.)	22	26	27	26	27
7.	Wind Direction (Compass point)	248	248	248	243	248
8.	Total Cloud Cover (Okta)	7	8	8	8	7

Weather Summary/ Alert	<ul style="list-style-type: none">As per the forecast issued by India Meteorological Department over the next five days, the sky will be cloudy and there are chances of rainfall at isolated places.The Maximum temperature is 31 °C to 32 °C, when the Minimum temperature is 26 °C to 27 °C likely to be around.The humidity in the air is likely to be between 78 and 88 percent.The wind direction will be South-West with an average speed of 22 to 27 km/h.As per Extended range forecast, possibility of above normal rainfall and maximum and minimum temperature likely to be normal up to 20th August, 2024.
-----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-:: South Gujarat Heavy Rainfall Zone ::-

General Advisory <ul style="list-style-type: none"> • Wind speed is high >15 kmph, so avoid spraying of pesticide. • Provide mechanical support to horticultural and vegetable crops during forecast of high wind velocity and heavy rain. • Drains out excess rain water from fields. • Farmers are advised to carry out different activities of farm as per the weather condition. • Farmers are advised to do the chemical spray and fertilizer application activity as per the weather condition • Download the MEGHDOOT mobile application for Agromet Advisory Services and information on weather forecasting, which will provide weather based agricultural advice to farmers for their location, crops and livestock in their local language. Click on the following link to download the MEGHDOOT application: Android users: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot IOS users: https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155 • Download the DAMINI Mobile application to ensure the safety through monitoring sky lightning activity. It will provide the alert and detail description of instruction, precaution, Do and Don't. Click on the following link to download the DAMINI application. Android users: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lighteninglive.damini IOS users: https://apps.apple.com/app/id1502385645 	<p>NOAA/VIIRS/BLENDED NDVI Composite ending on Week no 31 (29.07.2024 to 04.08.2024) over Agricultural region Gujarat</p> <p>NDVI could not be captured due dense cloud cover or rainfall.</p> <p>Source: https://www.star.nesdis.noaa.gov</p>
Crop	Weather based Agro-Advisory
Sugarcane	Vegetative Stage/Grand Growth stage: <ul style="list-style-type: none"> • After 6, 7 & 8 month of planting remove dry leaves and use it as mulch. • Prop the canes with strong bamboos or by tying together the canes in clump to protect against high wind speed and rain. • In seed plot add Nitrogen (50 kg/ha.) Before one month of seed cutting.
Kharif Paddy	Vegetative stage: <ul style="list-style-type: none"> • Keep 2-3 cm standing water in field during vegetative growth. • Apply split dose of Nitrogen fertilizer as per recommendation. i.e. 1st dose at 20-25 days after transplanting - 40 kg N/ ha and 2nd dose at 40-45 days after transplanting - 20 kg/ha. • Drain the water from field one day before application of fertilizer. • Keep field weed free by hand weeding and interculturing with paddy weeder upto 45 days after transplanting. • If leaf Blast observed in nursery, spraying of <i>Propiconazole</i> 1ml/lit or <i>Tricyclozole</i> 1gm/lit in water under clear weather condition.
Okra	<ul style="list-style-type: none"> • Harvesting should be carried out as per the tenderness of marketable fruit during clear weather condition. • Discard damaged and diseased fruit. • Weeding should be carried out. • Spraying of Hexaconozole 5 EC @ 10 ml or Carbendazim 50 WP 5 g per 10 Lit of water for control of powdery mildew/leaf spot disease under clear weather condition. • Up root and burn whip yellow vein mosaic infected okra plant from field. • Spraying systemic insecticides for whitefly (vector) management. • Drains out excess rain water from crop fields.
Brinjal	<ul style="list-style-type: none"> • If the fruit has come in the early planted brinjal crop, then harvest it. • Discard damaged and diseased fruit. • 40 pheromone trap per hectare should be kept for management of fruit and

	<p>shoot borer in brinjal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Little leaf of brinjal: Monitoring and uproot and burn from brinjal field. • Drains out excess rain water from crop fields.
Cow Pea	<ul style="list-style-type: none"> • Keep the plot clean by weeding. • Drains out excess rain water from crop fields.
Cluster bean	<ul style="list-style-type: none"> • Harvesting should be carried out as per the tenderness of marketable fruit. • Interculturing & weeding should be carried out. • Drains out excess rain water from crop fields.
Pointed gourd	<ul style="list-style-type: none"> • Marketable fruit should be harvested. • If vine is dried due to rain, then remove it. • Nitrogenous fertilizer should be given to the crop. • Drains out excess rain water from crop fields.
Little gourd	<ul style="list-style-type: none"> • Marketable fruit should be harvested. • If vine is dried due to rain, then remove it. • Nitrogenous fertilizer should be given to the crop. • Drains out excess rain water from crop fields.
Elephant foot yam	<ul style="list-style-type: none"> • Take measures for weed control. • Give a dose of chemical fertilizer. • Drains out excess rain water from crop fields.
Greater yam	<ul style="list-style-type: none"> • Give proper support or train branches of vines. • Take measures for weed control. • Give a dose of chemical fertilizer. • Drains out excess rain water from crop fields.
Tannia	<ul style="list-style-type: none"> • Take measures for weed control. • Give a dose of chemical fertilizer. • Drains out excess rain water from crop fields.
Mango	<p>General Advise :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Find grubs of stem borer from gallery and holes on the stem and kill them. Do pouring of Chlorpyriphos 20 EC @ 25 ml/ 10 lit in hole and plug it with mud in clear weather condition under clear weather condition.. • Provide support to the young plants of mango to protect against rain and high wind speed. • Application of 10 % Bordeaux paste in cut/pruning branches of fruit tree. • Procure healthy and disease free planting material from authorized and government nursery for the new plantation. • Prepare pit for plantation of new grafts by filling 10 kg FYM, 1 kg SSP and 1 kg MOP. Give 50 ml. Chlorpyriphos or 100 g Methyl Parathion to manage termite and ants. • Apply recommended dose of fertilizer per tree @ 800 g Urea or 1.8 kg Ammonium Sulphate, 1.0 kg SSP and 1.3 kg MOP along with 100 kg FYM to adult tree. • In addition RDF, give biofertilizers viz., Azotobactor 50 ml, PSB 50 ml, KMB 50 ml and Trichoderma 50 g per adult tree in monsoon. Before or after 15 days of fertilizer application. • Drains out excess rain water from mango orchard.
Sapota	<p>General Advise :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apply second split of 25% of RDF (Ammonium Sulphate -1.3 kg or Urea 0.6 kg, SSP 0.8 kg and MOP 0.3 kg + FYM 25 kg each tree) in clear weather condition. • Drains out excess rain water from sapota orchard.
Livestock	<p>General Advise :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provide adequate quantity of balanced ration by considering the milk production and maintenance. • All the livestock should provided with good quality of mineral mixture, for that dose rate are as per the prescription label on the packing or as guided by veterinary doctor. • Good quality dry roughage with 15-20 kg green fodder provided to the animals, only after chaffing. • Feed silage & hay materials if available. • Before and after milking udder must be properly clean with zinc oxide or boric powder or potassium permanganate solutions. • For the control of tick and other parasites, spray <i>Deltemethrin</i> or <i>Aemitaz</i> 2 ml in 1 liter of water.

	<ul style="list-style-type: none"> • Height of animal shed should keep minimum 10 feet for aeration to maintain the floor dry and to control humidity. • Young calves should be offered with approximate 500 ml. of Colostrums within half an hour of calving. Thereafter for next 15 days, milk should be offered at the amount of 1/10th of body weight in a day. • Keep drinking water facility for 24 hrs. of period or offered adlib water four times in a day. • In rainy season, give sufficient slop on the floor of animal shed to avoid water logging. • Height of animal shed should keep minimum 10 feet for aeration to maintain the floor dry and to control humidity. • Don't keep the animal under tree when there is heavy lightning during rain.
Forestry	<ul style="list-style-type: none"> • Weeding and cleaning should be done during first and second year plantations. • The nursery raised teak seedling may be transplanted for teak stamp preparation for further filed planting. • Drains out excess rain water from crop fields.
Fisheries	<ul style="list-style-type: none"> • Fresh water farmers give proper feed in fish/prawn farming for better growth rate because environment condition is very suitable. • Increase water depth and maintain water level through pond outlet. • Mixing the top and bottom water by using the aerators or pumps.

❖ **Members of Agro-Advisory Committee :**

- Dr. H. M. Viradia, Professor & Head (Agronomy)
- Dr. L. V. Ghetiya, Associate Professor (Entomology)
- Dr. K. B. Rakholiya, Associate Professor (Plant Pathology):
- Dr. C. G Intwala, Research Scientist (Vegetable Science)
- Dr. Y. N. Tandel, Associate Professor (Fruit Science)
- Dr. V. R. Patel, Assistant Professor (Animal Husbandry)
- Dr. Dileswar Nayak, Assistant Professor (Forestry)
- Dr. M. R. Patel, Assistant Professor (Fisheries Science)
- Dr. Vibha Tak, Research Associate(GKMS)
- Dr. P. K. Parmar, Assistant Professor (Agricultural Meteorology and Principal Nodal Officer (GKMS))

NAVSARI AGRICULTURAL UNIVERSITY
AMFU_Navsari

છવામાન આગાહી

વિગત	તારીખ	દાંગ	નવચારી	વલસાં
વરસાદ (મી.મી.)	૧૦/૦૮/૨૦૨૪	૧૩	૧૫	૧૬
	૧૧/૦૮/૨૦૨૪	૧૨	૧૬	૧૨
	૧૨/૦૮/૨૦૨૪	૧૬	૧૨	૧૬
	૧૩/૦૮/૨૦૨૪	૧૨	૧૪	૧૫
	૧૪/૦૮/૨૦૨૪	૧૨	૧૬	૬
મહત્તમ તાપમાન (ઘે.સે)	૧૦/૦૮/૨૦૨૪	૩૦	૩૧	૩૩
	૧૧/૦૮/૨૦૨૪	૩૧	૩૧	૩૩
	૧૨/૦૮/૨૦૨૪	૩૦	૩૧	૩૨
	૧૩/૦૮/૨૦૨૪	૩૧	૩૧	૩૩
	૧૪/૦૮/૨૦૨૪	૩૧	૩૨	૩૩
લઘુત્તમ તાપમાન (ઘે.સે)	૧૦/૦૮/૨૦૨૪	૨૬	૨૬	૨૬
	૧૧/૦૮/૨૦૨૪	૨૬	૨૭	૨૬
	૧૨/૦૮/૨૦૨૪	૨૭	૨૭	૨૬
	૧૩/૦૮/૨૦૨૪	૨૭	૨૭	૨૬
	૧૪/૦૮/૨૦૨૪	૨૭	૨૭	૨૬
મહત્તમ ભેજ (%)	૧૦/૦૮/૨૦૨૪	૬૫	૮૮	૬૦
	૧૧/૦૮/૨૦૨૪	૬૪	૮૮	૮૯
	૧૨/૦૮/૨૦૨૪	૬૪	૮૮	૮૯
	૧૩/૦૮/૨૦૨૪	૬૪	૮૮	૬૦
	૧૪/૦૮/૨૦૨૪	૬૪	૮૮	૮૯
લઘુત્તમ ભેજ (%)	૧૦/૦૮/૨૦૨૪	૮૦	૭૮	૭૬
	૧૧/૦૮/૨૦૨૪	૭૬	૭૮	૭૮
	૧૨/૦૮/૨૦૨૪	૭૫	૭૯	૮૦
	૧૩/૦૮/૨૦૨૪	૭૫	૮૪	૮૧
	૧૪/૦૮/૨૦૨૪	૭૪	૭૮	૭૫
પવનની ગતિ(ક્ર.મી./કલાક)	૧૦/૦૮/૨૦૨૪	૧૮	૨૨	૧૬
	૧૧/૦૮/૨૦૨૪	૨૧	૨૬	૨૩
	૧૨/૦૮/૨૦૨૪	૨૩	૨૭	૨૪
	૧૩/૦૮/૨૦૨૪	૨૩	૨૬	૨૨
	૧૪/૦૮/૨૦૨૪	૨૪	૨૭	૨૩
પવનની દિશા (ક્રમાસ પોઈન્ટ)	૧૦/૦૮/૨૦૨૪	W	W	SW
	૧૧/૦૮/૨૦૨૪	W	W	W
	૧૨/૦૮/૨૦૨૪	W	W	SW
	૧૩/૦૮/૨૦૨૪	W	SW	SW
	૧૪/૦૮/૨૦૨૪	W	W	SW
વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટે)	૧૦/૦૮/૨૦૨૪	C	9	9
	૧૧/૦૮/૨૦૨૪	C	C	9
	૧૨/૦૮/૨૦૨૪	C	C	9
	૧૩/૦૮/૨૦૨૪	C	C	9
	૧૪/૦૮/૨૦૨૪	9	9	6