



નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી

# ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા

કૃષિ હવામાન સેવા

નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી

નવસારી - ૩૮૬૪૫૦, ગુજરાત

ઈ-મેલ:- [aasnava@gmail.com](mailto:aasnava@gmail.com)

(નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી અને ભારત મૌસમ વિજ્ઞાન વિભાગ દ્વારા પ્રસારિત)

તા. ૨૫/૦૫/૨૦૨૧

કૃષિ હવામાન બુલેટીન નં : ૧૬/૨૦૨૧ - ૨૦૨૨

-- નવસારી જિલ્લો --

પાછળનાં સમયનું હવામાન (તા. ૨૧ મે થી ૨૫ મે - ૨૦૨૧)

અનું. નં.	હવામાન પરિબળો	Value
૧.	વરસાદની શ્રેણી (મી.મી.)	૦.૦-૦.૦
૨.	મહત્તમ તાપમાનની શ્રેણી (સે.ગ્રે.)	૩૩.૦-૩૪.૫
૩.	લધુત્તમ તાપમાનની શ્રેણી (સે.ગ્રે.)	૨૩.૫-૨૫.૦
૪.	ભેજની શ્રેણી (%)	૬૨-૬૨
૫.	પવનની ગતિની શ્રેણી (કિ.મી./કલાક)	૩.૫-૫.૪
૬.	વાદળની સ્થિતિની શ્રેણી (ઓક્ટા)	૦-૫
૭.	સુર્યપ્રકાશિત સમયની શ્રેણી (કલાક)	૬.૫-૧૦.૫
૮.	પાછળના પાંચ દિવસમાં સંચિત વરસાદ (મી.મી.)	૦.૦
કુલ વરસાદ		૧૪૪.૦

આઈ. એમ. ડી. દ્વારા પ્રાપ્ત હવામાન આગાહી (તા. ૨૬ મે થી ૩૦ મે - ૨૦૨૧)

અનું. નં.	હવામાન પરિબળો	દિવસ-૧ (૨૬/૦૫)	દિવસ-૨ (૨૭/૦૫)	દિવસ-૩ (૨૮/૦૫)	દિવસ-૪ (૨૯/૦૫)	દિવસ-૫ (૩૦/૦૫)
૧.	વરસાદ (મી.મી.)	૩	૩	૩	૦	૦
૨.	મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૩૬	૩૫	૩૪	૩૪	૩૪
૩.	લધુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૮	૨૯	૨૭	૨૭	૨૭
૪.	મહત્તમ ભેજ (%)	૭૬	૮૦	૮૦	૭૬	૭૬
૫.	લધુત્તમ ભેજ (%)	૫૧	૫૦	૫૧	૫૦	૫૦
૬.	પવનની ગતિ (કિ.મી./કલાક)	૨૦	૨૬	૨૬	૨૪	૨૬
૭.	પવનની દિશા (ક્રમપાસ પોર્ટન્ટ)	૨૩૮	૨૪૮	૨૪૩	૨૧૨	૨૩૮
૮.	વાદળની સ્થિતિની (ઓક્ટા)	૭	૬	૭	૭	૩

## હવામાન સારાંશ / ચેતવણી

- આઈ. એમ. ડી., દ્વારા મળેલી હવામાનની આગાહી મુજબ આગામી પાંચ દિવસમાં આકાશમાં વાદળાંથું રહેશે અને ઓછો વરસાદ પડવાની સંભાવના છે.
- મહત્તમ તાપમાન ૩૪ થી ૩૬ સે. જ્યારે લધુત્તમ તાપમાન ૨૬ થી ૨૮ સે. આસપાસ રહેવાની સંભાવના છે.
- હવામાં ભેજનું પ્રમાણ ૫૧ થી ૮૦ ટકા વચ્ચે રહેવાની સંભાવના છે.
- પવનની દિશા દક્ષિણ-પશ્ચિમ રહેશે જેની સરેરાશ ગતિ ૨૦ થી ૨૬ કિ.મી./કલાક રહેવાની શક્યતા છે.
- તારીખ ૦૫ જુન, ૨૦૨૧ સુધી, લાંબા ગાળાની આગાહી મુજબ વરસાદ પાડવાની સંભાવના છે.

## -:: દક્ષિણ ગુજરાત ભારે વરસાદ વિસ્તાર ::-

<p><b>સામાન્ય સલાહ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>કોરોના (કોવીડ-૧૯) રોગચાળાની મહામારીના લીધે, ખેડૂત મિત્રોએ ખેતર પર જેતીની કામગીરી દરમ્યાન ખેત સાધનો/ઓજરો અને ખેત મજૂરો સાથે એકબીજાથી સામાજિક અંતર રાખવું અને તે માટેની સાવધાની અને સલાહમતી રાખવી તેમજ અગમયેતી જગ્યાવી.</li> <li>રાસાયણિક ખાતર છાંટવાની અને ખાતર નાખવાની પ્રવૃત્તિ હવામાનની સિથનિ પ્રમાણે ઝવી.</li> <li>ખેડૂતોને ખેતરની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ હવામાનની સિથનિ મુજબ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.</li> <li>ખેડૂત મિત્રોને એગ્રોમેટ સલાહકાર સેવા બુલેટીન સેવા માટે મેધદૂત મોબાઈલ અપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે, જેમાં તાપમાન, વરસાદ, ભેજ, પવનની ગતિ અને દિશા સંબંધિત ખેડૂતોને આગાહી પૂરી પાડશે, જે કૃષિ કામગીરીમાં પાક અને પશુધનની સંભાળ કેવી રીતે લેવી તે માટે નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવે છે.</li> </ul> <p>એન્ડ્રોઇડ યુર્જર્સ : <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot</a> આઈ.ઓ.એસ. યુર્જર્સ: <a href="https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155">https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155</a></p>	<p>NOAA/VIIRS/BLENDED NDVI Composite ending on Week no 20 (14.05.2021 to 20.05.2021) over Agricultural region</p> <p>Gujarat</p> <p>Agricultural Vigour is moderate over the state.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Color</th> <th>Range</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Red</td> <td>-0.05</td> <td>Bare soil, rocks clouds, rain, snow, etc.</td> </tr> <tr> <td>Orange</td> <td>0.05 - 0.1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Yellow</td> <td>0.15 - 0.2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Light Green</td> <td>0.25 - 0.3</td> <td>Moderate</td> </tr> <tr> <td>Dark Green</td> <td>0.35 - 0.4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Very Dark Green</td> <td>0.45 - 0.5</td> <td>Good</td> </tr> <tr> <td>Black</td> <td>0.55 - 0.6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Very Black</td> <td>&gt;0.6</td> <td>Very good</td> </tr> </tbody> </table>	Color	Range	Description	Red	-0.05	Bare soil, rocks clouds, rain, snow, etc.	Orange	0.05 - 0.1		Yellow	0.15 - 0.2		Light Green	0.25 - 0.3	Moderate	Dark Green	0.35 - 0.4		Very Dark Green	0.45 - 0.5	Good	Black	0.55 - 0.6		Very Black	>0.6	Very good
Color	Range	Description																										
Red	-0.05	Bare soil, rocks clouds, rain, snow, etc.																										
Orange	0.05 - 0.1																											
Yellow	0.15 - 0.2																											
Light Green	0.25 - 0.3	Moderate																										
Dark Green	0.35 - 0.4																											
Very Dark Green	0.45 - 0.5	Good																										
Black	0.55 - 0.6																											
Very Black	>0.6	Very good																										
<p><b>પાક</b></p> <p><b>હવામાન આધારિત કૃષિ સલાહ</b></p>	<p><b>યોમાસુ ડાંગર</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>યોમાસુ ડાંગરના ધરુ માટે જરૂરી જમીન એડ કરી, સમતળ કરી તૈયાર કરવી.</li> <li>સાડુ કોડવાયેલ છાણયુ/ગણતન્ય ખાતર ખેડૂત સમયે જમીનમાં ભેગવું.</li> <li>જેટલા વિસ્તારમાં ફેરશોપાણી કરવાની હોય તેના ૧/૧૦ ભાગના વિસ્તારમાં ધરલાડીયું બનાવવું. નવી જતનું પ્રમાણિત બીજ યુનિવિસિટી ફાન્મ પરથી મેળવી લેવું.</li> <li>૧ હેક્ટર વિસ્તારમાં ફેરશોપાણી માટે ૨૫-૩૦કિલો બીજની જરૂર હોય છે.</li> </ul> <p><b>ઉનાળુ ડાંગર</b></p> <p>દાણા ભરવા/પાકવા અવસ્થા:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ક્યારીમાં ૩-૫ સેમી. પાણી ભરી રાખવું.</li> <li>દાણા કઢાણ થતા, ક્યારીમાંથી પાણી નિતારી દેવું.</li> <li>પાક તૈયાર થતા સમયસર કાપણી કરવી.</li> </ul> <p><b>ઉનાળુ કઠોળ</b></p> <p>શીંગ/પાકવા અવસ્થા:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>જરૂરિયાત મુજબ ૧૫ થી ૨૦દિવસના અંતરે પાણી આપવું.</li> <li>પાક તૈયાર થતા સમયસર કાપણી કરવી, યોમાસુ પાક માટે જમીન તૈયાર કરવી.</li> </ul> <p><b>શેરડી</b></p> <p>વાનસ્પતિકવૃદ્ધિ અવસ્થા:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>શેરડીના પાકને નીદાણ મુક્ત રાખવા હાથથી નીદાણ કરવું અને આંતર એડ કરવી.</li> <li>જરૂરિયાત મુજબ પિયત પાણી ૧૫ થી ૨૦દિવસના અંતરે આપવું.</li> <li>નાઈટ્રોજન ખાતરના હપ્તા સમયસર ભલામણ મુજબ આપવા.</li> <li>રોપણીના ૫-૮ માસ બાટ પાળા ચડાવવા.</li> <li>જે ખેતરમાં પાણી ભરાતા હોય તે ખેતર યોમાસા પહેલા ૧ મીટર ઉડી નીતાર નીક કરવી.</li> </ul>																											

	<ul style="list-style-type: none"> <li>શેરડીના ટોંચ અને દુંઘના વધેકો માટે કાર્બોક્સ્યુરાન ૩૭ ૩૩ કી.ગ્રા./હે. જમીનમાં આપવું</li> </ul>
ઉનાળું ભીડા	<ul style="list-style-type: none"> <li>પાન કથીરીઃ નુકશાનવાળા પાનનો કથીરી સહીત ભેગા કરી તેનો નાશ કરવો. અથવા</li> <li>ફેનાજાકવીન ૧૦ ઈસી ૧૦ મિલી/૧૦ લિટર અથવા પ્રોપરગ્રાઇટ ૫૭ ઈસી ૧૦ મિલી/૧૦ લિટર પાણીમાં ભેગવી પાક ઉપર છંટકાવ કરવો.</li> <li>પીળી નસનો રોગ : રોગીસ્ટ છોડ ઉપાડી નાશ કરો. શોષક પ્રકારની જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ કરવો.</li> </ul>
ચોળા	<ul style="list-style-type: none"> <li>રોગ-જીવાત માટે નિયંત્રણ ના પગલાં વેવા.</li> </ul>
શાકભાજુ	<ul style="list-style-type: none"> <li>નોવેલ ૧ લિટર/૧ વીધામાં આપવું.</li> <li>નોવેલ પ્રવાહી ખાતર ૧૫૦ મી.લી./૧૫ લિટર પાણીમાં નાખી ઊભા પાકમાં છંટકાવ કરવો.</li> <li>નોવેલ પ્રવાહી ખતરનો ભાવ રૂ. ૧૨૦/- પ્રતિ લિટર છે.</li> <li>નોવેલ પ્લસ તથા નોવેલ પ્રાઈસ નો ભાવ રૂ. ૨૦૦/- પ્રતિ લિટર છે.</li> <li>મેન્કોઝેબ + મેટાલેકબીલ ૭૫ ડબલ્યુપી ૨૦ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.</li> <li>શાકભાજુ પાકોમાં કથીરી નિયંત્રણ માટે પ્રોપરગ્રાઇટ ૫૭ ઈસી ૨ મી.લી/૧ લી પાણી મુજબ છંટકાવ કરવો.</li> </ul>
રીંગણુ	<p><b>વાનસ્પતિક વૃદ્ધિ અને ફુળ-કૂલ અવસ્થા:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>દુંઘ અને ફુળ કોરી ખાનાર ઈયળ : દુંઘ અને ફુળ કોરી ખાનાર ઈયળ નિયંત્રણ માટે કલોરપાઈટિફિસેસ ૨૦ ઈસી પ્રતિ ૨૦ મી.લી. અથવા ઓમામેક્ટીન બેન્ઝોયેટ ૫ દાણાદાર ત ગ્રામ અથવા કલોરઅન્ટાનીલીપોલ ૧૮.૫ એસસી ૩ મી.લી. અથવા સાયપરમોથ્રિસન ૧૦ ઈસી ૧૦ મી.લી. /૧૦ લિટર અથવા લેમડા-સાયહેલોથ્રિસન ૫ ઈસી ૫ મી.લી./૧૦ લિટર પાણીમાં ભેગવીને છંટકાવ કરવો.</li> <li>ગીર-સાવજ મેટીંગ ડીસરસન પેસ્ટ ૪૦૦ ગ્રામ/ લેક્ટરની ગ્રાણ માવજત આપવી. એક સરખા ૧૦૦૦ ટપકાને બે ડાળીની વચ્ચે જ૱યા પર ફેરસોપાણી પણી તથા પણીની બે માવજત ૩૦-૪૦ દિવસના અંતરે આપવી.</li> <li>નુકશાન થેયેલ દુંઘને અને ફુલને હાથ વડે તોડી ઈયળ સહિત નાશ કરવો.</li> <li>રીંગણુની દુંઘ અને ફુલની ખાનાર ઈયળ માટે લ્યુસી લ્યુર ની સંખ્યામાં ૪૦ ફેરોમેન ટ્રેપ / લેક્ટર નો ઉપયોગ કરવો, અને ૨૧ દિવસે લ્યુર બદલવી.</li> <li>સફેદ માખી : સફેદમાખીનાં નિયંત્રણ માટે ડાયફેન્થાયુરોન ૫૦ ડબલ્યુપી અથવા ઓક્ટોપાયરોપેન ૧૦ ગ્રામ / ૧૦ લિટર પાણીમાં ઉમેરીને છંટકાવ કરવો.</li> <li>લધુપણે રોગ : લધુપણે રોગના નિયંત્રણ માટે રોગીસ્ટ છોડને ઉપાડી નાશ કરવો. ભલામણ કરેલ શોષક પ્રકારની જંતુનાશકનો છંટકાવ કરવો.</li> <li>લીલાતડતહિયા નિયંત્રણ માટે ઈમિડાકલોપિડ ૧૭.૮ એસઅલ ૩ મિલી./૧૦ લિટર પાણીમાં મીશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.</li> <li>ફુળનો સડો : કાર્બેન્ડાઝીમ દવા ૧૦ ગ્રામ /૧૦ લિટર પાણીમાં મીશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.</li> <li>પાન કથીરીઃ નુકશાનવાળા પાનનો કથીરી સહીત ભેગા કરી તેનો નાશ કરવો.</li> </ul>

	<b>અથવા</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>હેનાજાકવીન ૧૦ ઈસી ૧૦ મિલી/૧૦ લિટર અથવા પ્રોપરગ્રાઇટ ૫૭ ઈસી ૧૦ મિલી/૧૦ લિટર પાણીમાં બેળવી પાક ઉપર છંટકાવ કરવો.</li> </ul>
મરચાં	<ul style="list-style-type: none"> <li>શ્રીપ્સ : ફિયોનિલ પ એસસી ૨૦ મિલી/૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્રાણ કરીને છંટકાવ કરવો.</li> <li>ફળનો સડો : કાર્બેન્ડાઈમ દવા ૧૦ ગ્રામ/૧૦ લિટર પાણીમાં મીશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.</li> </ul>
ઉષુકટીબંધિય કંદમૂળ પાકો	<ul style="list-style-type: none"> <li>જમીન તૈયાર કરી, કોહવાયેલું ધાણિયું ખાતર/કમ્પોસ્ટ ૨૦-૨૫ ટન/દે.પ્રમાણે જમીનમાં બેળવું.</li> <li>દક્ષિણ ગુજરાતના ભારે વરસાદીય વિસ્તારમાં સેન્ટ્રીય બેતીથી સૂરણની ગજેન્ટ જત ઉગાડવા માંગતા ખેડૂતોએ સૂરણની વાવણી પહેલા ચોળીનો લીલો પડવાશ ૨૦ કિલો/હેક્ટર બિયારણ લઈ કરવો. તથા ૪૫ થી ૬૦ દિવસોમાં વાવણી પહેલા તેને જમીનમાં દબાવવો.</li> </ul>
આંબા	<p><b>સામાન્ય સલાહ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>આંબાના મેઢની ઈયાગો થડમાંથી શોધીને મારી નાખો અને કાણાંની અંદર મી.લી./લી. દ્રાવણ નાંખી કાદવથી કાણાં બંધ કરી દેવા.</li> <li>મધિયાના નિયંત્રણ માટે ઈમિડાકલોગ્રિડ ૧૭.૮ એસએલ ત મિલી અથવા થયોમેથોક્ઝામ ૨૫ ડિગ્રીસ્યુર્યુલ ૪ ગ્રા. અથવા બ્યુગ્રેફેન્ઝિન ૨૫ એસસી ૧૦ મિલી./૧૦ લિટર પાણીમાં મીશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.</li> <li>ફળ ઉપર કાલવ્રાણથી નિયંત્રણ માટે કાર્બેન્ડાઈમ દવા ૧૦ ગ્રામ/૧૦ લિટર પાણીમાં મીશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.</li> <li>કેરીનાં ફળો વટાણા કદના થાય ત્યારે ૧ % નોવેલ ઓર્ગેનિક ન્યૂટ્રિન્ટ્સ (૧૦ મિલી/લીટર પાણીમાં) છંટકાવ કરવા થી ફળોનું ખરણ ઘટાડી શકાય છે.</li> </ul> <p><b>અથવા</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>કેરીના ફળો વટાણા અને લખોટી કદના થાય ત્યારે એન.એ.એ. (૨ગ્રામ) + યુરિયા (૨કિ.ગ્રા.) ૧૦૦ લીટર પાણીમાં નાખી છંટકાવ કરવાથી ફળોનું ખરણ અટકાવી શકાય છે.</li> <li>કેરીના ફળો વટાણા કે લખોટી કદના થાય ત્યારે રસાયણિક ખાતર (યુરિયા ૦.૭૫૦કિ.ગ્રા. અથવા અમોનિયમ સલ્ફેટ ૧.૮ કિ. ગ્રા.) આપવા.</li> <li>કેરીના ફળો વટાણા કે લખોટી કદના થાય પછી બે પિયત ૧૫-૨૦ દિવસ ના અંતરે આપવું.</li> <li>આંબાવાડીમાં ફળમાખીના નિયંત્રણ માટે ફળમાખીના મિથાઈલ યુઝનોલ યુક્ત પીંજર (૧૦ ટ્રેપ/દે.) મૂકવા.</li> <li>ફળના સડો તેમજ ફળમાખીના વ્યવાસ્થાપન કરવા માટે ફળોને ગરમ પાણીમાં ૫૦ %સે તાપમાને ૨૦ મીનીટ સુધી રૂબાડી રાખવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.</li> <li>ક્ર્યાયેલ ડાળી પર બોડેક્સ પેસ્ટ ૧૦ ટકા લગાડવું.</li> </ul>
ચીકુ	<p><b>સામાન્ય સલાહ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>બીજા હસ્તામાં ભલામણ કરેલ ખાતરનો ૫૦ ટકા ભાગ પ્રમાણે રસાયણિક ખાતર એમોનિયમ સલ્ફેટ ૨.૫ કિ.ગ્રા. અથવા યુરિયા ૧.૩ કિ.ગ્રા., સિંગલ સુપર ફ્લોસ્ફેર ૧-૨ કિ.ગ્રા., મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ ૦.૫ કિ.ગ્રા., ધાણિયું ખાતર ૫૦ કિ.ગ્રા. અને બાયોકાર્બિલાઈઝર (૫૦ મી.લી. - ૫૦ મી.લી. એઝોટોબેક્ટર, ફોસ્ફેર સોલ્યુબિલિઝિંગ બેક્ટેરિયા અને પોટાશ મોબિલિઝિંગ બેક્ટેરિયા) આ મહિનામાં આપવું.</li> </ul>

પશુપાલન	<p><b>સામાન્ય સલાહ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>પશુઓને પૂરતા પ્રમાણમા સમતોલ આહાર આપવો , જેમાં દાણ તેમજ પશુઓના રહેઠાણ ચોઝાયા રાખવા, દિવસ દરમ્યાન સમયાંતરે મળ-મૂતર નો નિકાલ કરવો.</li> <li>પશુઓને યોગ્ય આહારમા જરૂરીયાત પ્રમાણે ખનિજયુક્ત મિશ્રાણના સમાવેશ કરવો જોઈએ.</li> <li>નાના વાછરડા-પાડીયા ને રાત્રીના ઠંડા કલાકો માં બંદ કોઢ/ગમાણ માં અને દિવસે ગરમ ભેજવાના કલાકોમાં વૃક્ષ ના છાયા અથવા પૂરતી હવા ઉજસ વાળા શેડ માં રાખવા.</li> <li>ચાફ્ કટરથી ધાસચારાને ટુકડા કરીને જ નીરણ કરવું.</li> <li>સાઈલેજ અને કડબ જો હોય તો ધાસચારા તરીકે આપી શકાય.</li> <li>દુધાણા પશુઓના આઉને દૂધ દોહન પહેલા અને પછી ઝીક ઓક્સાઈડ અથવા બોરીક પાઉડર અથવા પોટેશીયમ પરમેગેનેટ ના ટ્રાવાણથી બરાબર સાફ્ કરવા.</li> <li>પશુઓનાં ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથીન અથવા એમીટાઇર ૨ મી.લી./લિટર પાણીમાં નાખને છાંટવી (દવાની બોટલ ઉપર લખેલી સૂચનાનો અમલ કરવો).</li> <li>ઉનાળાની શરૂઆત થતી હોઈ પશુઓ જયારે દૃઢ્ય ત્યારે પાણી પી શકે તેવી વ્યવસ્થા ઉભી કરવી જોઈએ અથવા ઓછામાં ઓછુ દિવસમાં ચારથી પાંચ વખત જરૂરીયાત મુજબ પાણી પીવડાવવું જોઈએ.</li> </ul>
વનીકરણ	<p><b>કૃષિ વનીકરણ : વાવેતર :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>પ્રથમ બને બીજા વર્ષના વાવેતર દરમ્યાનમાં નિદાન અને સફાય કરવી જોઈએ.</li> <li>જરૂરીયાત મુજબ વાવેતરમાં સિંચાઈ કરવી જોઈએ.</li> </ul>
ફીશરીઝ	<p><b>સામાન્ય સલાહ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>મીઠા પાણીના મસ્ય/મીઠા પાણીના છંગા ઉત્યાદન કરતા ખેડૂનોને જણાવવાનું કે , આ સમયગાળા દરમ્યાન પૂરતી માત્રામાં ખોરાક આપવોકારણ કે આ વાતાવરણ માછલી/મીઠા પાણીના છંગા માટે અનુકૂળ છે.</li> <li>તળાવમાં પાણીનું લેવલ જાળવવું.</li> <li>તળાવના તળિયાનું અને સપાટીનું તાપમાન સરખર કરવા એરેટર અથવા પંખ્ય ચલાવવા.</li> </ul>

#### ❖ એન્ગ્રોમેટ સલાહકાર સેવા બુકેટીન કમિટીના સભ્યો :

- ડૉ. એચ. એમ. વિરદીયા, સંશોધન વૈજ્ઞાનિક (સશ્ય વિજ્ઞાન)
- ડૉ. એલ. વી. ઘેટીયા, સહ પ્રાધ્યાપક (વનસ્પતિ કીટકશાસ્ત્ર)
- ડૉ. કે. બી. રાખોલીયા, સહ પ્રાધ્યાપક (વનસ્પતિ રોગશાસ્ત્ર)
- ડૉ. એસ. એન. સરવૈયા, પ્રધ્યાપક (શાકભાજ વિજ્ઞાન)
- ડૉ. વાય. એન. ટેલે, સહ પ્રાધ્યાપક (કૃષિ વિજ્ઞાન)
- ડૉ. વી. આર. પટેલ, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (પશુપાલન)
- ડૉ. દિલેશ્વર નાયક, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (વનીકરણ)
- ડૉ. એમ. આર. પટેલ, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (ફીશરીઝ સાયન્સ)
- ડૉ. વિભા ટાક, રીસર્ચ એસોસીયેટ (જ.કે.એમ.એસ.)
- ડૉ. પી. કે. પરમાર , મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (કૃષિ હવામાનશાસ્ત્ર) અને પ્રિન્સપાલ નોડલ ઓફિસર (જ.કે.એમ.એસ.)



# Gramin Krishi Mausam Sewa

Agricultural Meteorological Cell  
Navsari Agricultural University  
Navsari – 396450, Gujarat  
E-mail :- aasnnavsari@gmail.com



(Jointly issued by Navsari Agricultural University & India Meteorological Department)

DATE OF ISSUE: 25/05/2021

## Agromet Advisory Bulletin No: 16/2021 - 2022

### -- Navsari District --

#### Weather summary of preceding week 21 May to 25 May - 2021

Sr. No.	Name of Weather Parameters	Value
1.	Range of Rainfall (mm)	0.0-0.0
2.	Range of Maximum Temperature (°C)	33.0-34.5
3.	Range of Minimum Temperature (°C)	23.5-25.0
4.	Range of Relative Humidity (%)	62-92
5.	Range of Wind Speed (km/hr)	3.5-5.4
6.	Range of Cloud Cover (Okta)	0-5
7.	Range of bright sunshine hours (hrs)	9.5-10.6
8.	Last five days cumulative rainfall (mm)	0.0
<b>Total Rainfall (mm)</b>		<b>144.0</b>

#### IMD based Weather forecast for 26 May to 30 May -2021


Sr. No.	Weathers Parameters	Day - 1 (26/05)	Day - 2 (27/05)	Day - 3 (28/05)	Day - 4 (29/05)	Day - 5 (30/05)
1.	Rainfall (mm)	3	3	3	0	0
2.	Maximum temperature (°C)	36	35	34	34	34
3.	Minimum Temperature (°C)	28	26	27	27	27
4.	Max. Relative Humidity (%)	79	80	80	79	79
5.	Min. Relative Humidity (%)	51	60	61	60	60
6.	Wind Speed (km/hr.)	20	26	26	24	26
7.	Wind Direction (Compass point)	238	248	243	212	238
8.	Total Cloud Cover (Okta)	7	6	7	7	3

<b>Weather Summary/ Alert</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>As per IMD weather forecasts over the next five days, the sky will be cloudy and there is chance of light rainfall..</li> <li>The Maximum temperature 34 to 36 °C. when the Minimum temperature is 26 to 28 °C. likely to be around.</li> <li>The humidity in the air is likely to be between 51 and 80 percent.</li> <li>The wind direction will be South-West with an average speed of 20 to 26 km/h.</li> <li>As per Extended range forecast, rainfall in Gujarat region is likely to be above normal up to 05<sup>th</sup> June, 2021.</li> </ul>
-----------------------------------	--

## -:: South Gujarat Heavy Rainfall Zone ::-

<b>General Advisory</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Due to pandemic of CORONA (COVID-19), Farmers should maintain social distancing and safety precaution while handling farm machines and labour in the field.</li> <li>• Do the activity of spraying chemical and applying fertilizer as per the weather condition.</li> <li>• Farmers are advised to carry out different activities of farm as per the weather condition.</li> <li>• Download the MEGHDOOT mobile application, We will provide forecast to farmers relating to temperature, rainfall, humidity, wind speed and direction which play critical roles in agricultural operations and how to take care of the crops and livestock. Click on the following link to download the MEGHDOOT application.</li> </ul>
	<p>Android users: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot</a></p> <p>IOS users: <a href="https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155">https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155</a></p>

NOAA/VIIRS/BLENDED NDVI Composite ending on Week no 20  
(14.05.2021 to 20.05.2021) over Agricultural region



Agricultural Vigour is moderate over the state.

Crop	Weather based Agro-Advisory
<b>Kharif Paddy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prepare field for nursery by ploughing and harrowing, apply well decomposed FYM or Biocompost and prepare raised bed of 1m wide and convenient length. 1/10<sup>th</sup> area of Transplanting (1000 sq. m area of nursery for Transplanting in 1 ha field) should be used for nursery. Procure seeds of newly released variety of rice from University farm. 25 to 30 kg seeds require to transplant 1 ha area.</li> </ul>
<b>Summer Paddy</b>	<p><b>Grain filling/ maturity stage:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keep standing water upto 3-5 cm throughout reproductive stage.</li> <li>• At hardening of grain in panicle, withdraw the water from the field and allow drying the field.</li> <li>• At maturity harvest the crop.</li> </ul>
<b>Summer Pulse crop</b>	<p><b>Pod development/maturity stage:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Irrigated the crop as per requirement at the interval of 15-20 days.</li> <li>• Picking should be done for mature pods when required.</li> <li>• Harvest the crop when most of pods mature and prepare the field for kharif crop.</li> </ul>
<b>Sugarcane</b>	<p><b>Vegetative stage:</b></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keep field weed free by hand weeding/Interculturing.</li> <li>• Apply irrigation at the interval of 15-17 days.</li> <li>• Apply nitrogen fertilizer as top dressing as per recommendation.</li> <li>• Earthing up should be done after last dose of fertilizer applied around 5-6 month of planting.</li> <li>• In poorly drained field, dig 1 m deep drainage around field before rain start.</li> <li>• Application of <i>Carbofuron</i> 3G @ 33 kg/ha. in soil for control of sugarcane top shoot borer.</li> </ul>
<b>Summer Okra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Red Spider Mite:</b> Collection &amp; destruction of damaged leaves along with mites.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Or</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spraying of <i>Fenazaquin</i> 10 EC @ 10 ml./10 Lit. or <i>Propargite</i> EC 10 ml./10 Lit. of water for red Spider Mite.</li> <li>• <b>Okra Yellow mosaic virus:</b> Uproot infected plants and spraying systemic insecticides for control of white fly.</li> </ul>
<b>Cowpea</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Take plant protection measures.</li> </ul>
<b>Vegetable Crop</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Give Novel 1 lit./Vigna in soil.</li> <li>• Spray Novel 150 ml./15 lit. of water on standing crop.</li> <li>• The rate of NOLF for 1 lit. is 120 Rs.</li> <li>• NOLF (Novel plus) and NOLF (Novel prime) 200 Rs/lit.</li> <li>• Spraying <i>Mancozeb + Metalaxyl</i> 75 WP @ 20g /10 lit. water.</li> <li>• Spraying <i>Propargite</i> 57 EC @ 2.0 ml/1 lit. water for management of mite.</li> </ul>
<b>Brinjal</b>	<p><b>Vegetative &amp; Reproductive :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Shoot and Fruit borer:</b> Apply <i>Chlorpyriphos</i> 20 EC @ 20 ml or <i>Emamectin Benzoate</i> 5 SG @ 3 g. or <i>Chlorantraniliprole</i> 18.5 SC @ 3 ml. or <i>Cypermethrin</i> 10 EC @ 10 ml. or <i>Lambda-cyhalothrin</i> 5 EC @ 5 ml/10 lit. of water.</li> <li>• Three application of Gir sawaj mating disruption paste @ 400 g/ha. uniformly distributed in 1000 dots between two branches, first after a week of transplanting and successive two applications at 30-40 days interval.</li> <li>• Remove infested shoot &amp; fruit mechanically.</li> <li>• Install Pheromone trap with <i>Luci-Lure</i> @ 40 traps/ha for management of shoot and fruit borer in brinjal and replace lure at 21 days interval.</li> <li>• <b>Whitefly:</b> Spray <i>Diafenthizuron</i> or <i>Afidopyropfen</i> 50 WP @ 10 g/10 lit. of water.</li> <li>• <b>Little leaf:</b> Uproot and burn infected plant and spraying of systemic insecticide.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Fruit rot:</b> Spraying <i>Carbendazim</i> 50 WP @ 10 g / 10 lit. water.</li> <li>For control of jassi d spray <i>Imidacloprid</i> 17.8 SL @ 3 ml./10 lit. of water.</li> <li><b>Red Spider Mite:</b> Collection &amp; destruction of damaged leaves along with mites.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Or</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Spraying of <i>Fenazaquin</i> 10 EC @ 10 ml./10 Lit. or <i>Propargite</i> EC 10 ml./10 Lit. of water for red Spider Mite.</li> </ul>
<b>Chilli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Thrips :</b> Apply <i>Fipronil</i> 5 SC @ 20 ml per 10 lit. water.</li> <li><b>Anthracnose:</b> Spray <i>Carbendizium</i> @ 10 g/10 lit. of water.</li> </ul>
<b>Tropical Tuber crops</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Field preparation should be done, add well decomposed FYM/Compost@20-25t/ha.</li> <li>The farmers of south Gujarat Heavy Rainfall Zone, intending to grow elephant foot yam cv. Gajendra organically are advised to raise green manure cowpea (seed rate @ 20 kg ha<sup>-1</sup>) prior to elephant foot yam and incorporate green matter at 45-60 days.</li> </ul>
<b>Mango</b>	<p><b>General Advise :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Find maggots of stem borer from gallery and holes on the stem and kill them. Do pouring of <i>Chlorpyrifos</i> 20 EC @ 25 ml/ 10 lit. in hole and plug it with mud.</li> <li>Spray <i>Imidacloprid</i> 17.8 SL @ 3 ml. or <i>Thiamethoxam</i> 25 WG @ 4 g or <i>Buprofezin</i> 25 SC @10 ml./10 lit. water for control mango hopper.</li> <li>Spraying of <i>Carbendizium</i> @ 10 g /10 lit. of water for Anthracnose.</li> <li>Spray 1% Novel Organic nutrients (10 ml./lit. water) at pea stage and marble stage of fruit for reducing fruit drop.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Or</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Spray NAA (2g/100 lit.)+Urea (2 kg/100 lit.) at pea and marble stage of mango fruits for reducing fruit drop.</li> <li>Give fertilizer (Urea 0.750 kg or Ammonium Sulphate 1.8 kg per tree) as fruit reaches pea or marble stage.</li> <li>Give two irrigation at pea and marble stage of fruit at 15-20 days of interval.</li> <li>Install <i>Methyl Eugenol</i> trap (10 traps/ha.) for controlling <i>Fruit Flies</i> in mango orchard.</li> <li>Prevent post harvest loss of mango fruit dip in hot water at 50° C for 20 minutes for management of post harvest diseases and fruit fly.</li> <li>Application of 10 % Bordeaux paste in cut/pruning branches of fruit tree.</li> </ul>
<b>Sapota</b>	<p><b>General Advise :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apply second split of 50% of RDF (<i>Ammonium Sulphate</i> -2.5 kg or <i>Urea</i> 1.3 kg, <i>SSP</i> 1-2 kg and <i>MOP</i> 0.5 kg + <i>FYM</i> 50kg + <i>Azotobacter</i>, <i>PSB</i> and <i>KMB</i> @</li> </ul>

	50 ml of each tree).
Livestock	<p><b>General Advise :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provide adequate quantity of balanced ration, including compound concentrate mixture 6-8 kg good quality dry roughage with 15-20 kg green fodder to the animals.</li> <li>Small livestock should keep in shed hot humid hours of the day kept in below tree or properly aerated shed.</li> <li>Feed silage &amp; hay materials if available.</li> <li>Before and after milking udder must be properly clean with zinc oxide or boric powder or potassium permanganate solutions.</li> <li>For the control of ticks and other parasites, spray <i>Deltemethrin</i> or <i>Aemitaz</i> 2ml in 1 liter of water.</li> <li>Due to starting of summer season, it is ensure that animals get drinkable water round the clock, if not possible than after give adlib water atleast 4-5 times in a day.</li> </ul>
Forestry	<p><b>Agro Forestry : Plantations :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Weeding and cleaning should be done during first and second year plantations.</li> <li>Irrigation should be done as per the requirement in tree plantation.</li> </ul>
Fisheries	<p><b>General Advise :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fresh water farmers give proper feed in fish/prawn farming for better growth rate because environment condition is very suitable.</li> <li>Increase water depth.</li> <li>Mixing the top and bottom water by using the aerators or pumps.</li> </ul>

#### ❖ Members of Agro-Advisory Committee :

- Dr. H. M. Viradia, Research Scientist (Agronomy)
- Dr. L. V. Ghetiya, Associate Professor (Entomology)
- Dr. K. B. Rakholiya, Associate Professor (Plant Pathology):
- Dr. S. N. Saravaiya, Professor (Vegetable Science)
- Dr. Y. N. Tandel, Associate Professor (Fruit Science)
- Dr. V. R. Patel, Assistant Professor (Animal Husbandry)
- Dr. Dileswar Nayak, Assistant Professor (Forestry)
- Dr. M. R. Patel, Assistant Professor (Fisheries Science)
- Dr. Vibha Tak, Research Associate(GKMS)
- Dr. P. K. Parmar, Assistant Professor (Agricultural Meteorology and Principal Nodal Officer (GKMS))

## જવામાન આગાહી

વિગત	તારીખ	ડાંગ	નવસારી	વલસાડ
વરસાદ (મી.મી.)	૨૬/૦૫/૨૦૨૧	૦	૩	૨
	૨૭/૦૫/૨૦૨૧	૦	૩	૨
	૨૮/૦૫/૨૦૨૧	૦	૩	૨
	૨૯/૦૫/૨૦૨૧	૦	૦	૦
	૩૦/૦૫/૨૦૨૧	૦	૦	૦
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૬/૦૫/૨૦૨૧	૩૬	૩૬	૩૬
	૨૭/૦૫/૨૦૨૧	૩૫	૩૫	૩૫
	૨૮/૦૫/૨૦૨૧	૩૪	૩૪	૩૪
	૨૯/૦૫/૨૦૨૧	૩૪	૩૪	૩૪
	૩૦/૦૫/૨૦૨૧	૩૪	૩૪	૩૪
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૬/૦૫/૨૦૨૧	૨૮	૨૮	૨૮
	૨૭/૦૫/૨૦૨૧	૨૯	૨૯	૨૯
	૨૮/૦૫/૨૦૨૧	૨૯	૨૯	૨૯
	૨૯/૦૫/૨૦૨૧	૨૯	૨૯	૨૯
	૩૦/૦૫/૨૦૨૧	૨૯	૨૯	૨૯
મહત્તમ ભેજ (%)	૨૬/૦૫/૨૦૨૧	૮૫	૯૬	૮૨
	૨૭/૦૫/૨૦૨૧	૮૧	૮૦	૯૬
	૨૮/૦૫/૨૦૨૧	૮૦	૮૦	૮૦
	૨૯/૦૫/૨૦૨૧	૮૧	૯૬	૮૧
	૩૦/૦૫/૨૦૨૧	૯૬	૯૬	૮૦
લઘુત્તમ ભેજ (%)	૨૬/૦૫/૨૦૨૧	૩૬	૫૧	૫૪
	૨૭/૦૫/૨૦૨૧	૩૬	૬૦	૫૭
	૨૮/૦૫/૨૦૨૧	૪૭	૬૧	૫૬
	૨૯/૦૫/૨૦૨૧	૪૯	૬૦	૫૭
	૩૦/૦૫/૨૦૨૧	૪૩	૬૦	૫૭
પવનની ગતિ(ક્રિ.મી./કલાક)	૨૬/૦૫/૨૦૨૧	૧૮.૧	૨૦.૧	૧૭.૩
	૨૭/૦૫/૨૦૨૧	૨૩.૭	૨૨૬.૪	૨૨.૬
	૨૮/૦૫/૨૦૨૧	૨૩.૪	૨૫.૬	૨૨
	૨૯/૦૫/૨૦૨૧	૨૧.૬	૨૪.૪	૨૧.૧
	૩૦/૦૫/૨૦૨૧	૨૩.૬	૨૬	૨૨.૮
પવનની દિશા (ક્રમપાસ પોઇન્ટ)	૨૬/૦૫/૨૦૨૧	W	SW	W
	૨૭/૦૫/૨૦૨૧	W	W	W
	૨૮/૦૫/૨૦૨૧	W	SW	SW
	૨૯/૦૫/૨૦૨૧	W	SW	SW
	૩૦/૦૫/૨૦૨૧	W	SW	SW
વાદળની સ્થિતિની (ઓક્ટા)	૨૬/૦૫/૨૦૨૧	૭	૭	૭
	૨૭/૦૫/૨૦૨૧	૭	૭	૭
	૨૮/૦૫/૨૦૨૧	૭	૭	૭
	૨૯/૦૫/૨૦૨૧	૬	૭	૫
	૩૦/૦૫/૨૦૨૧	૪	૩	૩