



નવસારી કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલય

ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા

કૃષિ હવામાનશાસ્ત્ર સેલ
કૃષિ ઈજનેરી વિભાગ, ન. મ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય
નવસારી કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલય
નવસારી - ૩૮૬૪૫૦, ગુજરાત
ઇ-મેઇલ:- aasnavsari@gmail.com



ભારત મૌસમ વિજ્ઞાન
વિભાગ

(નવસારી કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલય અને ભારત મૌસમ વિજ્ઞાન વિભાગ દ્વારા પ્રસારિત)

જારી કરવાની તારીખ: ૨૫/૦૬/૨૦૨૬

કૃષિ હવામાન બુલેટીન નં : ૨૫/૨૦૨૬ - ૨૦૨૭

-- નવસારી જિલ્લો --

પાછળનાં સમયનું હવામાન (તા. ૧૮ જૂન થી ૨૩ જૂન - ૨૦૨૬)

અનુ. નં.	હવામાન પરિબલો	Value
૧.	વરસાદની શ્રેણી (મી.મી.)	૪.૦-૪૧.૦
૨.	મહત્તમ તાપમાનની શ્રેણી (સે.ગ્રે.)	૩૧.૨-૩૫.૩
૩.	લઘુત્તમ તાપમાનની શ્રેણી (સે.ગ્રે.)	૨૫.૮-૨૭.૦
૪.	ભેજની શ્રેણી (%)	૬૬-૮૬
૫.	પવનની ગતિની શ્રેણી (કિ.મી./કલાક)	૩.૫-૮.૦
૬.	વાદળની સ્થિતિની શ્રેણી (ઓકટા)	૨-૮
૭.	સૂર્યપ્રકાશિત સમયની શ્રેણી (કલાક)	૦.૮-૧.૬
૮.	પાછળના પાંચ દિવસમાં સંચિત વરસાદ (મી.મી.)	૪૫.૦
કુલ વરસાદ		૪૮.૦

આઈ. એમ. ડી. દ્વારા પ્રાપ્ત હવામાન આગાહી (તા ૨૬ જૂન મે થી ૩૦ જૂન - ૨૦૨૬)

અનુ. નં.	હવામાન પરિબલો	દિવસ-૧ (૨૬/૦૬)	દિવસ-૨ (૨૭/૦૬)	દિવસ-૩ (૨૮/૦૬)	દિવસ-૪ (૨૯/૦૬)	દિવસ-૫ (૩૦/૦૬)
૧.	વરસાદ (મી.મી.)	6	5	7	8	6
૨.	મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	34	34	35	34	34
૩.	લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	27	28	28	27	27
૪.	મહત્તમ ભેજ (%)	75	75	75	80	80
૫.	લઘુત્તમ ભેજ (%)	55	55	55	55	60
૬.	પવનની ગતિ (કિ.મી./કલાક)	14	11	12	14	16
૭.	પવનની દિશા (કમ્પાસ પોઇન્ટ)	246	246	242	245	244
૮.	વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	6	5	5	6	5

હવામાન સારાંશ / ચેતવણી	- આઈ. એમ. ડી., દ્વારા મળેલી હવામાનની આગાહી મુજબ આગામી પાંચ દિવસમાં આકાશમાં વાદળછાયું રહેશે અને હળવા વરસાદની સંભાવના છે. - મહત્તમ તાપમાન ૩૪ સે. થી ૩૫ સે., જ્યારે લઘુત્તમ તાપમાન ૨૭ સે. થી ૨૮ સે., આસપાસ હોવાની સંભાવના છે. - હવામાં ભેજનું પ્રમાણ ૫૫ થી ૮૦ ટકા વચ્ચે રહેવાની સંભાવના છે. - પવનની દિશા દક્ષિણ-પશ્ચિમ રહેશે જેની સરેરાશ ગતિ ૧૧ થી ૧૬ કિ.મી./કલાક રહેવાની શક્યતા છે.
---------------------------------------	--

-:: દક્ષિણ ગુજરાત ભારે વરસાદ વિસ્તાર ::-

સામાન્ય સલાહ	- જો પવનની ગતિ ૧૫ કિમી પ્રતિ કલાક કરતાં વધુ હોય તો ખેતરમાં કેમિકલ જેવાકે પેસ્ટિસાઈડ નો છંટકાવ ન કરવો. - દવા છંટકાવ અને ખાતર આપવાની કામગીરી થોડા દિવસ પુરતી મુલતવી રાખવી. - ખેડૂતોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે, ખેડૂતોને ખેતરની જુદા જુદા ખેતી કર્યો કરવા નહીં. - ખુબ વીજળી અને વરસાદના સમયે પશુ વૃક્ષ નીચે બાંધવા નહિ. - ખેતરના સેઢા, પાળા અને વરસાદના પાણીની નિકાલની ગટરોને સાફ કરી આગામી ચોમાસા માટે તૈયાર કરવી. - વધુ ઝડપી અને ઝાટક સાથેના પવન સામે રક્ષણ માટે બાગાયત પાકોના છોડને ફળ અવસ્થાએ લાકડા અથવા વાસં યાંત્રિક ટેકો આપવો. - કૃષિ હવામાન સલાહકારી બુલેટીન અને હવામાનની આગાહી અંગેની માહિતી મેળવવાં માટે ડાઉનલોડ કરો મેઘદૂત મોબાઈલ એપ્લિકેશન, જે ખેડૂતોને તેમની સ્થાનિક ભાષામાં સ્થાન, પાક અને પશુધન વિશે હવામાનઆધારિત કૃષિ સલાહ પ્રદાન કરશે. મેઘદૂત એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો: એન્ડ્રોઈડ યુઝર્સ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot આઈ.ઓ.એસ. યુઝર્સ: https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155 - દામિની મોબાઈલ એપ્લિકેશનદ્વારા આકાશીય વિજળીની અગાઉથી ચેતવણી આપવામાં આવે છે તેમજ આકાશીય વિજળીથી બચવા શું કરવું અને શું નહિ કરવું તેની વિગતવાર માહિતી પૂરી પાડવામાં આવે છે. આથી ખેડુતમિત્રોને દામિની મોબાઈલ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. દામિની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લીંક પર ક્લિક કરો: એન્ડ્રોઈડ યુઝર્સ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lighteninglive.damini આઈ.ઓ.એસ. યુઝર્સ: https://apps.apple.com/app/id1502385645
પાક	હવામાન આધારિત કૃષિ સલાહ
શેરડી	વાનસ્પતિક વિકાસ અવસ્થા/મહત્તમ પ્રથિ અવસ્થા - રોપણીના ૬, ૭ અને ૮ માસ બાદે સૂકા પાન કાઢીને તેનો ઉપયોગ આવરણ તરીકે કરો. - અંગારીઓ અને સુકરા રોગના નિયંત્રણ માટે રોગીસ્ત છોડનો નાશ કરવો અને કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ ડબલ્યુપી ૧૦ ગ્રા./૧૦ લી. પાણીમાં મિક્સ કરી તંદુરસ્ત છોડની ફરતે રેડવું. - ખેતરમાં વરસાદી પાણીનો નિકાલ કરવો.
ચોમાસુ ડાંગર	- ચોમાસુ ડાંગરના ધરૂ માટે જરૂરી જમીન ખેડ કરી, સમતળ કરી તૈયાર કરવી. - સારૂ કોહવાયેલ છાળયુ/ગણતયુ અથવા ઘનજીવામૃત ખાતર ખેડ સમયે જમીનમાં ભેળવવું. - જેટલા વિસ્તારમાં ફેરોપાણી કરવાની હોય તેના ૧/૧૦ ભાગના વિસ્તારમાં ધરુવાડીયું બનાવવું. નવી જાતનું પ્રમાણિત બીજ યુનિવર્સિટી ફામ પરથી મેળવી લેવું. ૧ હેક્ટર વિસ્તારમાં ફેરોપાણી માટે ૨૫-૩૦કિલો બીજની જરૂરત હોય છે. - વાવણી પહેલાં ડાંગરના બીજને ગાભમરાની ઈયળ નિયંત્રણ માટે થાયોમેથોકઝમ ૫૦% ડબલ્યુ એસ @ ૭.૫ ગ્રામ/કિગ્રા. બીજ અથવા ગાભમરાની ઈયળ અને પાન વાળનારી ઈયળ નિયંત્રણ માટે ક્લોરાન્ટ્રાનિલિપ્રોલ ૫૦% ડબલ્યુ/ ડબલ્યુ એફ એસ @ ૬.૦મિલી/કિલો બીજ જેવા જંતુનાશકોથી માવજત કરો જેથી સ્વસ્થ, જંતુમુક્ત અંકુરણ સુનિશ્ચિત થાય. - ધરુવાડીયુંમાં વરસાદી પાણીનો નિકાલ કરવો.
ભીંડા	- હવામાનની સ્થિતિ મુજબ પિયત આપો. - નીંદણ અને આંતર-પાક કામગીરી હાથ ધરવી જોઈએ. - ખેતરમાંથી પીળી નસના વિપાણુ જન્ય છોડ ને ઉપાડી નાશ કરો. - ભીંડામાં હેક્ટરે ૪૦ ફળ અને ડુખની ઈયળના ફેરોમોન સાથેના ટ્રેપ મુકવા. - રોગનો ફેલાવો સફેદ માખીથી થાતો હોય, સાયઅએન્ટ્રાનીલિપ્રોલ ૧૦.૨૬ ઓડી ૧૮ મિલી અથવા ડાઈકેન્ટિયરોન ૫૦ ડબલ્યુ પી ૧૨ ગ્રા. પ્રતિ ૧૦ લી. પાણીમાં ભેળવી પાક ઉપર છંટકાવ હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે કરવો. - ભીંડામાં પાન કથીરીના નિયંત્રણ માટે પ્રોપર્ગાઈટ ૫૭ ઈસી ૨૦ મિલી./૧૦ લીટર અથવા ફેનાઝાકવીન ૧૦ ઈસી ૧૦ મિલી./૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી પાક ઉપર છંટકાવ હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે કરવો. - ખેતરમાં વરસાદી પાણીનો નિકાલ કરવો.
ગુવાર	- ફળની પરિપક્વતા મુજબ લણણી કરવી. - ખેતરમાં વરસાદી પાણીનો નિકાલ કરવો.
પરવળ	- ફળની પરિપક્વતા મુજબ લણણી કરવી. - ખેતરમાં વરસાદી પાણીનો નિકાલ કરવો.


ટિડોળા	- નિદાંમણના નાશ માટે યોગ્ય પગલાં લેવા. - ખેતેરમાં વરસાદી પાણીનો નિકાલ કરવો.
સુરણ	- નિદાંમણના નાશ માટે યોગ્ય પગલાં લેવા. - ખેતેરમાં વરસાદી પાણીનો નિકાલ કરવો.
રતાળુ	- નિદાંમણના નાશ માટે યોગ્ય પગલાં લેવા. - ખેતેરમાં વરસાદી પાણીનો નિકાલ કરવો. - વેલાની પ્રશાખાઓને ટેકા પર ચઢાવવી.
તાનિયા	ખેતેરમાં વરસાદી પાણીનો નિકાલ કરવો.
આંબા	- આંબાના મેઢની ઈયળો થડમાંથી શોધીને મારી નાખો અને કાણાંની અંદર ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦ ઈસી @ ૨૫ મી.લી./૧૦ લી. દ્રાવણ નાંખી કાઢવથી કાણાં બંધ કરી દેવા. - કપાયેલ ડાળી પર બોડિકસ પેસ્ટ ૧૦ ટકા લગાડવું. - આંબાનાં નાના રોપાની જાળવણી માટે ટેકો આપવાની વ્યવસ્થા કરવી જેથી વરસાદ અને વધુ પવનની ઝડપ સામે ટકી શકે. - નવી કલમો માટે તૈયાર કરેલ ખાડામાં ૧૦ કિગ્રા. છાણિયું ખાતર, ૧ કિગ્રા. સિંગલ સુપર સલ્ફેટ અને ૧ કિગ્રા. મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ ખાતર આપવું. ઉધઈ અને કીડીનો ઉપદ્રવ કલમોમાં જોવા મળે તો ૫૦ મિલી / ઝાડ ક્લોરપાયરીફોસ ની માવજત ખાડા પૂરતી વખતે કરી દેવી. - આંબાવાડિયોમાં વરસાદી પાણીનો નિકાલ કરવો.
ચીકુ	- ચીકુનાં નાના રોપાની જાળવણી માટે ટેકો આપવાની વ્યવસ્થા કરવી જેથી વરસાદ અને વધુ પવનની ઝડપ સામે ટકી શકે. - ચીકુની નવી વાડી બનાવવા તંદુરસ્ત અને રોગમુક્ત કલમો અધિકૃત અને સરકારી નર્સરી માંથી મેળવવી જોઈએ. - નવી કલમો માટે તૈયાર કરેલ ખાડામાં ૧૦ કિગ્રા. છાણિયું ખાતર, ૧ કિગ્રા. સિંગલ સુપર સલ્ફેટ અને ૧ કિગ્રા. મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ ખાતર આપવું. - ઉધઈ અને કીડીનો ઉપદ્રવ કલમોમાં જોવા મળે તો ૫૦ મિલી / ઝાડ ક્લોરપાયરીફોસ ની માવજત ખાડા પૂરતી વખતે કરી દેવી. - બીજા ખાતરનો હુપતો ભલામણ કરેલ ખાતરનો ૨૫ ટકા ભાગ પ્રમાણે રાસાયણિક ખાતર એમોનિયમ સલ્ફેટ ૧.૩ કિગ્રા અથવા યુરિયા ૦.૬ કિગ્રા, સિંગલ સુપર ફોસ્ફેટ ૦.૮ કિગ્રા, મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ ૦.૩ કિગ્રા, છાણિયુ ખાતર ૨૫ કિગ્રા આ મહિનામાં હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે આપવું. - ચીકુવાડિયોમાં વરસાદી પાણીનો નિકાલ કરવો.

❖ **એગ્રોમેટ સલાહકાર સેવા બુલેટીન કમિટીના સભ્યો :**

- ડૉ. એચ. એમ. વિરડીયા, પ્રાધ્યાપક અને વડા (સશ્ય વિજ્ઞાન)
- ડૉ. જે. જે. પસ્તાગીયા, પ્રાધ્યાપક અને વડા (વનસ્પતિ કીટકશાસ્ત્ર)
- ડૉ. વાય. એન. ટેડેલ, પ્રાધ્યાપક (કૃષિ વિજ્ઞાન)
- ડૉ. વિભા ટાક, રીસર્ચ એસોસીયેટ (જી.કે.એમ.એસ.)
- ડૉ. બી. એમ. મોટે, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (કૃષિ હવામાનશાસ્ત્ર) અને પ્રિન્સિપાલ નોડલ ઓફિસર (જી.કે.એમ.એસ.)

NOAA/VIIRS/BLENDED NDVI Composite ending on Week no 24
(11.06.2026 to 17.06.2026) over Agricultural region

Gujarat



Agriculture vigour is moderate over Gujrat region of the state.

Source: <https://www.star.nesdis.noaa.gov>



Gramin Krishi Mausam Sewa

Agricultural Meteorological Cell
 Department of Agricultural Engineering
 N. M. College of Agriculture
 Navsari Agricultural University
 Navsari – 396450, Gujarat
 E-mail :- aasnavsari@gmail.com



(Jointly issued by Navsari Agricultural University & India Meteorological Department)

DATE OF ISSUE: 25/06/2026

Agromet Advisory Bulletin No: 25/2026 - 2027

-- Navsari District --

Weather summary of preceding week (23 June to 25 June-2026)

Sr. No.	Name of Weather Parameters	Value
1.	Range of Rainfall (mm)	4.0-41.0
2.	Range of Maximum Temperature (°C)	31.2-35.3
3.	Range of Minimum Temperature (°C)	25.8-27.0
4.	Range of Relative Humidity (%)	66-96
5.	Range of Wind Speed (km/hrs)	3.5-8.0
6.	Range of Cloud Cover (Okta)	2-8
7.	Range of bright sunshine hours (hrs)	0.9-1.6
8.	Last five days cumulative rainfall (mm)	45.0
Total Rainfall (mm)		48.0

IMD based Weather forecast for (26 June to 30 June - 2026)

Sr. No.	Weathers Parameters	Day - 1 (26/06)	Day - 2 (27/06)	Day - 3 (28/06)	Day - 4 (29/06)	Day - 5 (30/06)
1.	Rainfall (mm)	6	5	7	8	6
2.	Maximum temperature (°C)	34	34	35	34	34
3.	Minimum Temperature (°C)	27	28	28	27	27
4.	Max. Relative Humidity (%)	75	75	75	80	80
5.	Min. Relative Humidity (%)	55	55	55	55	60
6.	Wind Speed (km/hr.)	14	11	12	14	16
7.	Wind Direction (Compass point)	246	246	242	245	244
8.	Total Cloud Cover (Okta)	6	5	5	6	5

**Weather
Summary/
Alert**

- As per the forecast issued by India Meteorological Department over the next five days, the sky will be cloudy and there are chances of light rainfall at isolated places.
- The Maximum temperature is 34 °C to 35 °C, when the Minimum temperature is 27 °C to 28 °C, likely to be around.
- The humidity in the air is likely to be between 55 and 80 percent.
- The wind direction will be South-West with an average speed of 11 to 16 km/h.

-:: South Gujarat Heavy Rainfall Zone ::-


General Advisory	• Wind speed is high >15 kmph, so avoid spraying of pesticide. • Farmers are advised to postpone the different activities of farm as per the weather condition. • Don't keep the animal under tree when there is lightning during rain. • Cleaning ridge, fencing and drainage system of the field and preparing the field for the next monsoon. • Provide mechanical support to horticultural and vegetable crops during forecast of high wind velocity and heavy rain. • Download the MEGHDOOT mobile application for Agromet Advisory Services and information on weather forecasting, which will provide weather based agricultural advice to farmers for their location, crops and livestock in their local language. Click on the following link to download the MEGHDOOT application: Android users: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot IOS users: https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155 • Download the DAMINI Mobile application to ensure the safety through monitoring sky lightning activity. It will provide the alert and detail description of instruction, precaution, Do and Don't. Click on the following link to download the DAMINI application. Android users: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lighteninglive.damini IOS users: https://apps.apple.com/app/id1502385645
Crop	Weather based Agro-Advisory
Sugarcane	Vegetative Stage/Grand Growth Stage : • After 6, 7 & 8 month of planting remove dry leaves and use it as mulch. • Up root and burn whip smut and wilted plant from field. • Drenching <i>Carbendazim</i> 50 wp @ 10gm/10 lit water from prevent spread of both disease nearby healthy plants. • Drain out the excess rain water from the field.
Kharif Paddy	• Prepare field for nursery by ploughing and harrowing, apply well decomposed FYM or Biocompost or Ghanjivamrut fertilizer and prepare raised bed of 1m wide and convenient length. 1/10th area of Transplanting (1000 sq. m area of nursery for Transplanting in 1 ha field) should be used for nursery. Procure seeds of newly released variety of rice from University farm. 25-30 kg seeds require to transplant 1 ha area. • Treat the paddy seeds with a insecticides like <i>Thiamethoxam</i> 70 % WS @ 7.5 g/kg of seed for management of Yellow stem borer or a <i>Chlorantraniliprole</i> 50 % W/w FS @ 6.0 ml/kg seed for management of Yellow stem borer & Leaf Folder insects before sowing to ensure a healthy, insect-free germination. • Drain out the excess rain water from the Nursery.
Okra	• Weeding and intercultural operations should be carried out. • Apply irrigation as per weather condition. • 40 pheromone traps/hectare should be installed for controlled of okra fruit and shoot borer. • Up root and burn yellow vein mosaic infected okra plant from field. • Spraying <i>Cyantraniliprole</i> 10.26 OD @ 18 ml or <i>Difenthiuron</i> 50 WP @ 12 g/10 Lit. for whitefly (vector) management. • Spraying of <i>Propargite</i> 57 EC @ 20 ml/10 Lit. or <i>Fenazaquin</i> 10 EC @ 10 ml/10 Lit. of water for red Spider Mite during clear weather condition. • Drain out the excess rain water from the field.
Cluster bean	➤ Harvesting should be carried out as per maturity. ➤ Drain out the excess rain water from the field.
Pointed gourd	➤ Harvesting should be carried out as per maturity. ➤ Drain out the excess rain water from the field.
Little gourd	➤ Harvesting should be carried out as per maturity. ➤ Drain out the excess rain water from the field.
Elephant foot yam	➤ Take measures for weed control. ➤ Drain out the excess rain water from the field.
Greater yam	➤ Take measures for weed control. ➤ Drain out the excess rain water from the field.

	➤ Give proper support or train branches of vines.
Tannia	➤ Drain out the excess rain water from the field.
Mango	• Find grubs of stem borer from gallery and holes on the stem and kill them. Do pouring of <i>Chlorpyrifos</i> 20 EC @ 25 ml/ 10 lit in hole and plug it with mud in clear weather condition under clear weather condition. • Procure healthy and disease free planting material from authorized and government nursery for the new plantation. • Application of 10 % Bordeaux paste in cut/pruning branches of fruit tree. • Prepare pit for plantation of new grafts by filling 10 kg FYM, 1 kg SSP and 1 kg MOP. Give 50 ml/tree <i>Chlorpyrifos</i> to manage termite and ants. • Drain out the excess rain water from the sapota orchard.
Sapota	• Provide support to the young plants of Sapota to protect against rain and high wind speed. • Procure healthy and disease free planting material from authorized and government nursery for the new plantation. • Prepare pit for plantation of new grafts by filling 10 kg FYM, 1 kg SSP and 1 kg MOP. • Give 50 ml/tree <i>Chlorpyrifos</i> to manage termite and ants. • Apply second split of 25% of RDF (Ammonium Sulphate -1.3 kg or Urea 0.6 kg, SSP 0.8 kg and MOP 0.3 kg + FYM 25 kg each tree) in clear weather condition. • Drain out the excess rain water from the mango orchard.

❖ **Members of Agro-Advisory Committee :**

- Dr. H. M. Viradia, Professor & Head (Agronomy)
- Dr. J. J. Pastagia, Professor & Head (Entomology)
- Dr. Y. N. Tandel, Professor (Fruit Science)
- Dr. Vibha Tak, Research Associate(GKMS)
- Dr. B. M. Mote, Assistant Professor (Agricultural Meteorology and Principal Nodal Officer (GKMS)

NOAA/VIIRS/BLENDED NDVI Composite ending on Week no 24
(11.06.2026 to 17.06.2026) over Agricultural region
Gujarat



Agriculture vigour is moderate over Gujrat region of the state.

Source: <https://www.star.nesdis.noaa.gov>

પહવામાન આગાહી

વિગત	તારીખ	ડાંગ	નવસારી	વલસાડ
વરસાદની શ્રેણી (મી.મી.)	૨૬/૦૬/૨૦૨૬	૫	૬	૫
	૨૭/૦૬/૨૦૨૬	૬	૫	૬
	૨૮/૦૬/૨૦૨૬	૬	૭	૭
	૨૯/૦૬/૨૦૨૬	૭	૮	૮
	૩૦/૦૬/૨૦૨૬	૮	૬	૯
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૬/૦૬/૨૦૨૬	૩૨	૩૪	૩૪
	૨૭/૦૬/૨૦૨૬	૩૩	૩૪	૩૪
	૨૮/૦૬/૨૦૨૬	૩૪	૩૫	૩૫
	૨૯/૦૬/૨૦૨૬	૩૪	૩૪	૩૪
	૩૦/૦૬/૨૦૨૬	૩૨	૩૪	૩૪
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૬/૦૬/૨૦૨૬	૨૬	૨૭	૨૭
	૨૭/૦૬/૨૦૨૬	૨૬	૨૮	૨૮
	૨૮/૦૬/૨૦૨૬	૨૭	૨૮	૨૮
	૨૯/૦૬/૨૦૨૬	૨૭	૨૭	૨૭
	૩૦/૦૬/૨૦૨૬	૨૭	૨૭	૨૭
મહત્તમ ભેજ (%)	૨૬/૦૬/૨૦૨૬	૯૫	૭૫	૭૫
	૨૭/૦૬/૨૦૨૬	૮૫	૭૫	૭૫
	૨૮/૦૬/૨૦૨૬	૮૫	૭૫	૭૫
	૨૯/૦૬/૨૦૨૬	૮૫	૮૦	૮૦
	૩૦/૦૬/૨૦૨૬	૯૦	૮૦	૮૦
લઘુત્તમ ભેજ (%)	૨૬/૦૬/૨૦૨૬	૫૫	૫૫	૫૫
	૨૭/૦૬/૨૦૨૬	૬૦	૫૫	૫૫
	૨૮/૦૬/૨૦૨૬	૬૦	૫૫	૫૫
	૨૯/૦૬/૨૦૨૬	૬૦	૫૫	૫૫
	૩૦/૦૬/૨૦૨૬	૬૦	૬૦	૬૦
પવનની ગતિ (કિ.મી./કલાક)	૨૬/૦૬/૨૦૨૬	૧૧	૧૪	૯
	૨૭/૦૬/૨૦૨૬	૯	૧૧	૬
	૨૮/૦૬/૨૦૨૬	૧૦	૧૨	૮
	૨૯/૦૬/૨૦૨૬	૯	૧૪	૯
	૩૦/૦૬/૨૦૨૬	૧૧	૧૬	૧૨
પવનની દિશા (કમ્પાસપોઈન્ટ)	૨૬/૦૬/૨૦૨૬	SW	SW	SW
	૨૭/૦૬/૨૦૨૬	SW	SW	SW
	૨૮/૦૬/૨૦૨૬	SW	SW	SW
	૨૯/૦૬/૨૦૨૬	SW	SW	SW
	૩૦/૦૬/૨૦૨૬	SW	SW	W
વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	૨૬/૦૬/૨૦૨૬	૬	૬	૬
	૨૭/૦૬/૨૦૨૬	૫	૫	૫
	૨૮/૦૬/૨૦૨૬	૬	૫	૫
	૨૯/૦૬/૨૦૨૬	૫	૬	૬
	૩૦/૦૬/૨૦૨૬	૬	૫	૬