



નવસારી ફુલ વિશ્વવિદ્યાલય

ગ્રામીણ ફુલ મૌસમ સેવા

ફુલ હવામાનશાસ્ત્ર એલ
નવસારી ફુલ વિશ્વવિદ્યાલય
નવસારી - ૩૬૭૪૫૦, ગુજરાત
ઈ-મેઈલ:- aasnavsari@gmail.com

ભારત મૌસમ વિજ્ઞાન
વિભાગ

(નવસારી ફુલ વિશ્વવિદ્યાલય અને ભારત મૌસમ વિજ્ઞાન વિભાગ દ્વારા પ્રસારિત)

તા. ૦૫/૦૪/૨૦૨૪

ફુલ હવામાન બુલેટીન નં : ૦૨/૨૦૨૪ - ૨૦૨૫

-- નવસારી જિલ્લો --

પાછળનાં સમયનું હવામાન (તા. ૦૨ એપ્રિલ થી ૦૫ એપ્રિલ - ૨૦૨૪)

અનું. નં.	હવામાન પરિબળો	Value
૧.	વરસાદની શ્રેણી (મી.મી.)	૦.૦
૨.	મહત્તમ તાપમાનની શ્રેણી (સે.ગ્રે.)	૩૬.૫-૩૭.૫
૩.	લધુત્તમ તાપમાનની શ્રેણી (સે.ગ્રે.)	૧૬.૦-૧૬.૧
૪.	બેજની શ્રેણી (%)	૨૩-૬૮
૫.	પવનની ગતિની શ્રેણી (કિ.મી./કલાક)	૧.૬-૨.૩
૬.	વાદળની સ્થિતિની શ્રેણી (ઓક્ટા)	૦-૧
૭.	સુર્યપ્રકાશિત સમયની શ્રેણી (કલાક)	૮.૦-૮.૪
૮.	પાછળના પાંચ દિવસમાં સંચિત વરસાદ (મી.મી.)	૦.૦
કુલ વરસાદ		૦.૦

આઈ. એમ. ડી. દ્વારા પ્રાપ્ત હવામાન આગાહી (તા. ૦૬ એપ્રિલ થી ૧૦ એપ્રિલ - ૨૦૨૪)

અનું. નં.	હવામાન પરિબળો	દિવસ-૧ (૦૬/૦૪)	દિવસ-૨ (૦૭/૦૪)	દિવસ-૩ (૦૮/૦૪)	દિવસ-૪ (૦૯/૦૪)	દિવસ-૫ (૧૦/૦૪)
૧.	વરસાદ (મી.મી.)	૦	૦	૦	૦	૦
૨.	મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૩૬	૩૬	૩૬	૪૦	૪૧
૩.	લધુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૩	૨૨	૨૧	૨૧	૨૨
૪.	મહત્તમ બેજ (%)	૪૬	૪૮	૫૦	૫૮	૫૧
૫.	લધુત્તમ બેજ (%)	૨૫	૨૫	૨૧	૨૩	૨૬
૬.	પવનની ગતિ (કિ.મી./કલાક)	૧૩	૧૨	૧૧	૧૧	૧૨
૭.	પવનની દિશા (કમ્પાસ પોઇન્ટ)	૩૧૫	૨૫૨	૨૪૮	૧૬૨	૨૨૫
૮.	વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટા)	૪	૪	૪	૪	૪

હવામાન સારાંશ / ચેતવણી	<ul style="list-style-type: none"> આઈ. એમ. ડી. , દ્વારા મળેલી હવામાનની આગાહી મુજબ આગામી પાંચ દિવસમાં આકાશ આંશિક વાદળથાં રહેશે અને વરસાદ પડવાની સંભાવના નથી. મહત્તમ તાપમાન ઉઠ સે. થી ૪૧ સે. જાયારે લધુત્તમ તાપમાન ૨૧ સે. થી ૨૩ સે. આસપાસ હોવાની સંભાવના છે. હવામાં બેજનું પ્રમાણ ૨૧ થી ૬૦ ટકા વચ્ચે રહેવાની સંભાવના છે. પવનની દિશા પરિચિત રહેશે જેની સરેરાશ ગતિ ૧૧ થી ૧૩ કિ.મી./કલાક રહેવાની શક્યતા છે. વિસ્તૃત રેનજની આગાહી મુજબ, ૧૬ એપ્રિલ, ૨૦૨૪ સુધી શુષ્ક હવામાન રહેવાની શક્યતા છે અને મહત્તમ તાપમાન સામાન્ય થી નીચે અને લધુત્તમ તાપમાન સામાન્ય રહેવાની શક્યતા છે.
---------------------------	--

-:: દક્ષિણ ગુજરાત બારે વર્ષસાદ વિસ્તાર ::-

સામાન્ય સલાહ	<ul style="list-style-type: none"> • જો પવનની ગતિ ૧૫ કિમી પ્રતિ કલાક કરતાં વધુ હોય તો ખેતરમાં કેમિકલ જેવાંકે પેસ્ટિસાઈડ નો છંટકાવ ન કરવો. • ઊભા પાકોમાં ભલામણ મુજબના ખાતરો તથા જરૂરિયાત મુજબ પિયત આપવું અને આકાશ ચોખખું હોય તથા પવનની ગતિ ઓછી રહે ત્યારે જંતુનાશક તથા કૂગનાશક દવાની જોડે ડીટરજન્ટ પાઉડર અથવા સ્ટીકર (ગુંદરીયુ) નો ઉપયોગ કરીને છંટકાવ કરવો. • મહત્તમ તાપમાનમાં અચાનક વધારો થવાને કારણે દિવસ દરમિયાન ગ્રાણીઓને શેડ/આચાદિન વિસ્તારની નીચે રાખો. • પાકને મહત્તમ તાપમાનથી બચાવવા માટે શાકભાજના ખેતરમાં નીદાણ ન કરવું. • કૃષિ હવામાન સલાહકારી બુકેટીન અને હવામાનની આગાહી અંગેની માહિતી મેળવવાં માટે ડાઉનલોડ કરો મેધાવું મોબાઇલ એપ્લિકેશન, જે ખેડુતોને તેમની સ્થાનિક ભાષામાં સ્થાન, પાક અને પશુધન વિશે હવામાનાધારિત કૃષિ સલાહ પ્રદાન કરશે. મેધાવું એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો: <p>એન્ડ્રોઇડ યુઝર્સ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot</p> <p>આઈ.ઓ.એસ. યુઝર્સ: https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155</p> <ul style="list-style-type: none"> • દામિની મોબાઇલ એપ્લિકેશનદ્વારા આકાશીય વિજળીની અગાઉથી ચેતવણી આપવામાં આવે છે તેમજ આકાશીય વિજળીથી બચાવા શું કરવું અને શું નહિ કરવું તેની વિગતવાર માહિતી પૂરી પાડવામાં આવે છે. આથી જેનું મિત્રોને દામિની મોબાઇલ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. દામિની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો: એન્ડ્રોઇડ યુઝર્સ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lighteninglive.damini <p>આઈ.ઓ.એસ. યુઝર્સ: https://apps.apple.com/app/id1502385645</p>
---------------------	---

NOAA/NASA/BUFR/INDIGO NDVI Composite ending on Week no 13

(25.03.2024 to 31.03.2024) over Agricultural region

Gujarat

Agriculture vigour is good at isolated places over the state.

Source: <https://www.ndvi-ndds.org>

પાક	હવામાન આધારિત કૃષિ સલાહ
શેરડી	<p>વાનસ્પતિક વિકાસ અવસ્થા</p> <p>પૂરતી ખાતરની ભલામણ મુજબ નાઈટ્રોજન ખાતર આપવું.—</p> <ul style="list-style-type: none"> • બીજો ડોઝ – ૨૫૦ કિગ્રા. નાઈટ્રોજન/લે. ના. ૩૦% મુજબ વાવણીના ૩ થી ૩.૫ માસ બાદ , ત્રીજો ડોઝ – ૨૫૦ કિગ્રા. નાઈટ્રોજન/લે. ના. ૨૦% મુજબ વાવણીના ૪ થી ૪.૫ માસ બાદ , ચોથો ડોઝ – ૨૫૦ કિગ્રા. નાઈટ્રોજન/લે. ના. ૩૫% મુજબ વાવણીના ૫.૫ થી ૬ માસ બાદ (ભારે પાળા ચડાવ્યા પહેલાં). • જમીન/વાતાવરણ અને પાકની અવસ્થા મુજબ જરૂરી પિયત આપવું. ઉનાળામાં - ૧૫-૧૭ દિવસના ગાળે પિયત આપવું અથવા ટપક પિયત અપનાવી અને બે હર વર્ષે સૂકી પતારીનું આવરણ (મલવિંગ) કરી પિયત પાવણીની ભયત કરવો. • પાકને વાવણીના ચાર માસ સુધી નીદાણ મુક્ત રાખવું , આ માટે સમયાંતરે આંતરખેડ અને હાથથી નીદાણ કરવું અથવા નીદાણનાશક દવા ૨,૪-D – Na સોલ્ટ (૧.૨ કિગ્રા. સંક્રિયતવ/લે.) + પેરાક્વોટ (૦.૬૦૦ કિગ્રા. સંક્રિયતવ/લે.) [૨,૪-D – Na સોલ્ટ ૩૦ ગ્રા. + પેરાક્વોટ (૫૦ ગ્રા. પ્રતિ ૧૦ લિટર)] ૩૦-૬૦ દિવસ વર્ષે છંટકાવ કરવો. • વાવણીના ૩-૩.૫ માસે અને ૫-૬ માસે પાળા ચડાવવા. • હવામાનમાં તાપમાન વધવાથી ઉપદ્રવમાં વધારો થાય છે , તેથી શેરડી દુંખના વધેકો માટે કાર્બોક્સ્યુરાન રીસીજુલ્યુનાની આપવું.
ઉનાળ ડાંગર	<p>કૂટ અવસ્થા:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ક્યારીમાં ૨-૩ સેમી. પાવણી ભરાય તે રીતે પિયત આપવું • નાઈટ્રોજન ખાતરનો પ્રથમ પૂરતી ખાતરની હપ્તો ૪૦ કિગ્રા. ના./લે. રોપણીના ૨૦-૨૫ દિવસ બાદ આપવો. ખાતર આપતા પહેલા ક્યારીમાંથી પાવણી નિતારી દેવું અને ૧ દિવસ બાદ ફરી ભરવું. • ડાંગરની ક્યારી નીદાણ મુક્ત રાખવી. આ માટે હાથથી નીદાણ કરવું અને પેડી વીડર ચલાવવું.

ઉનાળુ કંડોળ	વાવણી/વાનસ્પતિક વિકાસ અવસ્થા <ul style="list-style-type: none"> પારવણી અને ખાલા પૂર્ણ વાવણીના ૧૫-૨૦ દિવસ બાદ કરવું. એતરને વાવણીના ૪૫ દિવસ સુધી નીંદળ મુક્ત રાખવું. આ માટે હાથથી નીંદળ કરવું અને આંતર ઐડ કરવી. જમીન અને વાતાવરણ ધ્યાને રાખી પિયત આપવું.
ઉનાળુ ભીડા	<ul style="list-style-type: none"> કુમળા અને વેચાળુલાયક ફૂળોની વીળી હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે કરવી જોઈએ. રોગ-જીવાતવાળા અને બગડેલા ફૂળો દૂર કરવા જોઈએ. જરૂરિયાત મુજબ પિયત આપવું. નિદાંમણના નાશ માટે યોગ્ય પગલાં લેવા. ભીડામાં ભૂકીદ્ધારા અને પાનના ટપકના નિયંત્રણ માટે હેક્સાકોનાઓલ પ. એસિ ૧૦ મિલી. અથવા કાર્બોનાઇડ ૫૦ ડબલ્યુપી પ ગ્રા પ્રતિ ૧૦ લી. પાણીમાં મીશ્ર કરી હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે છંટકાવ કરવો. પાન કથીરીઃ નુકશાનવાળા પાનનો/છોડ કથીરી સહીત ભેગા કરી તેનો નાશ કરવો. અથવા તાપમાનમાં વધારો થવાથી ભીડામાં પાન કથીરિના નિયંત્રણ માટે ફેનાઝાકવીન ૧૦ ઈસી ૧૦ મિલી અથવા સ્પાયરોમેસીફીન ૨૨.૮ એસ.સી ૮ મિલી પ્રતિ ૧૦ લી પાણીમાં ભેગવી ને પાક ઉપર હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે છંટકાવ કરવો.
રબી રીગણ	<ul style="list-style-type: none"> કુમળા અને વેચાળુલાયક ફૂળોની વીળી હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે કરવી જોઈએ. રોગ-જીવાતવાળા અને બગડેલા ફૂળો દૂર કરવા જોઈએ. જરૂરિયાત મુજબ પિયત આપવું. નિદાંમણના નાશ માટે યોગ્ય પગલાં લેવા. રીગણની ફૂળ અને દુખ ની ઈયણના ૪૦ ફેરોમોન ટ્રેપ પ્રતિ ૫૦ મિનિટ હેક્ટરદીઠ મુકવા. લધુપણી રોગ: રોગીસ્ટ છોડ ને ઉપાડી નાશ કરવો. પાન કથીરીઃ નુકશાનવાળા પાનનો/છોડ કથીરી સહીત ભેગા કરી તેનો નાશ કરવો. અથવા તાપમાનમાં વધારો થવાથી રીગણની પાન કથીરિના નિયંત્રણ માટે પ્રોપર્ગાઈટ ૫૭ ઈસી ૨૦ મિલી. અથવા ફેનાઝાકવીન ૧૦ ઈસી ૧૦ મિલી અથવા ઈટોક્ષા સોઝોલ ૧૦ એસ.સી ૮ મિલી અથવા સ્પાયરોમેસીફીન ૨૨.૮ એસ.સી ૮ મિલી પ્રતિ ૧૦ લી પાણીમાં ભેગવી ને પાક ઉપર હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે છંટકાવ કરવો.
ચોળી	<ul style="list-style-type: none"> કુમળા અને વેચાળુલાયક શીંગની વીળી હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે કરવી જોઈએ. રોગ-જીવાતવાળા અને બગડેલા શીંગો દૂર કરવા જોઈએ. જરૂરિયાત મુજબ પિયત આપવું. નિદાંમણના નાશ માટે યોગ્ય પગલાં લેવા.
ગુવાર	<ul style="list-style-type: none"> કુમળા અને વેચાળુલાયક શીંગની વીળી હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે કરવી જોઈએ. રોગ-જીવાતવાળા અને બગડેલા શીંગો દૂર કરવા જોઈએ. જરૂરિયાત મુજબ પિયત આપવું. નિદાંમણના નાશ માટે યોગ્ય પગલાં લેવા.
પરવળ	<ul style="list-style-type: none"> ફૂળ તૈયાર થયા બાદ તેની વીળી કરવી અને જરૂરિયાત મુજબ પિયત આપવું.
ટિંડોળા	<ul style="list-style-type: none"> ફૂળ તૈયાર થયા બાદ તેની વીળી કરવી અને જરૂરિયાત મુજબ પિયત આપવું.
આંબા	સામાન્ય સલાહ: <ul style="list-style-type: none"> આંબાના મેઢની ઈયણો થડમાંથી શોધીને મારી નાખો અને કાણાંની અંદર કલોરપાયરીફોસ ૨૦ ઈસી ૨૫ મી.લી./૧૦ લી. ટ્રાવણ નાંખો કાદવથી કાણાં બંધ કરી ટેવા. આંબાનાં નાના રોપાની જગાવણી માટે ટેકો આપવાની વ્યવસ્થા કરવી જેથી વરસાદ અને વધુ પવનની ઝડપ સામે ટકી શકે. કેરી નું ખરણ ઘટાડવા માટે આંબાવાડીમાં નોવેલ ૧% (૧ લિટર) અથવા એન.એ.એ. (૨ ગ્રામ)+ યુરિયા (૨ કિ.ગ્રા.) પ્રતિ ૧૦૦ લિટર પાણીમાં ઓગળીને છંટકાવ કરવો. કેરી વટાળા થી લખોટા કટની થાય ત્યારે યુરિયા (૮૦૦ ગ્રા.) અથવા અમોનિયમ સલફેટ (૧.૮ કિ.ગ્રા.) ખાતર પિયત સાથે આપવું. આંબામાં મધ્યિયાના નિયંત્રણ માટે ઈમિડકલોપ્રિડ ૧૭.૮ એસ એલ. ૩ મિલી અથવા થાયોમેથોક્ઝામ ૨૫ ડબલ્યુ જી ૧૦ ગ્રા. અથવા બુંગ્રોડ્ઝિન ૨૮ ઈસી ૨૦ મીલી. અથવા ડેલ્ટામેશ્નીન ૨.૮ ઈસી ૫ મિલી. અથવા લેમડા સાયલેવોશ્નીન ૫ ઈસી ૧૦ મીલી પ્રતિ ૧૦ લી પાણીમાં સંપૂર્ણ જાડ ઉપર છંટકાવ હવામાન ચોખ્ખુ

	<p>હોય ત્યારે કરવો.</p> <ul style="list-style-type: none"> તાપમાનમાં તથા હવાની આર્દ્રતામાં વધારો થાય છે તે મુજબ આંબામાં શ્રિપ્સની વસ્તી વધારના નિયંત્રણ ટોલ્કન્પાયરાડ ૧.૫ ઈસી ૨૦ મીલી પ્રતિ ૧૦ લી. પાણી મુજબ જાડ ઉપર છંટકાવ કરવો. કાલવાર્ષ ના નિયંત્રણ માટે લેલ્કસોનોઝોલ્પ ઈસી ૧૦ મિલી અથવા કાર્બેન્ડાઇમ ૫૦ ઉભલ્યુપી ૫ ગ્રા. પ્રતિ ૧૦ લી. પાણીમાં મિક્સ કરી હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે છંટકાવ કરવો. કેરીનું ખરણ ઘટાડવા આંબાવાડીમાં ડાંગરની પરાડ અથવા આંબમાં પાછડાનું આવરણ કરવું અને હળવું પિયત આપવું.
ચીકુ	<ul style="list-style-type: none"> બીજા વિભાજનમાં ભલામણ કરેલ ખાતરનો ૨૫ ટકા ભાગ પ્રમાણે રાસાયનિક ખાતર એમોનિયમ સલ્ફેટ ૧.૩ કિગ્રા અથવા યુરિયા ૦.૬ કિગ્રા, સિંગલ સુપર ફોસ્ફેટ ૦.૮ કિગ્રા, મ્યુરેટ ઓફ્ પોટાશ ૦.૩ કિગ્રા, છાણિયુ ખાતર ૨૫ કિગ્રા આ મહિનામાં હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે આપવું.
પશુપાલન	<p>સામાન્ય સલાહ:</p> <ul style="list-style-type: none"> પશુઓને દૂધ ઉત્પાદન અને નિભાવની જરૂરિયાત ધ્યાનમાં લઈ પૂરતા પ્રમાણમાં સમનોલ આહાર આપવો. તેમજ પશુઓના રહેઠાણ ચોખ્ખા રાખવા, દિવસ દરમ્યાન સમયાંતરે મળ-મૂનર નો નિકાલ કરવો. પશુઓને યોગ્ય આહારમા જરૂરીયાત પ્રમાણે ખનિજ્યુકત મિશ્રણના સમાવેશ કરવો જોઈએ. ચાફ્ કટરથી લીલા તથા સૂક્ષ્મ ધાસચારાને ટુકડા કરીને જ નીરણ કરવું. દૂધાણા પશુઓના આઉને દૂધ દોહન પહેલા અને પછી ઝીક ઓક્સાઈડ અથવા બોરીક પાઉડર અથવા પોટેશીયમ પરમેગેનેટ ના દ્રાવણથી બરાબર સાફ્ કરવા. પશુઓનાં ઈન્ટરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથીન અથવા એમીટાઝર ૨ મી.લી./લિટર પાણીમાં નાખને છાંટવી (દવાની બોટલ ઉપર લાખેલી સૂચનાનો અમલ કરવો). પશુઓ જ્યારે ઈચ્છે ત્યારે પાણી પી શકે તેવી વ્યવસ્થા ઉભી કરવી જોઈએ અથવા ઓછામાં ઓછુ દિવસમાં ચારથી પાંચ વાખત જરૂરીયાત મુજબ પાણી પીવડાવવું જોઈએ. કોઢ/ગમાણની ઉચ્ચાઈ ૧૦ ફૂટથી વધારે રાખવી, જેથી હવાની હેર્ફેર સરળતાથી થઈ શકે, બફરો/ગરમી ઓછી થાય અને ભોયાતળિયાનો ભાગ સુકો રહે. વિધાન બાદ વાઇરડા/પાડીયાને અડધાથી એક કલાકની અંદર ૫૦૦ મી.લી. જેટલું ચીક / ખીરં પીવડાવવું ત્યારબાદ પંદર દિવસ સુધી વાઇરડા/પાડીયાં કુલ વજન ના ૧૦ માં ભાગનું દૂધ/દિવસ પીવડાવવું. પશુ ઈચ્છે ત્યારે પાણી પી તેવી વ્યવસ્થા રાખવી અથવા દિવસમાં ઓછા માં ઓછુ ચાર વાર પશુની જરૂરીયાત મુજબ પાણી આપવું. મહત્તમ તાપમાનમાં અચાનક વધારો થવાને કારણે દિવસ દરમિયાન પ્રાણીઓને શેડ/આછાદિન વિસ્તારની નીચે રાખો. ગરમીની ઋતુમાં પશુઓનું શારીરિક તાપમાન જળવાય રહે તે માટે કોઢ/ગમાણમાં પંખાની વ્યવસ્થા કરવી અથવા બાપોરના સમયમાં વૃક્ષના છાયડામાં રાની શકાય.
વનીકરણ	<ul style="list-style-type: none"> પ્રથમ બને બીજા વર્ષના વાવેને દરમ્યાનમાં નિંદાણ અને સફ્ટને જોઈએ. નવા સાગના રોપાના માટે પસંદ કરેલામાંથી સાગ અથવા વતા વૃક્ષમાંથી સાગ (સેગ) ના પરિપક્વ બીજ એકત્રિત કરો.
ઝીશરીઝ	<p>સામાન્ય સલાહ:</p> <ul style="list-style-type: none"> મીઠા પાણીના મન્સ્ય મીઠા પાણીના જુંગા ઉત્યાન કરતા ખેડૂનોને જણાવવાનું કે, આ સમયગાળા દરમ્યાન પૂરતી માત્રામાં ખોરાક આપવોકરાણ કે આ વાતાવરણ માછલી/મીઠા પાણીના જુંગા માટે અનુકૂળ છે. તળાવમાં પાણીનું લેવલ જાળવવું અને વધુ વરસાદ આવે ત્યારે તળાવના આઉટબેટ થોડી માત્રામાં ખોલવા તેથી પાણીનું લેવલ જાળવાયેલું રહે તળાવના તળિયાનું અને સપાટીનું તાપમાન સરખર કરવા એરેટર અથવા પંખ ચલાવવા.

❖ એગ્રોમેટ સલાહકાર સેવા બુલેટિન ડમિનિન સભ્યો :

- ડૉ. એચ. એમ. વિરકીયા, પ્રાદ્યાપક અને વડા (સશ્ય વિજ્ઞાન)
- ડૉ. એલ. વી. ઘેટીયા, સહ પ્રાદ્યાપક (વનસ્પતિ કીટકશાસ્ત્ર)
- ડૉ. કે. બી. રાખોલીયા, સહ પ્રાદ્યાપક (વનસ્પતિ શેગશાસ્ત્ર) :
- ડૉ. રી. લ. ઈટવાલા, સંશોધન વૈજ્ઞાનિક (શાકભાલ વિજ્ઞાન)
- ડૉ. વાય. એન. ટેટેલ, સહ પ્રાદ્યાપક (ફળ વિજ્ઞાન)
- ડૉ. વી. આર. પેટેલ, મદદનીશ પ્રાદ્યાપક (પશુપાલન)
- ડૉ. દિલેશ્વર નાયક, મદદનીશ પ્રાદ્યાપક (વનીકરણ)
- ડૉ. એમ. આર. પટેલ, મદદનીશ પ્રાદ્યાપક (ઝીશરીઝ સાયન્સ)

- ડૉ. વિભા ટાક, બીજર્ય એસોર્સીયેટ (લ.કે.એમ.એસ.)
- ડૉ. પી. કે. પરમાર, મદદનીશ પ્રાદ્યાપક (ઇંઝિન્યુરિયાલ હયામાનશાખા) અને પ્રિન્સિપાલ નોડલ ઓફિસર (લ.કે.એમ.એસ.)



Gramin Krishi Mausam Sewa



NAVSARI AGRICULTURAL UNIVERSITY

Agricultural Meteorological Cell
 Navsari Agricultural University
 Navsari - 396450, Gujarat
 E-mail :- aasnnavsari@gmail.com



(Jointly issued by Navsari Agricultural University & India Meteorological Department)

DATE OF ISSUE: 05/04/2024

Agromet Advisory Bulletin No: 02/2024 - 2025

-- Navsari District --

Weather summary of preceding week 02 April - to 05 April - 2024

Sr. No.	Name of Weather Parameters	Value
1.	Range of Rainfall (mm)	0.0
2.	Range of Maximum Temperature (°C)	36.5-37.5
3.	Range of Minimum Temperature (°C)	19.0-19.1
4.	Range of Relative Humidity (%)	23-98
5.	Range of Wind Speed (km/hr)	1.9-2.3
6.	Range of Cloud Cover (Okta)	0-1
7.	Range of bright sunshine hours (hrs)	8.0-9.4
8.	Last five days cumulative rainfall (mm)	0.0
Total Rainfall (mm)		0.0


IMD based Weather forecast for 06 April to 10 April - 2024

Sr. No.	Weathers Parameters	Day - 1 (06/04)	Day - 2 (07/04)	Day - 3 (08/04)	Day - 4 (09/04)	Day - 5 (10/04)
1.	Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
2.	Maximum temperature (°C)	39	39	39	40	41
3.	Minimum Temperature (°C)	23	22	21	21	22
4.	Max. Relative Humidity (%)	49	48	60	58	51
5.	Min. Relative Humidity (%)	25	25	21	23	26
6.	Wind Speed (km/hr.)	13	12	11	11	12
7.	Wind Direction (Compass point)	315	252	248	162	225
8.	Total Cloud Cover (Okta)	4	4	4	4	4

Weather Summary/ Alert	<ul style="list-style-type: none"> As per the forecast issued by India Meteorological Department over the next five days, the sky will be partly cloudy and there are chances of no rainfall. The Maximum temperature is 39 °C to 41 °C, when the Minimum temperature is 21 °C to 23 °C likely to be around. The humidity in the air is likely to be between 21 and 60 percent. The wind direction will be West with an average speed of 11 to 13 km/h. As per Extended range forecast, possibility of dry weather and maximum temperature likely to be below normal and minimum temperature likely to be normal up to 16th April, 2024.
-----------------------------------	--

-:: South Gujarat Heavy Rainfall Zone ::-

General Advisory <ul style="list-style-type: none"> Wind speed is high >15 kmph, so avoid spraying of pesticide. Farmers are advised to apply irrigation as per requirement of crops and apply recommended dose of fertilizers and monitor the crop and take plant protection measures against disease-pest incidence. Keep animals under shed/covered area during day hours due to sudden increase in maximum temperature. No weeding in vegetable field to protect crops from high temperature. Download the MEGHDOOT mobile application for Agromet Advisory Services and information on weather forecasting, which will provide weather based agricultural advice to farmers for their location, crops and livestock in their local language. Click on the following link to download the MEGHDOOT application: Android users: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot IOS users: https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155 Download the DAMINI Mobile application to ensure the safety through monitoring sky lightning activity. It will provide the alert and detail description of instruction, precaution, Do and Don't. Click on the following link to download the DAMINI application. Android users: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lighteninglive.damini IOS users: https://apps.apple.com/app/id1502385645



Crop	Weather based Agro-Advisory
Sugarcane	Vegetative Stage <ul style="list-style-type: none"> Apply split dose of Nitrogen fertilizer as per recommendation- 2nd dose 30% of 250 kg N/ha at 3-3.5 month after planting, 3rd dose 20% of 250 kg N/ha at 4-4.5 month after planting and 4th dose 35% of 250 kg N/ha at 5.5-6 month after planting (before final earthing up). As per soil/climatic condition and stage of crop irrigation apply- summer at 15-17 day interval or adopt drip method of irrigation and mulching of trash in between two rows of crop to save irrigation water. Keep crop weed free upto 4 months of planting by interculturing, hand weeding or apply post emergence weedicide like 2,4-D Na Salt (1.2 kg ai/ha)+ Paraquat (0.600 kg ai/ha) [2,4-D (Na Salt, 30 kg)+ Paraquat (50 g/10 lit.)] after 30-60 DAP. Earthing up should be done at 3-3.5 and 5.5-6 months after planting. Application of Carbofuron 3 CG @ 33 kg/ha in soil for control of sugarcane early shoot borer due to increase in temperature.
Summer Paddy	Tillering stage: <ul style="list-style-type: none"> Keep 2-3 cm standing water in transplanted field. Apply recommended 1st split dose of Nitrogen (40 kg/ha.) at 20-25 days after transplanting and 2nd split dose of Nitrogen (20 kg/ha.) at 40-45 (DATP). Before application of fertilizer drain water from filed and apply 1 day after. Keep the field weed free by hand weeding and interculturing with paddy weeder.
Summer Pulse crop	Sowing/Vegetative stage : <ul style="list-style-type: none"> Thinning and gap filling should be done to maintain plant population at 15-20 days after sowing. Keep field weedfree by hand weeding and intercultuing upto 45 days after sowing. Apply irrigation as per the need, consider climate and soil type

Summer Okra	<ul style="list-style-type: none"> Harvesting should be carried out as per the tenderness of marketable fruit during clear weather condition. Discard damaged and diseased fruit. Apply irrigation as per need. Weeding should be carried out. Spraying of <i>Hexaconozole</i> 5 EC @ 10 ml or <i>Carbendazim</i> 50 WP 5 g per 10 Lit of water for control of powdery mildew/leaf spot disease under clear weather condition. Red Spider Mite: Collection & destruction of damaged leaves/plants along with mites. Or As temperature is increasing rapidly favoring population build up of red spider mite in okra, for its management spray <i>Fenazaquin</i> 10 EC @ 15 ml or <i>Spiromesifen</i> 22.9 SC @ 8 ml per 10 lit of water during clear weather condition.
Rabi Brinjal	<ul style="list-style-type: none"> Harvesting should be carried out as per the tenderness of marketable fruit during clear weather condition. Discard damaged and diseased fruit. Apply irrigation as per need. Weeding should be carried out. 40 pheromone trap per hectare should be kept for management of fruit and shoot borer in brinjal. Little leaf of brinjal: Monitoring and uproot and burn from brinjal field. Red Spider Mite: Collection & destruction of damaged leaves/plants along with mites. Or As temperature is increasing rapidly favoring population build up of red spider mite in brinjal, for controlling spray <i>Propargite</i> 57 EC @ 20 ml/10 lit or <i>Fenazaquin</i> 10 EC @ 15 ml or <i>Etoxozole</i> 10 SC @ 8 ml or <i>Spiromesifen</i> 22.9 SC @ 8 ml per 10 lit of water during clear weather condition.
Cow Pea	<ul style="list-style-type: none"> Harvesting should be carried out as per the tenderness of marketable pod during clear weather condition. Discard damaged and diseased pod. Apply irrigation as per need. Weeding should be carried out.
Cluster bean	<ul style="list-style-type: none"> Harvesting should be carried out as per the tenderness of marketable pod during clear weather condition. Discard damaged and diseased pod. Apply irrigation as per need. Weeding should be carried out.
Pointed gourd	<ul style="list-style-type: none"> Picking can be carried out after fruit development and apply irrigation as per need.
Little gourd	<ul style="list-style-type: none"> Picking can be carried out after fruit development and apply irrigation as per need.
Mango	<p>General Advise :</p> <ul style="list-style-type: none"> Find grubs of stem borer from gallery and holes on the stem and kill them. Do pouring of <i>Chlorpyriphos</i> 20 EC @ 25 ml/ 10 lit in hole and plug it with mud in clear weather condition under clear weather condition.. Spray Novel 1% (1 Lit.) or NAA 20 ppm (2g) + Urea 2% (2 kg) in 100 lit. water to reduce fruit drop in mango. Apply Urea (800g) or Ammonium Sulphate (1.8 kg) with irrigation at pea to marble stage of mango fruits. Spray <i>Imidacloprid</i> 17.8 SL 3 ml or <i>Thiamethoxam</i> 25 WG @ 10 g or <i>Buprofezin</i> 25 SC @ 20 ml or <i>Deltamethrin</i> 2.8 EC @ 5 ml or <i>Lambda-Cyhalothrin</i> 5 EC @ 10 ml per 10 lit water on entire mango tree for control of mango hopper during clear weather condition in mango. Sudden increase in temperature with relative humidity to favoring population growth of thrips, for management Spraying of <i>Tolfenpyrad</i> 15 EC @ 20 ml/10 lit water for thrips mangement.

	<ul style="list-style-type: none"> Provide support to the young plants of mango to protect against rain and high wind speed. Spraying of Hexaconazole 5 EC @ 10 ml or or Carbendazim 50 WP @ 10 g per 10 lit for control of Anthracnose in clear weather condition. Apply mulch of paddy straw/mango leaves and give light irrigation to reduce fruit drop in mango.
Sapota	General Advise : <ul style="list-style-type: none"> Apply second split of 25% of RDF (Ammonium Sulphate -1.3 kg or Urea 0.6 kg, SSP 0.8 kg and MOP 0.3 kg + FYM 25 kg each tree) in clear weather condition.
Livestock	General Advise : <ul style="list-style-type: none"> Provide adequate quantity of balanced ration by considering the milk production and maintenance. Good quality dry roughage with 15-20 kg green fodder provided to the animals, only after chaffing. Feed silage & hay materials if available. Before and after milking udder must be properly clean with zinc oxide or boric powder or potassium permanganate solutions. For the control of tick and other parasites, spray <i>Deltemethrin</i> or <i>Aemitaz</i> 2 ml in 1 liter of water. Height of animal shed should keep minimum 10 feet for aeration to maintain the floor dry and to control humidity. Young calves should be offered with approximate 500 ml. of Colostrums within half an hour of calving. Thereafter for next 15 days, milk should be offered at the amount of 1/10th of body weight in a day. Keep drinking water facility for 24 hrs. of period or offered adlib water four times in a day. Keep animals under shed/covered area during day hours due to sudden increase in maximum temperature. In the summer season, to maintain the body temperature, it is advisable that to keep fan in the shade or can keep the animal under the shadow of the tree.
Forestry	<ul style="list-style-type: none"> Weeding and cleaning should be done during first and second year plantations. Collect the mature seed of teak (Sag) from selected/plus tree for raising of new teak seedling.
Fisheries	<ul style="list-style-type: none"> Fresh water farmers give proper feed in fish/prawn farming for better growth rate because environment condition is very suitable. Increase water depth and maintain water level through pond outlet. Mixing the top and bottom water by using the aerators or pumps.

❖ **Members of Agro-Advisory Committee :**

- Dr. H. M. Viradia, Professor & Head (Agronomy)
- Dr. L. V. Ghetiya, Associate Professor (Entomology)
- Dr. K. B. Rakholiya, Associate Professor (Plant Pathology):
- Dr. C. G Intwala, Research Scientist (Vegetable Science)
- Dr. Y. N. Tandel, Associate Professor (Fruit Science)
- Dr. V. R. Patel, Assistant Professor (Animal Husbandry)
- Dr. Dileswar Nayak, Assistant Professor (Forestry)
- Dr. M. R. Patel, Assistant Professor (Fisheries Science)
- Dr. Vibha Tak, Research Associate(GKMS)
- Dr. P. K. Parmar, Assistant Professor (Agricultural Meteorology and Principal Nodal Officer (GKMS))

છવામાન આગાહી

વિગત	તારીખ	દાંગ	નવચારી	વલસાડ
વરસાદ (મી.મી)	૦૬/૦૪/૨૦૨૪	૦	૦	૦
	૦૭/૦૪/૨૦૨૪	૦	૦	૦
	૦૮/૦૪/૨૦૨૪	૦	૦	૦
	૦૯/૦૪/૨૦૨૪	૦	૦	૦
	૧૦/૦૪/૨૦૨૪	૦	૦	૦
મહત્તમ તાપમાન (ઘે.સે)	૦૬/૦૪/૨૦૨૪	૩૯	૩૬	૩૬
	૦૭/૦૪/૨૦૨૪	૩૯	૩૬	૩૬
	૦૮/૦૪/૨૦૨૪	૩૯	૩૬	૩૬
	૦૯/૦૪/૨૦૨૪	૩૮	૪૦	૩૯
	૧૦/૦૪/૨૦૨૪	૩૯	૪૧	૩૯
લધુતમ તાપમાન (ઘે.સે)	૦૬/૦૪/૨૦૨૪	૨૦	૨૩	૨૦
	૦૭/૦૪/૨૦૨૪	૨૦	૨૨	૨૦
	૦૮/૦૪/૨૦૨૪	૧૬	૨૧	૧૬
	૦૯/૦૪/૨૦૨૪	૨૦	૨૧	૨૦
	૧૦/૦૪/૨૦૨૪	૨૧	૨૨	૨૦
મહત્તમ ભેજ (%)	૦૬/૦૪/૨૦૨૪	૩૩	૪૬	૪૮
	૦૭/૦૪/૨૦૨૪	૪૭	૪૮	૫૦
	૦૮/૦૪/૨૦૨૪	૩૬	૬૦	૫૬
	૦૯/૦૪/૨૦૨૪	૩૪	૫૮	૫૬
	૧૦/૦૪/૨૦૨૪	૩૫	૫૧	૪૮
લધુતમ ભેજ (%)	૦૬/૦૪/૨૦૨૪	૧૫	૨૫	૨૪
	૦૭/૦૪/૨૦૨૪	૧૪	૨૫	૨૩
	૦૮/૦૪/૨૦૨૪	૧૦	૨૧	૧૬
	૦૯/૦૪/૨૦૨૪	૧૧	૨૩	૨૪
	૧૦/૦૪/૨૦૨૪	૧૨	૨૬	૨૪
પવનની ગતિ(ક્ર.મી./કલાક)	૦૬/૦૪/૨૦૨૪	૧૨	૧૩	૧૨
	૦૭/૦૪/૨૦૨૪	૬	૧૨	૧૨
	૦૮/૦૪/૨૦૨૪	૮	૧૧	૮
	૦૯/૦૪/૨૦૨૪	૬	૧૧	૮
	૧૦/૦૪/૨૦૨૪	૬	૧૨	૧૦
પવનની દિશા (ક્રમાસ પોઈન્ટ)	૦૬/૦૪/૨૦૨૪	NW	NW	NW
	૦૭/૦૪/૨૦૨૪	NW	W	W
	૦૮/૦૪/૨૦૨૪	W	W	W
	૦૯/૦૪/૨૦૨૪	W	S	S
	૧૦/૦૪/૨૦૨૪	S	SW	SW
વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટા)	૦૬/૦૪/૨૦૨૪	૪	૪	૪
	૦૭/૦૪/૨૦૨૪	૪	૪	૪
	૦૮/૦૪/૨૦૨૪	૪	૪	૨
	૦૯/૦૪/૨૦૨૪	૫	૪	૨
	૧૦/૦૪/૨૦૨૪	૫	૪	૨