



નવસારી કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલય

ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા

કૃષિ હવામાનશાસ્ત્ર સેલ
કૃષિ ઈજનેરી વિભાગ, ન. મ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય
નવસારી કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલય
નવસારી - ૩૮૬૪૫૦, ગુજરાત
ઈ-મેઈલ:- aasnavsari@gmail.com



ભારત મૌસમ વિજ્ઞાન
વિભાગ

(નવસારી કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલય અને ભારત મૌસમ વિજ્ઞાન વિભાગ દ્વારા પ્રસારિત)

જારી કરવાની તારીખ: ૧૪/૧૦/૨૦૨૫

કૃષિ હવામાન બુલેટીન નં : ૫૭/૨૦૨૫ - ૨૦૨૬

-- નવસારી જિલ્લો --

પાછળનાં સમયનું હવામાન (તા. ૧૦ ઓક્ટોબર થી ૧૪ ઓક્ટોબર - ૨૦૨૫)

અનુ. નં.	હવામાન પરિબલો	Value
૧.	વરસાદની શ્રેણી (મી.મી.)	૦.૦
૨.	મહત્તમ તાપમાનની શ્રેણી (સે.ગ્રે.)	૩૩.૦-૩૪.૦
૩.	લઘુત્તમ તાપમાનની શ્રેણી (સે.ગ્રે.)	૧૯.૦-૨૨.૦
૪.	ભેજની શ્રેણી (%)	૩૪-૬૫
૫.	પવનની ગતિની શ્રેણી (કિ.મી./કલાક)	૧.૭-૨.૪
૬.	વાદળની સ્થિતિની શ્રેણી (ઓકટા)	૦-૦
૭.	સુર્યપ્રકાશિત સમયની શ્રેણી (કલાક)	૮.૦-૯.૦
૮.	પાછળના પાંચ દિવસમાં સંચિત વરસાદ (મી.મી.)	૦.૦
કુલ વરસાદ		૧૬૪૩.૦

આઈ. એમ. ડી. દ્વારા પ્રાપ્ત હવામાન આગાહી (તા. ૧૫ ઓક્ટોબર થી ૧૯ ઓક્ટોબર - ૨૦૨૫)

અનુ. નં.	હવામાન પરિબલો	દિવસ-૧ (૧૫/૧૦)	દિવસ-૨ (૧૬/૧૦)	દિવસ-૩ (૧૭/૧૦)	દિવસ-૪ (૧૮/૧૦)	દિવસ-૫ (૧૯/૧૦)
૧.	વરસાદ (મી.મી.)	૦	૦	૭	૮	૮
૨.	મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૩૩	૩૪	૩૪	૩૫	૩૫
૩.	લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૩	૨૪	૨૫	૨૪	૨૫
૪.	મહત્તમ ભેજ (%)	૬૦	૭૦	૭૦	૮૦	૮૫
૫.	લઘુત્તમ ભેજ (%)	૫૫	૫૫	૬૫	૬૦	૬૦
૬.	પવનની ગતિ (કિ.મી./કલાક)	૭	૭	૭	૭	૬
૭.	પવનની દિશા (કમ્પાસ પોઈન્ટ)	૬૬	૮૪	૬૮	૮૪	૭૪
૮.	વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	૦	૨	૪	૪	૫

વિસ્તૃત શ્રેણીની આગાહી મુજબ, ૧૯ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૫ થી ૨૫ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૫ સુધી સામાન્યથી ઉપર વરસાદ થવાની ધારણા છે. મહત્તમ અને લઘુત્તમ તાપમાન સામાન્ય રહેવાની ધારણા છે.

હવામાન સારાંશ / ચેતવણી	- આઈ. એમ. ડી., દ્વારા મળેલી હવામાનની આગાહી મુજબ આગામી પાંચ દિવસમાં આકાશમાં આંશિક ચોખ્ખું રહેશે અને છુટાછવાયા જગ્યાઓમાં હળવા વરસાદ આવવાની સંભાવના છે. - મહત્તમ તાપમાન ૩૩ સે. થી ૩૫ સે. જ્યારે લઘુત્તમ તાપમાન ૨૩ સે. થી ૨૫ સે. આસપાસ હોવાની સંભાવના છે. - હવામાં ભેજનું પ્રમાણ ૫૫ થી ૮૫ ટકા વચ્ચે રહેવાની સંભાવના છે. - પવનની દિશા પૂર્વ રહેશે જેની સરેરાશ ગતિ ૬ થી ૭ કિ.મી./કલાક રહેવાની શક્યતા છે.
---------------------------------------	---

-:: દક્ષિણ ગુજરાત ભારે વરસાદ વિસ્તાર ::-


સામાન્ય સલાહ	- ખેડુનોને ખેતરની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ હવામાનની સ્થિતિ મુજબ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. - ખેડુનોએ ખાતર આપવાની અને દવાનો છંટકાવ કરવાની કામગિરી હવામાનની સ્થિતિ મુજબ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. - વધુ ઝડપી પવન સામે રક્ષણ માટે ઊભા બાગાયતી અને શાકભાજી પાકોની જાળવણી માટે લાકડાના અથવા વાંસ વડે યાંત્રિક ટેકા આપવો. - કૃષિ હવામાન સલાહકારી બુલેટીન અને હવામાનની આગાહી અંગેની માહિતી મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો મેઘદૂત મોબાઈલ એપ્લિકેશન, જે ખેડુનોને તેમની સ્થાનિક ભાષામાં સ્થાન, પાક અને પશુધન વિશે હવામાનઆધારિત કૃષિ સલાહ પ્રદાન કરશે. મેઘદૂત એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો: એન્ડ્રોઈડ યુઝર્સ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot આઈ.ઓ.એસ. યુઝર્સ: https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155 - દામિની મોબાઈલ એપ્લિકેશનદ્વારા આકાશીય વિજળીની અગાઉથી ચેતવણી આપવામાં આવે છે તેમજ આકાશીય વિજળીથી બચવા શું કરવું અને શું નહિ કરવું તેની વિગતવાર માહિતી પૂરી પાડવામાં આવે છે. આથી ખેડુનમિત્રોને દામિની મોબાઈલ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. દામિની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લીંક પર ક્લિક કરો: એન્ડ્રોઈડ યુઝર્સ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightening.live.damini આઈ.ઓ.એસ. યુઝર્સ: https://apps.apple.com/app/id1502385645
પાક	હવામાન આધારિત કૃષિ સલાહ
શેરડી	- શેરડીની રોપણી માટે બીજ પ્લોટ બનાવેલ હોય તો બીજ માટે શેરડી કાપવાની હોય તેના એક માસ પહેલા ૫૦ કિગ્રા / હે. નાઈટ્રોજન ખાતર આપવું. નવી રોપણી માટે જમીન તૈયારી: - શેરડીની નવી રોપણી માટે યોગ્ય ભેજની પરિસ્થિતિમાં જમીન તૈયાર કરવી. - શેરડીની રોપણી ઓક્ટોબર-ફેબ્રુઆરી માસ દરમિયાન કરવી. - ખેડ વખતે છાણયુ ખાતર (૨૫ ટન/હે.) /કમ્પોસ્ટ (૧૫ ટન/હે.) જમીનમાં ભેળવવું. - રોપણી પહેલા પાયાનું ખાતર (નાઈટ્રોજનના ૧૫ % અને ફોસ્ફોરસ અને પોટાશ ૨૫૦-૧૨૫-૧૨૫ કિગ્રા/હે.) પુરુ આપવું. - રોપણી માટે કુમળૂ અને તંદુરસ્ત તમારી પસંદગીની જાતનું બિયારણ વાપરવું. રોપણી માટે બે લાઈન વચ્ચે ૮૦ થી ૧૨૦ સેમી. અંતર રાખી બે આંખના કટકાને બીજમાવજાત આપી (<i>કાર્બેન્ડા/ઝિમ</i> ૫૦ ડબલ્યુ પી ૧ ગ્રા./૧ લીટર પાણી) એક પછી એક કટકા ચાસમાં રહે તે રીતે રોપણી કરવી. એક આંખના રોપનું વાવેતર કરવાનું હોય તો લાઈનમાં બે રોપા વચ્ચે ૪૫ થી ૬૦ સેમી. અંતર રાખી રોપણી કરવી. - રોપણી બાદ પિયત આપી ૩ દિવસમાં <i>એટ્રાઝીન</i> ૫૦ ડબલ્યુ પી પ્રી ઈમરજન્સ ૮૦ ગ્રામ./૧૦ લી. પાણી નીંદણનાશક નો છંટકાવ હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે કરવો. - રોપણી સમયે શેરડીમાં <i>ટ્રાઈકોડર્મા વિરાઈડ</i>નો ઉપયોગ કરવો.
ચોમાસુ ડાંગર	દાણા ભરાવા : - કાપણીના ૧૦-૧૫ દિવસ પહેલા કચારીમાંથી પાણી નિતારી દેવું. - વરસાદ ની સંભાવના ન હોય ત્યારે કાપણી કરવી. - કાપણી કર્યા બાદ સૂર્ય તાપમાં સૂકવી દાણા છૂટા પાડવા અને દાણાનો ભેજ ઓછો થાય ત્યાં સુધી તપાવી સંગ્રહ કરવો. - કાપણી બાદ તુરંત જમીન ખેડીએ રબી પાક માટે તૈયાર કરવી.
શીયાળુ કઠોળ	જમીન તૈયારી/વાવણી : - શીયાળુ કઠોળના વાવેતર માટે ચોમાસુ પાક કાપ્યા બાદ યોગ્ય ભેજ સમયે જમીન તૈયાર કરવી. - શીયાળુ કઠોળના જેવા કે લાલ, પાપડી, ચણા, મગ (સીઓ-૪) ની વાવણી યોગ્ય સમયે કરવી - જરૂરી બિયારણની સુધારેલ જાત મેળવી લેવી. - પાયાનું ભલામણ મુજબ ખાતર આપવું (૨૪-૪૦-૦ ના-ફો-પો કિગ્રા/હે.). - પાક નીંદણ મુક્ત રાખવું. આ માટે જરૂરી જણાય તો વાવણી બાદ તુરંત ભલામણ મુજબની નિંદણનાશક પેંડીમેથિલીન ૧ કિગ્રા/હે. અંદ ૬૦ મિલી./૧૦ લી.) દવાનો જમીન ઉપર છંટકાવ કરવો. - જરૂરિયાત મુજબ પીયત આપવું. - બીજ માવજત થાયરમ ૩ ગ્રા./ કિગ્રા. + રાયઝોબીયમ ૧૦ મિ.લી./કિગ્રા. બીજ થી આપવું.
ચોમાસુ ભીંડા	કુમળા અને વેચાણલાયક કૃષ્ણોની વીણી હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે કરવી જોઈએ.

	- રોગ-જીવાતવાળા અને બગડેલા ફળો દૂર કરવા જોઈએ. - નિદાંમણના નાશ માટે યોગ્ય પગલાં લેવા. - ભીંડામાં ભૂકીછારા અને પાનના ટપકના નિયંત્રણ માટે હેક્સાકોનાઝોલ ૫ એસિ ૧૦ મિલી. અથવા કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ ડબલ્યુપી ૫ ગ્રા પ્રતિ ૧૦ લી. પાણીમાં મીશ્ર કરી હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે છંટકાવ કરવો. - ખેતરમાંથી પીળી નસના રોગીસ્ટ છોડ ને ઉપાડી નાશ કરો. - રોગનો ફેલાવો સફેદ માખીથી થાતો હોય, શોષક પ્રકારની જંતુ નાશક દવાનો છંટકાવ કરવો.
રીંગણ	ખેતરમાં વાવેતર માટે નર્સરીમાં બીજની વાવણી કરવી. (ધરું તૈયાર કરવા)
ટામેટા	ખેતરમાં વાવેતર માટે નર્સરીમાં બીજની વાવણી કરવી. (ધરું તૈયાર કરવા)
મરચી	ખેતરમાં વાવેતર માટે નર્સરીમાં બીજની વાવણી કરવી. (ધરું તૈયાર કરવા)
પરવળ	- ફળ તૈયાર થયા બાદ તેની વીણી કરવી. - નિદાંમણના નાશ માટે યોગ્ય પગલાં લેવા.
ટિંડોળા	- ફળ તૈયાર થયા બાદ તેની વીણી કરવી. - નિદાંમણના નાશ માટે યોગ્ય પગલાં લેવા.
સુરણ	નિદાંમણના નાશ માટે યોગ્ય પગલાં લેવા.
રતાળુ	- વેલાની પ્રશાખાઓને ટેકા પર ચઢાવવી. - નિદાંમણના નાશ માટે યોગ્ય પગલાં લેવા.
તાનિયા	નિદાંમણના નાશ માટે યોગ્ય પગલાં લેવા.
આંબા	- આંબાના મેઢની ઈયળો થડમાંથી શોધીને મારી નાખો અને કાણાંની અંદર ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦ ઈસી ૨૫ મી.લી./૧૦ લી. દ્રાવણ નાંખી કાઢવથી કાણાં બંધ કરી દેવા. - આંબાનાં નાના રોપાની જાળવણી માટે ટેકો આપવાની વ્યવસ્થા કરવી જેથી વરસાદ અને વધુ પવનની ઝડપ સામે ટકી શકે. - કપાયેલ ડાળી પર બોરિક્સ પેસ્ટ ૧૦ ટકા લગાડવું. - આંબાની નવી વાડી બનાવવા તંદુરસ્ત અને રોગમુક્ત ક્લમો અધિકૃત અને સરકારી નર્સરી માંથી મેળવવી જોઈએ. - નવી ક્લમો માટે તૈયાર કરેલ ખાડામાં ૧૦ કિગ્રા. છાણિયું ખાતર, ૧ કિગ્રા. સિંગલ સુપર સલ્ફેટ અને ૧ કિગ્રા. મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ ખાતર આપવું. ઉધઈ અને કીડીનો ઉપદ્રવ ક્લમોમાં જોવા મળે તો ૫૦ મિલી ક્લોરપાયરીફોસ ની માવજત ખાડા પૂરતી વખતે કરી દેવી. - આંબામાં મધિયાના નિયંત્રણ માટે લેમડા-સાયલેલોથ્રીન ૫ ઈસી ૧૦ મીલી પ્રતિ ૧૦ લિટર પાની સંપૂર્ણ ઝાડ ના થડ અને જાડી ડાળીઓ ઉપર છંટકાવ કરવો. - આંબાવાડીમાં પુખ્ત ઝાડ દિઠ ૧૦૦ કિગ્રા. છાણિયું ખાતર, ૮૦૦ ગ્રામ યુરિયા અથવા ૧.૮ કિગ્રા. અમોનિયમ સલ્ફેટ ૧.૦ કિગ્રા.સિંગલ સુપર સલ્ફેટ અને ૧.૩ કિગ્રા.મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ ખાતર ચોમાસામાં આપવું. - આંબામાં વહેલો મોર લાવવા માટે ૧ % પોટેશિયમ નાઈટ્રેટ (૧ કિગ્રા. / ૧૦૦ લી. પાણી) નો બે છંટકાવ ૧૫ દિવસના આંતર વાતાવરણ ઠંડુ થયે ત્યારે કરવો. - આંબાવાડીયામાં રાસાયણિક ખાતર આપ્યાના ૧૫ દિવસ પહેલા અથવા પછી બાયોફેટિલાઈઝર જેવા કે એઝોટોબેક્ટર, ૫૦ મિલી., ફોસ્ફેટ સોલ્યુબિલિઝિંગ બેક્ટેરિયા ૫૦ મિલી., પોટાશ મોબિલિઝિંગ બેક્ટેરિયા ૫૦ મિલી. અને ટ્રાયકોડર્મા ૧૦૦ ગ્રામ. પ્રતિ ઝાડ આપવું.
ચીકુ	- ચીકુનાં નાના રોપાની જાળવણી માટે ટેકો આપવાની વ્યવસ્થા કરવી જેથી વરસાદ અને વધુ પવનની ઝડપ સામે ટકી શકે. - ચીકુની નવી વાડી બનાવવા તંદુરસ્ત અને રોગમુક્ત ક્લમો અધિકૃત અને સરકારી નર્સરી માંથી મેળવવી જોઈએ. - નવી ક્લમો માટે તૈયાર કરેલ ખાડામાં ૧૦ કિગ્રા. છાણિયું ખાતર, ૧ કિગ્રા. સિંગલ સુપર સલ્ફેટ અને ૧ કિગ્રા. મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ ખાતર આપવું. - ઉધઈ અને કીડીનો ઉપદ્રવ ક્લમોમાં જોવા મળે તો ૫૦ મિલી ક્લોરપાયરીફોસ ની માવજત ખાડા પૂરતી વખતે કરી દેવી. - બીજા ખાતરનો હુખ્તો ભલામણ કરેલ ખાતરનો ૨૫ ટકા ભાગ પ્રમાણે રાસાયણિક ખાતર એમોનિયમ સલ્ફેટ ૧.૩ કિગ્રા અથવા યુરિયા ૦.૬ કિગ્રા, સિંગલ સુપર ફોસ્ફેટ ૦.૮ કિગ્રા, મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ ૦.૩ કિગ્રા, છાણિયું ખાતર ૨૫ કિગ્રા આ મહિનામાં હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે આપવું.
પશુપાલન	- પશુઓને ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળું ખનીજક્ષાર મિશ્રણ દૈનિક આપવું જોઈએ. જેની માત્રા પશુચિકિત્સક સલાહ મુજબ અથવા તેનું પેકિંગ પરના નિર્દેશાનુસાર આપવાનો રહે છે. - પશુઓને તેમની, આયુ, વિકાસ અને ઉત્પાદકતાના આધારે સમતોલ આહાર આપવો, જેમા ગુણવત્તુક દાણા, લીલોચારો અને સુકાચારાનો સમાવેશ કરવો. - ચાફ કટરથી લીલા તથા સૂકા ઘાસચારાને ટુકડા કરીને જ નીરણ કરવું. - દુધાણા પશુઓના આઉને દૂધ દોહન પહેલા અને પછી ઝીંક ઓક્સાઈડ અથવા બોરીક પાઉડર અથવા

	પોટેશીયમ પરમેગેનેટ ના દ્રાવણથી બરાબર સાફ કરવા. - પશુઓનાં ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથીન અથવા એમીટાઝર ૨ મી.લી./લિટર પાણીમાં નાખને છાંટવી (દવાની બોટલ ઉપર લખેલી સૂચનાનો અમલ કરવો). - કોઢ/ગમાણની ઉચાઈ ૧૦ ફૂટથી વધારે રાખવી, જેથી હવાની હેરફેર સરળતાથી થઈ શકે, બફારો/ગરમી ઓછી થાય અને ભોયાતળિયાનો ભાગ સુકો રહે.
વનીકરણ	- પ્રથમ બને બીજા વર્ષના વાવેતર દરમ્યાનમાં નિંદણ અને સફાઈ કરવી જોઈએ. - ધરુવાડિયામાં ઉછરેલા સાગના રોપાને સાગ સ્ટેમ્પની તૈયારી માટે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરી શકાય છે. - ખેતરમાંથી વરસાદનું વધારાના પાણીના નિકાલ કરવી.
ફીશરીઝ	સામાન્ય સલાહ : - મીઠા પાણીના મત્સય મીઠા પાણીના જંગા ઉત્પાદન કરતા ખેડૂતોને જાણવવાનું કે, આ સમયગાળા દરમ્યાન પૂરતી માત્રામાં ખોરાક આપવોકારણ કે આ વાતાવરણ માછલી/મીઠા પાણીના જંગા માટે અનુકૂળ છે. - તળાવમાં પાણીનું લેવલ જળવનુ અને વધુ વરસાદ આવે ત્યારે તળાવના આઉટલેટ થોડી માત્રામાં ખોલવા તેથી પાણીનું લેવલ જળવાયેલું રહે - તળાવના તળિયાનું અને સપાટીનું તાપમાન સરભર કરવા એરેટર અથવા પંખ ચલાવવા.

❖ એગ્રોમેટ સલાહકાર સેવા બુલેટીન કમિટીના સભ્યો :

- ડૉ. એચ. એમ. વિરડીયા, પ્રાધ્યાપક અને વડા (સશ્ય વિજ્ઞાન)
- ડૉ. જે. જે. પસ્તાગીયા, પ્રાધ્યાપક અને વડા (વનસ્પતિ કીટકશાસ્ત્ર)
- ડૉ. કે. બી. રાખોલીયા, સહ પ્રાધ્યાપક (વનસ્પતિ રોગશાસ્ત્ર)
- ડૉ. વાય. એન. ટેડેલ, પ્રાધ્યાપક (ફળ વિજ્ઞાન)
- ડૉ. એમ. બી. ટેડેલ, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક અને વડા (વનીકરણ)
- ડૉ. એમ. આર. પટેલ, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (ફીશરીઝ સાયન્સ)
- ડૉ. વિભા ટાક, રીસર્ચ એસોસીયેટ (જી.કે.એમ.એસ.)
- ડૉ. બી. એમ. મોટે, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (કૃષિ હવામાનશાસ્ત્ર) અને પ્રિન્સિપાલ નોડલ ઓફિસર (જી.કે.એમ.એસ.)





Gramin Krishi Mausam Sewa

Agricultural Meteorological Cell
Department of Agricultural Engineering
N. M. College of Agriculture
Navsari Agricultural University
Navsari – 396450, Gujarat
E-mail :- aasnavsari@gmail.com



(Jointly issued by Navsari Agricultural University & India Meteorological Department)

DATE OF ISSUE: 14/10/2025

Agromet Advisory Bulletin No: 57/2025 - 2026

-- Navsari District --

Weather summary of preceding week (10 October to 14 October - 2025)

Sr. No.	Name of Weather Parameters	Value
1.	Range of Rainfall (mm)	0.0
2.	Range of Maximum Temperature (°C)	33.0-34.0
3.	Range of Minimum Temperature (°C)	19.0-22.0
4.	Range of Relative Humidity (%)	34-95
5.	Range of Wind Speed (km/hrs)	1.7-2.4
6.	Range of Cloud Cover (Okta)	0-0
7.	Range of bright sunshine hours (hrs)	8.0-9.0
8.	Last five days cumulative rainfall (mm)	0.0
Total Rainfall (mm)		1643.0

IMD based Weather forecast for (15 October to 19 October - 2025)

Sr. No.	Weathers Parameters	Day - 1 (15/10)	Day - 2 (16/10)	Day - 3 (17/10)	Day - 4 (18/05)	Day - 5 (19/10)
1.	Rainfall (mm)	0	0	7	8	8
2.	Maximum temperature (°C)	33	34	34	35	35
3.	Minimum Temperature (°C)	23	24	25	24	25
4.	Max. Relative Humidity (%)	60	70	70	80	95
5.	Min. Relative Humidity (%)	55	55	65	60	60
6.	Wind Speed (km/hr.)	7	7	7	7	6
7.	Wind Direction (Compass point)	66	84	68	84	74
8.	Total Cloud Cover (Okta)	0	2	4	4	5

According to the extended range forecast, above normal rainfall is expected. Maximum and minimum temperatures are expected to be normal till 19th October, 2025 to 25th, 2025.

Weather Summary/ Alert

- As per the forecast issued by India Meteorological Department over the next five days, the sky will be partly clear and there are chances of light rainfall at isolated places.
- The Maximum temperature is 33 °C to 35 °C, when the Minimum temperature is 23 °C to 25 °C likely to be around.
- The humidity in the air is likely to be between 55 and 95 percent.
- The wind direction will be East with an average speed of 6 to 7 km/h.

-:: South Gujarat Heavy Rainfall Zone ::-


General Advisory	• Provide mechanical support to horticultural and vegetable crops during forecast of high wind velocity. • Farmers are advised to carry out different activities of farm as per the weather condition. • Farmers are advised to do the chemical spray and fertilizer application activity as per the weather condition. • Download the MEGHDOOT mobile application for Agromet Advisory Services and information on weather forecasting, which will provide weather based agricultural advice to farmers for their location, crops and livestock in their local language. Click on the following link to download the MEGHDOOT application: Android users: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot IOS users: https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155 • Download the DAMINI Mobile application to ensure the safety through monitoring sky lightning activity. It will provide the alert and detail description of instruction, precaution, Do and Don't. Click on the following link to download the DAMINI application. Android users: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lighteninglive.damini IOS users: https://apps.apple.com/app/id1502385645
Crop	Weather based Agro-Advisory
Sugarcane	• In seed plot add Nitrogen (50 kg/ha.) Before one month of seed cutting. Land preparation for new planting: • New plantation of sugarcane crop should be done after proper preparation of land at proper moisture condition. Deep plough and level the soil. • Planting should be done from October to February. • Apply FYM (25 t/ha)/ Compost (15 t/ha) at the time of ploughing. Select healthy, diseases-insect free and immature seed materials of your selected variety. • Planting should be done at the spacing of 90 to 120 cm. 2 budded setts should be used with end to end method of planting after setts treatment with fungicide (<i>Carbendazim 50 wp</i> @ 1g/1 lit. water). If settling use intra row spacing should be 45 to 60 cm. • Before planting basal dose of fertilizer apply 15 % of Nitrogen and full dose of P & K. (250-125-123 kg N-P-K kg/ha.). • Within 3 days after planting and irrigation, spraying of <i>Atrazine 50 WP</i> 80 g/10 li. water. Pre-emergence weedicide should be applied to control weeds in clear weather conditions. • Application of <i>Trichoderma viride</i> in rich sugarcane pressed at time of planting.
Kharif Paddy	Maturity Stage/Grain filling: • Drain the water from the kyari 10-15 days prior to the harvesting. • Harvest the crop when there is no possibility of rainfall and sky is clear. • After harvesting properly dry the crop and threshed the grains, also dry the grains to remove moisture before storage. • After harvesting land should be plough immediately for <i>Rabi</i> crops.
Rabi Pulse crop	Land preparation/Sowing: • After harvesting of kharif crop land should be prepared at proper moisture condition. • Rabi pulses like Indian bean, Gram, Green gram (CO-4) should be sown earliest. • Procure seed of improved varieties. • Basal recommended fertilizer applied (20-40-0 N-P-K Kg/Ha.) • Weeding should be done as per need or apply recommended pre emergence weedicide. (Pendimethilin 1 kg/ha; 60 ml./10 lit.). • Apply irrigation as per soil and climatic condition. • Seed treatment with Thiram 3g/kg seed. Rhizobium seed treatment 10 ml/kg seed.
Kharif Okra	• Harvesting should be carried out as per the tenderness of marketable fruit during clear weather condition.

	• Discard damaged and diseased fruit. • Weeding should be carried out. • Spraying of Hexaconazole 5 EC @ 10 ml or Carbendazim 50 WP 5 g per 10 Lit of water for control of powdery mildew/leaf spot disease under clear weather condition. • Up root and burn yellow vein mosaic infected okra plant from field. • Spraying systemic insecticides for whitefly (vector) management.
Brinjal	• Sowing of seeds in the nursery for the field planting .
Tomato	• Sowing of seeds in the nursery for the field planting .
Chilli	• Sowing of seeds in the nursery for the field planting .
Pointed gourd	• Harvesting should be carried out as per the tenderness of marketable fruit. • Interculturing & weeding should be carried out.
Little gourd	• Harvesting should be carried out as per the tenderness of marketable fruit. • Interculturing & weeding should be carried out.
Elephant foot yam	• Take measures for weed control.
Greater yam	• Take measures for weed control. • Give proper support or train branches of vines.
Tannia	• Take measures for weed control.
Mango	• Find grubs of stem borer from gallery and holes on the stem and kill them. Do pouring of Chlorpyrifos 20 EC @ 25 ml/ 10 lit in hole and plug it with mud in clear weather condition under clear weather condition.. • Provide support to the young plants of mango to protect against rain and high wind speed. • Application of 10 % Bordeaux paste in cut/pruning branches of fruit tree. • Procure healthy and disease free planting material from authorized and government nursery for the new plantation. • Prepare pit for plantation of new grafts by filling 10 kg FYM, 1 kg SSP and 1 kg MOP. Give 50 ml/tree Chlorpyrifos to manage termite and ants. • Spraying of <i>Lambda-Cyhalothrin</i> 5 EC @ 10 ml. per 10 Lit. water on tree trunk and branches for management mango hopper. • Apply recommended dose of fertilizer per tree @ 800 g Urea or 1.8 kg Ammonium Sulphate, 1.0 kg SSP and 1.3 kg MOP along with 100 kg FYM to adult tree. • Two spray 1 % Potassium Nitrate (1 kg/ 100 li. water) at 15 days interval in cool hours (evening) to get early flowering. • In addition RDF, give biofertilizers viz., Azotobactor 50 ml, PSB 50 ml, KMB 50 ml and Trichoderma 100 g per adult tree in monsoon. Before or after 15 days of fertilizer application.
Sapota	• Provide support to the young plants of Sapota to protect against rain and high wind speed. • Procure healthy and disease free planting material from authorized and government nursery for the new plantation. • Prepare pit for plantation of new grafts by filling 10 kg FYM, 1 kg SSP and 1 kg MOP. • Give 50 ml/tree Chlorpyrifos to manage termite and ants. • Apply second split of 25% of RDF (Ammonium Sulphate -1.3 kg or Urea 0.6 kg, SSP 0.8 kg and MOP 0.3 kg + FYM 25 kg each tree) in clear weather condition.
Livestock	• Provide adequate quantity of balanced ration by considering the milk production and maintenance. • Good quality dry roughage with 15-20 kg green fodder provided to the animals, only after chaffing. • Feed silage & hay materials if available. • Before and after milking udder must be properly clean with zinc oxide or boric powder or potassium permanganate solutions. • For the control of tick and other parasites, spray <i>Deltemethrin</i> or <i>Aemitaz</i> 2 ml in 1 liter of water. • Height of animal shed should keep minimum 10 feet for aeration to maintain the floor dry and to control humidity.
Forestry	• Weeding and cleaning should be done during first and second year plantations.

	The nursery raised teak seedling may be transplanted for teak stamp preparation for further filed planting.
Fisheries	- Fresh water farmers give proper feed in fish/prawn farming for better growth rate because environment condition is very suitable. - Increase water depth and maintain water level through pond outlet. - Mixing the top and bottom water by using the aerators or pumps.

❖ **Members of Agro-Advisory Committee :**

- Dr. H. M. Viradia, Professor & Head (Agronomy)
- Dr. J. J. Pastagia, Professor & Head (Entomology)
- Dr. K. B. Rakholiya, Associate Professor (Plant Pathology)
- Dr. Y. N. Tandel, Professor (Fruit Science)
- Dr. M. B. Tandel, Assistant Professor (Forestry) & I/C Head (SAF) (Forestry)
- Dr. M. R. Patel, Assistant Professor (Fisheries Science)
- Dr. Vibha Tak, Research Associate(GKMS)
- Dr. B. M. Mote, Assistant Professor (Agricultural Meteorology and Principal Nodal Officer (GKMS)



NAVSARI AGRICULTURAL UNIVERSITY

AMFU_Navsari

હવામાન આગાહી

વિગત	તારીખ	ડાંગ	નવસારી	વલસાડ
વરસાદની શ્રેણી (મી.મી.)	૧૫/૧૦/૨૦૨૫	૦	૦	૦
	૧૬/૧૦/૨૦૨૫	૦	૦	૦
	૧૭/૧૦/૨૦૨૫	૯	૭	૮
	૧૮/૧૦/૨૦૨૫	૭	૮	૯
	૧૯/૧૦/૨૦૨૫	૮	૮	૧૦
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૧૫/૧૦/૨૦૨૫	૩૩	૩૩	૩૩
	૧૬/૧૦/૨૦૨૫	૩૪	૩૪	૩૪
	૧૭/૧૦/૨૦૨૫	૩૩	૩૪	૩૪
	૧૮/૧૦/૨૦૨૫	૩૨	૩૫	૩૫
	૧૯/૧૦/૨૦૨૫	૩૩	૩૫	૩૫
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૧૫/૧૦/૨૦૨૫	૧૭	૨૩	૨૩
	૧૬/૧૦/૨૦૨૫	૧૮	૨૪	૨૪
	૧૭/૧૦/૨૦૨૫	૧૯	૨૫	૨૫
	૧૮/૧૦/૨૦૨૫	૨૦	૨૪	૨૪
	૧૯/૧૦/૨૦૨૫	૧૯	૨૫	૨૫
મહત્તમ ભેજ (%)	૧૫/૧૦/૨૦૨૫	૧૦૦	૬૦	૬૦
	૧૬/૧૦/૨૦૨૫	૧૦૦	૭૦	૭૦
	૧૭/૧૦/૨૦૨૫	૧૦૦	૭૦	૭૦
	૧૮/૧૦/૨૦૨૫	૧૦૦	૮૦	૮૦
	૧૯/૧૦/૨૦૨૫	૧૦૦	૯૫	૯૫
લઘુત્તમ ભેજ (%)	૧૫/૧૦/૨૦૨૫	૫૦	૫૫	૫૫
	૧૬/૧૦/૨૦૨૫	૫૫	૫૫	૫૫
	૧૭/૧૦/૨૦૨૫	૭૦	૬૫	૬૫
	૧૮/૧૦/૨૦૨૫	૮૦	૬૦	૬૦
	૧૯/૧૦/૨૦૨૫	૭૦	૬૦	૬૦
પવનની ગતિ(કિ.મી./કલાક)	૧૫/૧૦/૨૦૨૫	૭	૭	૭
	૧૬/૧૦/૨૦૨૫	૬	૭	૭
	૧૭/૧૦/૨૦૨૫	૭	૭	૭
	૧૮/૧૦/૨૦૨૫	૬	૭	૭
	૧૯/૧૦/૨૦૨૫	૬	૬	૭
પવનની દિશા (કમ્પાસ પોઈન્ટ)	૧૫/૧૦/૨૦૨૫	SE	NE	E
	૧૬/૧૦/૨૦૨૫	E	E	E
	૧૭/૧૦/૨૦૨૫	E	E	E
	૧૮/૧૦/૨૦૨૫	E	E	E
	૧૯/૧૦/૨૦૨૫	E	E	E
વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટા)	૧૫/૧૦/૨૦૨૫	૧	૦	૦
	૧૬/૧૦/૨૦૨૫	૨	૨	૨
	૧૭/૧૦/૨૦૨૫	૪	૪	૪
	૧૮/૧૦/૨૦૨૫	૪	૪	૪
	૧૯/૧૦/૨૦૨૫	૫	૫	૪