



નવસારી ફુલ વિશ્વવિદ્યાલય

ગ્રામીણ ફુલ મૌસમ સેવા

ફુલ હવામાનશાસ્ત્ર એલ

નવસારી ફુલ વિશ્વવિદ્યાલય

નવસારી - ૩૬૭૪૫૦, ગુજરાત

ઈ-મેઈલ:- aasnavsari@gmail.com

ભારત મૌસમ વિજ્ઞાન
વિભાગ

(નવસારી ફુલ વિશ્વવિદ્યાલય અને ભારત મૌસમ વિજ્ઞાન વિભાગ દ્વારા પ્રસારિત)

તા. ૧૪/૦૫/૨૦૨૪

ફુલ હવામાન બુલેટીન નં : ૧૩/૨૦૨૪ - ૨૦૨૫

-- નવસારી જિલ્લો --

પાછળનાં સમયનું હવામાન (તા. ૦૯ મે થી ૧૪ મે - ૨૦૨૪)

અનું. નં.	હવામાન પરિબળો	Value
૧.	વરસાદની શ્રેણી (મી.મી.)	૦.૦
૨.	મહત્તમ તાપમાનની શ્રેણી (સે.ગ્રે.)	૩૩.૬-૩૬.૫
૩.	લધુત્તમ તાપમાનની શ્રેણી (સે.ગ્રે.)	૧૮.૫-૨૬.૫
૪.	બેજની શ્રેણી (%)	૪૫-૬૧
૫.	પવનની ગતિની શ્રેણી (કિ.મી./કલાક)	૩.૦-૬.૭
૬.	વાદળની સ્થિતિની શ્રેણી (ઓક્ટા)	૦-૭
૭.	સુર્યપ્રકાશિત સમયની શ્રેણી (કલાક)	૫.૧-૮.૪
૮.	પાછળના પાંચ દિવસમાં સંચિત વરસાદ (મી.મી.)	૦.૦
કુલ વરસાદ		૦.૦

આઈ. એમ. ડી. દ્વારા પ્રાપ્ત હવામાન આગામી (તા. ૧૫ મે થી ૧૯ મે - ૨૦૨૪)


અનું. નં.	હવામાન પરિબળો	દિવસ-૧ (૧૫/૦૫)	દિવસ-૨ (૧૬/૦૫)	દિવસ-૩ (૧૭/૦૫)	દિવસ-૪ (૧૮/૦૫)	દિવસ-૫ (૧૯/૦૫)
૧.	વરસાદ (મી.મી.)	૪	૨	૧	૧	૦
૨.	મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૪૦	૪૧	૪૦	૪૦	૪૧
૩.	લધુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૪	૨૪	૨૪	૨૪	૨૫
૪.	મહત્તમ બેજ (%)	૫૪	૫૮	૬૦	૬૮	૬૬
૫.	લધુત્તમ બેજ (%)	૩૨	૨૬	૩૧	૩૨	૩૮
૬.	પવનની ગતિ (કિ.મી./કલાક)	૧૩	૧૩	૧૫	૧૬	૧૫
૭.	પવનની દિશા (ક્રમપાસ પોઇન્ટ)	૨૨૫	૨૮૫	૨૩૬	૨૧૬	૨૨૫
૮.	વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટા)	૬	૫	૫	૩	૧

હવામાન સારાંશ
/ ચેતવણી

- આઈ. એમ. ડી. , દ્વારા મળેલી હવામાનની આગાહી મુજબ આગામી પાંચ દિવસમાં આકાશ વાદળાંથું રહેશે અને તારીખ ૧૫ થી ૧૮ મે , ૨૦૨૪ ની રોજ છૂટછવાયા જગ્યાઓમાં અતિ હળવા થી હળવા વરસાદ પડવાની સંભાવના છે.
- મહત્તમ તાપમાન ૪૦ સે. થી ૪૧ સે. જયારે લધુત્તમ તાપમાન ૨૪ સે. થી ૨ પ. સે. આસપાસ હોવાની સંભાવના છે.
- હવામાં બેજનું પ્રમાણ ૨૮ થી ૬૮ ટકા વચ્ચે રહેવાની સંભાવના છે.
- પવનની દિશા દક્ષિણ-પરિયમ રહેશે જેની સરેરાશ ગતિ ૧૩ થી ૧૬ કિ.મી./કલાક રહેવાની શક્યતા છે.
- વિસ્તૃત રેન્જની આગાહી મુજબ, ૨૫ મે ૨૦૨૪ સુધી સામાન્ય થી નીચે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે અને મહત્તમ અને લધુત્તમ તાપમાન સામાન્ય રહેવાની શક્યતા છે.

-:: દક્ષિણ ગુજરાત બારે વર્ષસાદ વિસ્તાર ::-

સામાન્ય સલાહ	<ul style="list-style-type: none"> • જો પવનની ગતિ ૧૫ કિમી પ્રતિ કલાક કરતાં વધુ હોય તો ખેતરમાં કેમિકલ જેવાંકે પેસ્ટિસાઈડ નો છંટકાવ ન કરવો. • ઉભા પાકોમાં ભલામણ મુજબના ખાતરો તથા જરૂરિયાત મુજબ પિયત આપવું અને આકાશ ચોખખું હોય તથા પવનની ગતિ ઓછી રહે ત્યારે જંતુનાશક તથા ફૂગનાશક દવાની જોડે ડીટરજન્ટ પાઉડર અથવા સ્ટીકર (ગુંડરીયુ) નો ઉપયોગ કરીને છંટકાવ કરવો. • ઉનાળું પાકોની કાપણી કર્યા પછી જમીનમાં ઊડી ખેડ કરી જમીનને સૂર્યના તાપમાં તપવા દેવી જેથી જમીનમાં રહેલ કોશેટા, રોગ અને જીવાતનો નાશ કરી શકાય. • આગામી ચોમાસામાં પાક વાવેતર માટે ખેત આયોજન કરી તેના અનુરૂપ સુધારેલ/હાઈબ્રિડ જતોનું બિયારણ, ખાતર અને દવાનો પુરવઠો સમયસર મેળવી લેવો અને મેળવેલ અથવા પોતાના બીજનો ઉગાવો થોડું સેમ્પલ લઈને ચકાસી લેવો. • જમીનમાં ભેજનું પ્રમાણ જાળવવા અને નિંદણ નિયંત્રણ માટે પાકના અવશેષો , ભૂસું, પરાળ અથવા પ્લાસ્ટિક મલ્ય (આવરણ) નો ઉપયોગ કરવો. • મહત્તમ તાપમાનમાં અચાનક વધારો થવાને કારણે દિવસ દરમિયાન પ્રાણીઓને શેડ/આચ્છાદિત વિસ્તારની નીચે રાખો. • પાકને મહત્તમ તાપમાનની બચાવવા માટે શાકભાજના ખેતરમાં નીંદણ ન કરવું. • કૃષિ હવામાન સલાહકારી બુલેટીન અને હવામાનની આગાહી અંગેની માહિતી મેળવવાં માટે ડાઉનલોડ કરો મેધદૂત મોબાઇલ એપ્લિકેશન, જે ખેડુતોને તેમની સ્થાનિક ભાષામાં સ્થાન, પાક અને પશુધન વિશે હવામાનાધારિત કૃષિ સલાહ પ્રદાન કરશે. મેધદૂત એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો: <p>અન્ડ્રોઇડ યુઝર્સ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot</p> <p>આઈ.ઓ.એસ. યુઝર્સ: https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155</p> <p>• દામિની મોબાઇલ એપ્લિકેશનદ્વારા આકાશીય વિજળીની અગાઉથી ચેતવણી આપવામાં આવે છે તેમજ આકાશીય વિજળીથી બચવા શું કરવું અને શું નહિ કરવું તેની વિગતવાર માહિતી પૂરી પાડવામાં આવે છે. આથી ખેડુતમિત્રોને દામિની મોબાઇલ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. દામિની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો: અન્ડ્રોઇડ યુઝર્સ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightninglive.damini</p> <p>આઈ.ઓ.એસ. યુઝર્સ: https://apps.apple.com/app/id1502385645</p>
---------------------	---



પાક	હવામાન આધારિત કૃષિ સલાહ
શેરડી	<p>વાનસ્પતિક વિકાસ અવસ્થા પૂરતી ખાતરની ભલામણ મુજબ નાઈટ્રોજન ખાતર આપવું.-</p> <ul style="list-style-type: none"> • બીજો ડોઝ - ૨૫૦ કિગ્રા. નાઈટ્રોજન/છે. ના ૩૦% મુજબ વાવણીના ૩ થી ૩.૫ માસ બાટ , ત્રીજો ડોઝ - ૨૫૦ કિગ્રા. નાઈટ્રોજન/છે. ના ૨૦% મુજબ વાવણીના ૪ થી ૪.૫ માસ બાટ , ચોથો ડોઝ - ૨૫૦ કિગ્રા. નાઈટ્રોજન/છે. ના ૧૫% મુજબ વાવણીના ૫.૫ થી ૬ માસ બાટ (ભારે પાળા ચડાવા પહેલા). • જમીન/વાતાવરણ અને પાકની અવસ્થા મુજબ જરૂરી પિયત આપવું. ઉનાળામાં - ૧૫-૧૭ દિવસના ગાળે પિયત આપવું અથવા ટપક પિયત અપનાવી અને બે હર વર્ષે સૂકી પતારીનું આવરણ (મલચિંગ) કરી પિયત પાણીની બચત કરવી. • પાકને વાવણીના ચાર માસ સુધી નીંદણ મુક્ત રાખવું , આ માટે સમયાંતરે આંતરખેડ અને હાથથી નીંદણ કરવું અથવા નીંદણનાશક દવા ૨,૪-D - Na સોલ્ટ (૧.૨ કિગ્રા. સંક્ષિપ્તત્વ/છે.) + પેરાક્રોટ (૦.૬૦૦ કિગ્રા. સંક્ષિપ્તત્વ/છે.) [૨,૪-D - Na સોલ્ટ ૩૦ ગ્રા. + પેરાક્રોટ (૫૦ ગ્રા. પ્રતિ ૧૦ લિટર)] ૩૦-૬૦ દિવસ વર્ષે છંટકાવ કરવો. • વાવણીના ૩-૩.૫ માસે અને ૫.૫-૬ માસે પાળા ચડાવવા. • હવામાનમાં તાપમાન વધવાથી ઉપદ્રવમાં વધારો થાય છે , તેથી શેરડી દુંખના વધેકો માટે કાર્બોક્લયુનાન ૩

	સીજુ તરીકે ગ્રાહે જમીનમાં આપવું
ચોમાસુ ડાંગર	<ul style="list-style-type: none"> ચોમાસુ ડાંગરના ધરુ માટે જરૂરી જમીન બેડ કરી, સમતળ કરી તૈયાર કરવી. સારુ કોહવાયેલ છાળણુ/ગાણતયુ ખાતર બેડ સમયે જમીનમાં બેળવવું. નેટલા વિસ્તારમાં ફેરરોપાણી કરવાની હોય તેના ૧/૧૦ ભાગના વિસ્તારમાં ધરુવાડીયું બનાવવું. નવી જતનું પ્રમાણિત બીજ યુનિવર્સિટી ફાફ પરથી મેળવી લેવું. ૧ હેક્ટર વિસ્તારમાં ફેરરોપાણી માટે ૨૫-૩૦ કિલો બીજની જરૂરત હોય છે.
ઉનાળુ ડાંગર	<p>પાકવા અવસ્થા:</p> <ul style="list-style-type: none"> દાળા કઠળું થતા, ક્યારીમાંથી પાણી નિતારી દેવું. પાક તૈયાર થતા સમયસર કાપણી કરવી. ચોમાસુ પાક માટે જમીન તૈયાર કરવી.
ઉનાળુ કઠોળ	<p>પાકવા અવસ્થા:</p> <ul style="list-style-type: none"> પાક તૈયાર થતા સમયસર કાપણી કરવી, ચોમાસુ પાક માટે જમીન તૈયાર કરવી.
ઉનાળુ ભીડા	<ul style="list-style-type: none"> કુમળા અને વેચાળાયક ફળોની વીળી હવામાન ચોખખુ હોય ત્યારે કરવી જોઈએ. રોગ-જીવાતવાળા અને બગડેલા ફળો દૂર કરવા જોઈએ. જરૂરિયાત મુજબ પિયત આપવું. નિદાંમણના નાશ માટે યોગ્ય પગલાં લેવા. ભીડામાં ભૂકીછારા અને પાનના ટપકના નિયંત્રણ માટે હેક્સાકોનાઓલ પ એસ્સિ ૧૦ મિલી. અથવા કાર્બોનાર્જીમ ૫૦ ડબલ્યુપી પ ગ્રા પ્રતિ ૧૦ લી. પાણીમાં મીશ્ર કરી હવામાન ચોખખુ હોય ત્યારે છંટકાવ કરવો. પાન કથીરીઃ નુકશાનવાળા પાનનો/છોડ કથીરી સહીન બેગા કરી તેનો નાશ કરવો. અથવા તાપમાનમાં વધારો થવાથી ભીડામાં પાન કથીરિના નિયંત્રણ માટે ફેનાઝાકવીન ૧૦ ઈસી ૧૫ મિલી. અથવા સ્પાયરોમેસીફીન ૨૨.૮ એસ.સી ૮ મિલી પ્રતિ ૧૦ લી પાણીમાં બેળવી ને પાક ઉપર હવામાન ચોખખુ હોય ત્યારે છંટકાવ કરવો.
રીગણુ	<ul style="list-style-type: none"> કુમળા અને વેચાળાયક ફળોની વીળી હવામાન ચોખખુ હોય ત્યારે કરવી જોઈએ. રોગ-જીવાતવાળા અને બગડેલા ફળો દૂર કરવા જોઈએ. જરૂરિયાત મુજબ પિયત આપવું. નિદાંમણના નાશ માટે યોગ્ય પગલાં લેવા. રીગણુની ફળ અને દુખ ની ઈયળના ૪૦ ફેરોમોન, ટ્રેપ પ્રતિ હેક્ટરદીઠ મુકવા. લઘુપણી રોગ: રોગીસ્ટ છોડ ને ઉપાડી નાશ કરવો. પાન કથીરીઃ નુકશાનવાળા પાનનો/છોડ કથીરી સહીન બેગા કરી તેનો નાશ કરવો. અથવા તાપમાનમાં વધારો થવાથી રીગણુની પાન કથીરિના નિયંત્રણ માટે પ્રોપર્ગાર્ડિટ ૫.૭ ઈસી ૨૦ મિલી. અથવા ફેનાઝાકવીન ૧૦ ઈસી ૧૫ મિલી. અથવા ઈટોક્ષા સોઝોલ ૧૦ એસ. સી ૮ મિલી અથવા સ્પાયરોમેસીફીન ૨૨.૮ એસ.સી ૮ મિલી પ્રતિ ૧૦ લી પાણીમાં બેળવી ને પાક ઉપર હવામાન ચોખખુ હોય ત્યારે છંટકાવ કરવો.
ચોળી	<ul style="list-style-type: none"> કુમળા અને વેચાળાયક ફળોની વીળી કરવી . જરૂરિયાત મુજબ આંતરખેડ અને નિદામણ કરવી. જરૂરિયાત મુજબ પિયત આપવું.
ગુવાર	<ul style="list-style-type: none"> કુમળા અને વેચાળાયક ફળોની વીળી કરવી . જરૂરિયાત મુજબ આંતરખેડ અને નિદામણ કરવી. જરૂરિયાત મુજબ પિયત આપવું.
પરવળ	<ul style="list-style-type: none"> ફળ તૈયાર થયા બાદ તેની વીળી કરવી. જરૂરિયાત મુજબ પિયત આપવું.
ટિડોળા	<ul style="list-style-type: none"> ફળ તૈયાર થયા બાદ તેની વીળી કરવી. જરૂરિયાત મુજબ પિયત આપવું.
ઉષુકટીબંધિય કંદમૂળ પાકો	<ul style="list-style-type: none"> જમીન તૈયાર કરી, કોહવાયેલું ધાળણું ખાતર /કમ્પોસ્ટ ૨૦-૨૫ ટન/એ. પ્રમાણે જમીનમાં બેળવવું. દક્ષિણ ગુજરાતના ભારે વરસાદીય વિસ્તારમાં સેન્ટ્રીય બેનીથી સૂરણની ગનેન્દ્ર જત ઊગાડવા માંગતા ખેડૂતોએ સૂરણની વાવણી પહેલા ચોળીનો લીલો પદ્વાશ ૨૦ કિલો/હેક્ટર બિયારણ લઈ કરવો તથા ૪૫ થી ૬૦ ટિવસોમાં વાવણી પહેલા તેને જમીનમાં દાબાવવો.
આંબા	સામાન્ય સલાહ :

	<ul style="list-style-type: none"> આંબાના મેઠની ઈયળો થડમાંથી શોધીને મારી નાખો અને કાણાંની અંદર કલોરપાયરીક્ષોસ ૨૦ ઈસી રૂપ મી.લી./૧૦ લી. દ્રાવણ નાંખી કાદવથી કાણાં બંધ કરી દેવા. આંબાનાં નાના રોપાની જગ્ઘવણી માટે ટેકો આપવાની વ્યવસ્થા કરવી જેથી વરસાદ અને વધુ પવનની ઝડપ સામે ટકી શકે. કેરી નું ખરણ ઘટાડવા માટે આંબાવડીમાં નોવેલ ૧% (૧ લિટર) અથવા એન.એ.એ. (૨ ગ્રામ)+ યુરિયા (૨ કિ.ગ્રા.) પ્રતિ ૧૦૦ લિટર પાણીમાં ઓગળીને ઇંટકાવ કરવો. કેરી વટાણા થી લખોટા કંની થાય ત્યારે યુરિયા (૮૦૦ ગ્રા.) અથવા અમોનિયમ સલફેટ (૧.૮ કિ.ગ્રા.) ખાતર પિયત સાથે આપવું. કાલવર્ણ ના નિયંત્રણ માટે લેક્ઝાકોનોઝોવ્પ ઈસી ૧૦ મિલી અથવા કાર્બન્ડાજીમ ૫૦ ડબલ્યુપી પ ગ્રા પ્રતિ ૧૦ લી. પાણીમાં મિક્સ કરી હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે ઇંટકાવ કરવો. કેરીનું ખરણ ઘટાડવા આંબાવડીમાં ડાંગરની પરાડ અથવા આંબમાં પાઇડાનું આવરણ કરવું અને હળવું પિયત આપવું. આંબાની વડીમાં ફુળમાખીના નિયંત્રણ માટે ફુળમાખીના પીજર (૧૦ ટ્રેપ/લે.) મૂકવા.
ચીકુ	<ul style="list-style-type: none"> બીજા વિભાજનમાં ભલામણ કરેલ ખાતરનો રૂપ ટકા ભાગ પ્રમાણે રસાયણિક ખાતર અમોનિયમ સલફેટ ૧.૩ કિગ્રા અથવા યુરિયા ૦.૬ કિગ્રા, સિંગલ સુપર ફોસ્ફેટ ૦.૮ કિગ્રા, મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ ૦.૩ કિગ્રા, છાણિયુ ખાતર રૂપ કિગ્રા આ મહિનામાં હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે આપવું.
પશુપાલન	<p>સામાન્ય સલાહ:</p> <ul style="list-style-type: none"> પશુઓને દૂધ ઉત્પાદન અને નિભાવની જરૂરિયાત ધ્યાનમાં લઈ પૂરતા પ્રમાણમાં સમતોલ આહાર આપવો. તેમજ પશુઓના રહેઠાળ ચોખ્ખા રાખવા, દિવસ દરમયાન સમયાંતરે મળ-મૂતર નો નિકાલ કરવો. પશુઓને યોગ્ય આહારમાં જરૂરીયાત પ્રમાણે ખનિજ્યુકુત મિશ્રણના સમાવેશ કરવો જોઈએ. ચાદ્ર કટરથી લીલા તથા સૂક્ષ્મ ધાસુચારાને ટુકડા કરીને જ નીરણ કરવું. દૃધાળા પશુઓના આઉને દૂધ દોહન પહેલા અને પછી ઝીક ઓક્સાઈડ અથવા બોરીક પાઉડર અથવા પોટેશીયમ પરમેગેનેટ ના દ્રાવણથી બરાબર સાઢે કરવા. પશુઓનાં ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથીન અથવા એમીટાજર ૨ મી.લી./લિટર પાણીમાં નાખેને છાંટવી (દ્વાની બોટલ ઉપર લખેલી સૂચનાનો અમલ કરવો). કોઢ/ગમાણની ઉચ્ચાઈ ૧૦ કૂટથી વધારે રાખવી, જેથી હવાની હેરેફેર સરળતાથી થઈ શકે, બફારો/ગરમી ઓછી થાય અને ભોયાતનિયાનો ભાગ સુકો રહે. વિયાળ બાદ વાઇરસ/પાડીયાને અડ્યાથી એક કલાકની અંદર ૫૦૦ મી.લી. જેટલું ચીક / ખીસું પીવડાવવું ત્યારબાદ પંદર દિવસ સુધી વિશ્વરાસ/પાડીયાં કુલ વજન ના ૧૦ માં ભાગનું દૂધ/દિવસ પીવડાવવું. પશુ ઈચ્છે ત્યારે પાણી પી તેવી વ્યવસ્થા રાખવી અથવા દિવસમાં ઓછા માં ઓછુ ચાર વાર પશુની જરૂરીયાત મુજબ પાણી આપવું. મહત્તમ તાપમાનમાં અચાનક વધારો થવાને કારણે દિવસ દરમયાન પ્રાણીઓને શેડ/આંદ્રાદિત વિસ્તારની નીચે રાખો. ગરમીની ઋતુમાં પશુઓનું શારીરિક તાપમાન જગ્ઘવાય રહે તે માટે કોઢ/ગમાણમાં પંખાની વ્યવસ્થા કરવી અથવા બપોરના સમયમાં વૃક્ષના છાયડામાં રાખી શકાય.
વનીકરણ	<ul style="list-style-type: none"> પ્રથમ બને બીજા વર્ષના વાંચેનર દરમયાનમાં નિંદાળ અને સફ્ટાય કરવી જોઈએ. નવા સાગના રોપાના માટે પસંદ કરેલામાંથી સાગ અથવા વત્તા વૃક્ષમાંથી સાગ (સેગ) ના પરિપક્વ બીજ એકવિત કરો.
ફીશરીઝ	<p>સામાન્ય સલાહ:</p> <ul style="list-style-type: none"> મીઠા પાણીના મત્સ્ય મીઠા પાણીના જુંગા ઉત્પાદન કરતા ખેડૂતોને જાણાવવાનું કે, આ સમયગાળા દરમયાન પૂરતી માત્રામાં ખોરાક આપવોકારણ કે આ વાતાવરણ માછલી/મીઠા પાણીના જુંગા માટે અનુકૂળ છે. તળાવમાં પાણીનું લેવલ જગ્ઘવાનું અને વધુ વરસાદ આવે ત્યારે તળાવના આઉટબેટ થોડી માત્રામાં ખોલવા. તેથી પાણીનું લેવલ જગ્ઘવાયેલું રહે. તળાવના તળિયાનું અને સપાટીનું તાપમાન સરભર કરવા એરેટર અથવા પંખ્ય ચલાવવા.

❖ એગ્રોમેટ સલાહદાર સેવા બુલેટિન કમિનીના સભ્યો :

- ડૉ. એચ. એમ. વિક્રીયા, પ્રાધ્યાપક અને વડા (સશ્ય વિજ્ઞાન)
- ડૉ. એલ. વી. ઘેરીયા, સહ પ્રાધ્યાપક (વનસ્પતિ કીટકશાસ્ક)
- ડૉ. કે. બી. રાખોલીયા, સહ પ્રાધ્યાપક (વનસ્પતિ શેગશાસ્ક) :
- ડૉ. વી. લી. ઈટવાલા, રંશોધન વૈજ્ઞાનિક (શાકબાળ વિજ્ઞાન)
- ડૉ. વાય. એન. ટેટેલ, સહ પ્રાધ્યાપક (હળ વિજ્ઞાન)

- ડૉ. વી. આર. પટેલ, મદદનીશ પ્રાદ્યાપક (પશુપાતન)
- ડૉ. દિલેખ નાથક, મદદનીશ પ્રાદ્યાપક (વનીકરણ)
- ડૉ. એમ. આર. પટેલ, મદદનીશ પ્રાદ્યાપક (ફીશબીઝ સાયન્સ)
- ડૉ. વિભા ટાક, બીજર્ય એસોર્સિયેટ (લ્યુકેન્ચ.એમ.એસ.)
- ડૉ. પી. કે. પરમાર, મદદનીશ પ્રાદ્યાપક (ફિઝિ હવામાનશાસ્ત્ર) અને પ્રિન્સિપાલ નોડલ ઓફિસર (લ્યુકેન્ચ.એમ.એસ.)



Gramin Krishi Mausam Sewa



NAVSARI AGRICULTURAL UNIVERSITY

Agricultural Meteorological Cell

Navsari Agricultural University

Navsari – 396450, Gujarat

E-mail :- aasnnavsari@gmail.com



(Jointly issued by Navsari Agricultural University & India Meteorological Department)

DATE OF ISSUE: 14/05/2024

Agromet Advisory Bulletin No: 13/2024 - 2025

-- Navsari District --

Weather summary of preceding week 09 May to 14 May - 2024

Sr. No.	Name of Weather Parameters	Value
1.	Range of Rainfall (mm)	0.0
2.	Range of Maximum Temperature (°C)	33.6-39.5
3.	Range of Minimum Temperature (°C)	18.5-26.5
4.	Range of Relative Humidity (%)	45-91
5.	Range of Wind Speed (km/hr)	3.0-6.7
6.	Range of Cloud Cover (Okta)	0-7
7.	Range of bright sunshine hours (hrs)	5.1-9.4
8.	Last five days cumulative rainfall (mm)	0.0
Total Rainfall (mm)		0.0


IMD based Weather forecast for 15 May to 19 May – 2024

Sr. No.	Weathers Parameters	Day - 1 (15/05)	Day - 2 (16/05)	Day - 3 (17/05)	Day - 4 (18/05)	Day - 5 (19/05)
1.	Rainfall (mm)	4	2	1	1	0
2.	Maximum temperature (°C)	40	41	40	40	41
3.	Minimum Temperature (°C)	24	24	24	24	25
4.	Max. Relative Humidity (%)	54	58	60	68	66
5.	Min. Relative Humidity (%)	32	29	31	32	38
6.	Wind Speed (km/hr.)	13	13	15	16	15
7.	Wind Direction (Compass point)	225	285	236	216	225
8.	Total Cloud Cover (Okta)	6	5	5	3	1

Weather Summary/ Alert	<ul style="list-style-type: none">As per the forecast issued by India Meteorological Department over the next five days, the sky will be cloudy and there are chances of very light to light rainfall on 15th – 18th May, 2024 at isolated places.The Maximum temperature is 40 °C to 41 °C, when the Minimum temperature is 24 °C to 25 °C likely to be around.The humidity in the air is likely to be between 29 and 68 percent.The wind direction will be South-West with an average speed of 13 to 16 km/h.As per Extended range forecast, possibility of below normal rainfall and maximum and minimum temperature likely to be normal up to 25th May, 2024.
-----------------------------------	--

-:: South Gujarat Heavy Rainfall Zone ::-

General Advisory <ul style="list-style-type: none"> • Wind speed is high >15 kmph, so avoid spraying of pesticide. • Farmers are advised to apply irrigation as per requirement of crops and apply recommended dose of fertilizers and monitor the crop and take plant protection measures against disease-pest incidence. • Farmers are advised to go for summer deep ploughing after harvesting of the crop with sub-soiler or chisel plough to break hard pan in the sub soil, to improve soil condition & to destroy the soil borne pathogen, insect pest and weeds by exposing them to hot sun light. • Make planning for next kharif season and procure improved verities/hybrid seeds, fertilizers, agrochemicals and other inputs accordingly. Undertake the seed germination test by using part of sample seeds of procured/own seeds before sowing in field. • Use crop residue, straw, plastic mulch for conservation of soil moisture and weed control. • Keep animals under shed/covered area during day hours due to sudden increase in maximum temperature. • No weeding in vegetable field to protect crops from high temperature. • Download the MEGHDOOT mobile application for Agromet Advisory Services and information on weather forecasting, which will provide weather based agricultural advice to farmers for their location, crops and livestock in their local language. Click on the following link to download the MEGHDOOT application: Android users: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot IOS users: https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155 • Download the DAMINI Mobile application to ensure the safety through monitoring sky lightning activity. It will provide the alert and detail description of instruction, precaution, Do and Don't. Click on the following link to download the DAMINI application. Android users: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lighteninglive.damini IOS users: https://apps.apple.com/app/id1502385645



Crop	Weather based Agro-Advisory
Sugarcane	<p>Vegetative Stage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apply split dose of Nitrogen fertilizer as per recommendation- 2nd dose 30% of 250 kg N/ha at 3-3.5 month after planting, 3rd dose 20% of 250 kg N/ha at 4-4.5 month after planting and 4th dose 35% of 250 kg N/ha at 5.5-6 month after planting (before final earthing up). • As per soil/climatic condition and stage of crop irrigation apply- summer at 15-17 day interval or adopt drip method of irrigation and mulching of trash in between two rows of crop to save irrigation water. • Keep crop weed free upto 4 months of planting by interculturing, hand weeding or apply post emergence weedicide like 2,4-D Na Salt (1.2 kg ai/ha)+ Paraquat (0.600 kg ai/ha) [2,4-D (Na Salt, 30 kg)+ Paraquat (50 g/10 lit.)] after 30-60 DAP. • Earthing up should be done at 3-3.5 and 5.5-6 months after planting. • Application of Carbofuron 3 CG @ 33 kg/ha in soil for control of sugarcane early shoot borer due to increase in temperature.
Kharif Paddy	<ul style="list-style-type: none"> • Prepare field for nursery by ploughing and harrowing, apply well decomposed FYM or Biocompost and prepare raised bed of 1m wide and convenient length. 1/10th area of Transplanting (1000 sq. m area of

	nursery for Transplanting in 1 ha field) should be used for nursery. Procure seeds of newly released variety of rice from University farm. 25-30 kg seeds require to transplant 1 ha area.
Summer Paddy	<p>Maturity stage:</p> <ul style="list-style-type: none"> At hardening of grain in panicle, withdraw the water from the field and allow drying the field. At maturity harvest the crop. Properly in sun dry.
Summer Pulse crop	<p>Maturity stage:</p> <ul style="list-style-type: none"> Harvest the crop when most of pods mature and prepare the field for <i>kharif</i> crop.
Summer Okra	<ul style="list-style-type: none"> Harvesting should be carried out as per the tenderness of marketable fruit during clear weather condition. Discard damaged and diseased fruit. Apply irrigation as per need. Weeding should be carried out. Spraying of <i>Hexaconazole</i> 5 EC @ 10 ml or <i>Carbendazim</i> 50 WP 5 g per 10 Lit of water for control of powdery mildew/leaf spot disease under clear weather condition. Red Spider Mite: Collection & destruction of damaged leaves/plants along with mites. Or As temperature is increasing rapidly favoring population build up of red spider mite in okra, for its management spray <i>Fenazaquin</i> 10 EC @ 15 ml or <i>Spriomesifen</i> 22.9 SC @ 8 ml per 10 lit of water during clear weather condition.
Brinjal	<ul style="list-style-type: none"> Harvesting should be carried out as per the tenderness of marketable fruit during clear weather condition. Discard damaged and diseased fruit. Apply irrigation as per need. Weeding should be carried out. 40 pheromone trap per hectare should be kept for management of fruit and shoot borer in brinjal. Little leaf of brinjal: Monitoring and uproot and burn from brinjal field. Red Spider Mite: Collection & destruction of damaged leaves/plants along with mites. Or As temperature is increasing rapidly favoring population build up of red spider mite in brinjal, for controlling spray <i>Propargite</i> 57 EC @ 20 ml/10 lit or <i>Fenazaquin</i> 10 EC @ 15 ml or <i>Etoxozole</i> 10 SC @ 8 ml or <i>Spriomesifen</i> 22.9 SC @ 8 ml per 10 lit of water during clear weather condition.
Cow Pea	<ul style="list-style-type: none"> Harvesting should be carried out as per the tenderness of marketable fruit. Interculturing & weeding should be carried out. Apply irrigation as and when required.
Cluster bean	<ul style="list-style-type: none"> Harvesting should be carried out as per the tenderness of marketable fruit. Interculturing & weeding should be carried out. Apply irrigation as and when required.
Pointed gourd	<ul style="list-style-type: none"> Marketable fruit should be harvested. Apply irrigation as and when required.
Little gourd	<ul style="list-style-type: none"> Marketable fruit should be harvested. Apply irrigation as and when required.
Tropical Tuber crops	<ul style="list-style-type: none"> Field preparation should be carried out, add well decomposed FYM/Compost@20-25t/ha. The farmers of south Gujarat Heavy Rainfall Zone, intending to grow elephant foot yam cv. Gajendra organically are advised to raise green manure cowpea (seed rate @ 20 kg ha⁻¹) prior to elephant foot yam and incorporate green matter at 45-60 days.
Mango	General Advise :

	<ul style="list-style-type: none"> Find grubs of stem borer from gallery and holes on the stem and kill them. Do pouring of <i>Chlorpyriphos</i> 20 EC @ 25 ml/ 10 lit in hole and plug it with mud in clear weather condition under clear weather condition.. Spray Novel 1% (1 Lit.) or NAA 20 ppm (2g) + Urea 2% (2 kg) in 100 lit. water to reduce fruit drop in mango. Apply Urea (800g) or Ammonium Sulphate (1.8 kg) with irrigation at pea to marble stage of mango fruits. Provide support to the young plants of mango to protect against rain and high wind speed. Spraying of <i>Hexaconazole</i> 5 EC @ 10 ml or or <i>Carbendazim</i> 50 WP @ 10 g per 10 lit for control of Anthracnose in clear weather condition. Apply mulch of paddy straw/mango leaves and give light irrigation to reduce fruit drop in mango. Install <i>methyl eugenol</i> trap (10 traps/ha.) for controlling <i>fruit flies</i> in mango orchard.
Sapota	<p>General Advise :</p> <ul style="list-style-type: none"> Apply second split of 25% of RDF (Ammonium Sulphate -1.3 kg or Urea 0.6 kg, SSP 0.8 kg and MOP 0.3 kg + FYM 25 kg each tree) in clear weather condition.
Livestock	<p>General Advise :</p> <ul style="list-style-type: none"> Provide adequate quantity of balanced ration by considering the milk production and maintenance. Good quality dry roughage with 15-20 kg green fodder provided to the animals, only after chaffing. Feed silage & hay materials if available. Before and after milking udder must be properly clean with zinc oxide or boric powder or potassium permanganate solutions. For the control of tick and other parasites, spray <i>Deltemethrin</i> or <i>Aemitaz</i> 2 ml in 1 liter of water. Height of animal shed should keep minimum 10 feet for aeration to maintain the floor dry and to control humidity. Young calves should be offered with approximate 500 ml. of Colostrums within half an hour of calving. Thereafter for next 15 days, milk should be offered at the amount of 1/10th of body weight in a day. Keep drinking water facility for 24 hrs. of period or offered adlib water four times in a day. Keep animals under shed/covered area during day hours due to sudden increase in maximum temperature. In the summer season, to maintain the body temperature, it is advisable that to keep fan in the shade or can keep the animal under the shadow of the tree.
Forestry	<ul style="list-style-type: none"> Weeding and cleaning should be done during first and second year plantations. Collect the mature seed of teak (Sag) from selected/plus tree for raising of new teak seedling.
Fisheries	<ul style="list-style-type: none"> Fresh water farmers give proper feed in fish/prawn farming for better growth rate because environment condition is very suitable. Increase water depth and maintain water level through pond outlet. Mixing the top and bottom water by using the aerators or pumps.

❖ **Members of Agro-Advisory Committee :**

- Dr. H. M. Viradia, Professor & Head (Agronomy)
- Dr. L. V. Ghetiya, Associate Professor (Entomology)
- Dr. K. B. Rakholiya, Associate Professor (Plant Pathology):
- Dr. C. G Intwala, Research Scientist (Vegetable Science)
- Dr. Y. N. Tandel, Associate Professor (Fruit Science)
- Dr. V. R. Patel, Assistant Professor (Animal Husbandry)
- Dr. Dileswar Nayak, Assistant Professor (Forestry)
- Dr. M. R. Patel, Assistant Professor (Fisheries Science)
- Dr. Vibha Tak, Research Associate(GKMS)
- Dr. P. K. Parmar, Assistant Professor (Agricultural Meteorology and Principal Nodal Officer (GKMS))

છવામાન આગાહી

વિગત	તારીખ	દાંગ	નવચારી	વલસાડ
વરસાદ (મી.મી)	૧૫/૦૫/૨૦૨૪	૫	૪	૫
	૧૬/૦૫/૨૦૨૪	૨	૨	૨
	૧૭/૦૫/૨૦૨૪	૧	૧	૨
	૧૮/૦૫/૨૦૨૪	૧	૧	૧
	૧૯/૦૫/૨૦૨૪	૦	૦	૦
મહત્તમ તાપમાન (ઘે.સે)	૧૫/૦૫/૨૦૨૪	૩૬	૪૦	૩૯
	૧૬/૦૫/૨૦૨૪	૩૬	૪૧	૩૯
	૧૭/૦૫/૨૦૨૪	૪૦	૪૦	૩૬
	૧૮/૦૫/૨૦૨૪	૪૦	૪૦	૩૬
	૧૯/૦૫/૨૦૨૪	૪૦	૪૧	૩૬
લઘુત્તમ તાપમાન (ઘે.સે)	૧૫/૦૫/૨૦૨૪	૨૨	૨૪	૨૨
	૧૬/૦૫/૨૦૨૪	૨૩	૨૪	૨૨
	૧૭/૦૫/૨૦૨૪	૨૨	૨૪	૨૨
	૧૮/૦૫/૨૦૨૪	૨૨	૨૪	૨૧
	૧૯/૦૫/૨૦૨૪	૨૨	૨૫	૨૧
મહત્તમ ભેજ (%)	૧૫/૦૫/૨૦૨૪	૪૪	૫૪	૫૬
	૧૬/૦૫/૨૦૨૪	૪૪	૫૮	૫૫
	૧૭/૦૫/૨૦૨૪	૪૨	૫૦	૫૭
	૧૮/૦૫/૨૦૨૪	૫૧	૫૮	૫૬
	૧૯/૦૫/૨૦૨૪	૫૫	૫૬	૫૦
લઘુત્તમ ભેજ (%)	૧૫/૦૫/૨૦૨૪	૧૮	૩૨	૩૩
	૧૬/૦૫/૨૦૨૪	૧૪	૨૬	૩૧
	૧૭/૦૫/૨૦૨૪	૧૪	૩૧	૩૧
	૧૮/૦૫/૨૦૨૪	૧૫	૩૨	૩૨
	૧૯/૦૫/૨૦૨૪	૧૬	૩૮	૩૭
પવનની ગતિ(ક્ર.મી./કલાક)	૧૫/૦૫/૨૦૨૪	૮	૧૩	૧૨
	૧૬/૦૫/૨૦૨૪	૧૦	૧૩	૧૧
	૧૭/૦૫/૨૦૨૪	૧૧	૧૫	૧૨
	૧૮/૦૫/૨૦૨૪	૧૨	૧૬	૧૫
	૧૯/૦૫/૨૦૨૪	૧૩	૧૫	૧૪
પવનની દિશા (ક્રમાસ પોઈન્ટ)	૧૫/૦૫/૨૦૨૪	W	SW	S
	૧૬/૦૫/૨૦૨૪	NW	W	W
	૧૭/૦૫/૨૦૨૪	W	SW	SW
	૧૮/૦૫/૨૦૨૪	W	SW	SW
	૧૯/૦૫/૨૦૨૪	W	SW	SW
વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટા)	૧૫/૦૫/૨૦૨૪	૬	૬	૬
	૧૬/૦૫/૨૦૨૪	૫	૫	૫
	૧૭/૦૫/૨૦૨૪	૫	૫	૫
	૧૮/૦૫/૨૦૨૪	૩	૩	૩
	૧૯/૦૫/૨૦૨૪	૧	૧	૧