



નવસારી કૃપિ વિશ્વવિદ્યાલય

ગ્રામીણ કૃપિ મૌસમ સેવા

કૃપિ હવામાનશાસ્ત્ર સેવ

કૃપિ ઈજનેરી વિભાગ, ન. મ. કૃપિ મહાવિધાલય

નવસારી કૃપિ વિશ્વવિદ્યાલય

નવસારી - ૩૮૬૪૫૦, ગુજરાત

ઈ-મેઇલ:- aasnnavsari@gmail.com



ભારત મૌસમ વિજ્ઞાન
વિભાગ

(નવસારી કૃપિ વિશ્વવિદ્યાલય અને ભારત મૌસમ વિજ્ઞાન વિભાગ દ્વારા પ્રસારિત)

તા. ૧૧/૦૧/૨૦૨૫

કૃપિ હવામાન બુલેટીન નં : ૮૨/૨૦૨૪ - ૨૦૨૫

-- નવસારી જિલ્લો --

પાછળનાં સમયનું હવામાન (તા. ૦૭ જાન્યુઆરી થી ૧૦ જાન્યુઆરી - ૨૦૨૫)

અનું. નં.	હવામાન પરિબળો	Value
૧.	વરસાદની શ્રેણી (મી.મી.)	૦.૦
૨.	મહત્તમ તાપમાનની શ્રેણી (સે.ગ્રે.)	૨૮.૪-૩૧.૫
૩.	લધુતમ તાપમાનની શ્રેણી (સે.ગ્રે.)	૧૨.૫-૧૫.૫
૪.	ભેજની શ્રેણી (%)	૩૫-૭૬
૫.	પવનની ગતિની શ્રેણી (કિ.મી./કલાક)	૨.૯-૮.૩
૬.	વાદળની સ્થિતિની શ્રેણી (ઓક્ટા)	૦-૦
૭.	સુર્યપ્રકાશિત સમયની શ્રેણી (કલાક)	૭.૧-૮.૧
૮.	પાછળના પાંચ દિવસમાં સંચિત વરસાદ (મી.મી.)	૦.૦
કુલ વરસાદ		૦.૦

આઈ. એમ. ડી. દ્વારા પ્રાપ્ત હવામાન આગાહી (તા. ૧૧ જાન્યુઆરી થી ૧૫ જાન્યુઆરી - ૨૦૨૫)

અનું. નં.	હવામાન પરિબળો	દિવસ-૧ (૧૧/૦૧)	દિવસ-૨ (૧૨/૦૧)	દિવસ-૩ (૧૩/૦૧)	દિવસ-૪ (૧૪/૦૧)	દિવસ-૫ (૧૫/૦૧)
૧.	વરસાદ (મી.મી.)	૦	૦	૦	૦	૦
૨.	મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૩૨	૩૧	૩૨	૩૩	૩૨
૩.	લધુતમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૧૬	૧૪	૧૫	૧૭	૧૭
૪.	મહત્તમ ભેજ (%)	૮૫	૮૫	૮૫	૬૦	૬૦
૫.	લધુતમ ભેજ (%)	૬૦	૬૫	૬૦	૬૦	૬૫
૬.	પવનની ગતિ (કિ.મી./કલાક)	૮	૫	૬	૧૦	૮
૭.	પવનની ટિશા (ક્રમાસ પોઈન્ટ)	૮૫	૬૫	૨૮	૧૭	૨૮
૮.	વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટા)	૦	૨	૦	૦	૨

વિસ્તૃત રેન્જની આગાહી મુજબ, ૧૮મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૫ સુધી વરસાદ સામાન્યથી ઉપર અને મહત્તમ તાપમાન સામાન્ય અને લધુતમ સામાન્યથી ઉપર રહેવાની અપેક્ષા છે.

હવામાન સારાંશ / ચેતવણી	<ul style="list-style-type: none"> આઈ. એમ. ડી., દ્વારા મળેલી હવામાનની આગાહી મુજબ આગામી પાંચ દિવસમાં આકાશ ચોખ્યાં રહેશે અને વરસાદ આવવાની સંભાવના નથી. મહત્તમ તાપમાન ત૧ સે. થી ૩૩ સે. જ્યારે લધુતમ તાપમાન ૧૪ સે. થી ૧૭ સે. આસપાસ હોવાની સંભાવના છે. હવામાન ભેજનું પ્રમાણ ૬૦ થી ૬૫ ટકા વચ્ચે રહેવાની સંભાવના છે. પવનની ટિશા ઉત્તર-પૂર્વ ગડેશે જેની સરેરાગ ગતિ પથી ૧૦ કિ.મી./કલાક રહેવાની શક્યતા હોય.
-------------------------------	---

-:: દક્ષિણ ગુજરાત ભારે વરસાદ વિસ્તાર ::-

સામાન્ય સલાહ	<ul style="list-style-type: none"> • ઉભા પાકોમાં રોગ-જવાતના ઉપદ્રવનું નિયમિત નિરીક્ષણ કરી ભલામણ મુજબના પાક સંરક્ષણના પગવા લેવા. • ઉભા પાકોમાં ભલામણ મુજબના ખાતરો તથા જરૂરિયાત મુજબ પિયત આપવું. આકાશ ચોખ્યાં હોય તથા પવનની ગતિ ઓછી રહે ત્યારે જંતુનાશક તથા ફૂગનાશક દવાની જોડે ડીટરજન્ટ પાઉડર અથવા સ્ટીકર (ગુંદીયું)નો ઉપયોગ કરીને છંટકાવ કરવો. • કેરીના નવા વાવેલા/યુવાન છોડને છાંધો આપો અને દાંડીની આસપાસ લીલા ધાસ નાખો. • કૃપિ હવામાન સલાહકારી બુલેટીન અને હવામાનની આગાહી અંગેની મેળવવાં માટે ડાઉનલોડ કરો મેધદૂત મોબાઈલ એપ્લિકેશન, જે ખેડુતોને તેમની સ્થાનિક ભાષામાં સ્થાન, પાક અને પશુધન વિશે હવામાનાધ્યારિત કૃપિ સલાહ પ્રદાન કરશે. મેધદૂત એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો: <p>એન્ડ્રોઇડ યુર્જર્સ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot</p> <p>આઈ.ઓ.એસ. યુર્જર્સ: https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155</p> <ul style="list-style-type: none"> • દામિની મોબાઈલ એપ્લિકેશનન્દવારા આકાશીય વિજણીની અગાઉથી ચેતવણી આપવામાં આવે છે તેમજ આકાશીય વિજણીથી બચના શું કરવું અને શું નહિ કરવું તેની વિગતવાર માહિતી પૂરી પાડવામાં આવે છે. આથી ખેડુતમિશ્રોને દામિની મોબાઈલ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. દામિની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો: એન્ડ્રોઇડ યુર્જર્સ: <p>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightening.live.damini</p> <p>આઈ.ઓ.એસ. યુર્જર્સ: https://apps.apple.com/app/id1502385645</p>
પાક	હવામાન આધારિત કૃપિ સલાહ
શેરડી	<ul style="list-style-type: none"> • શેરડીની રોપણી માટે બીજ પ્લોટ બનાવેલ હોય તો બીજ માટે શેરડી કાપવાની હોય તેના એક માસ પહેલા પંચ કિગ્રા / લે. નાઈટ્રોજન ખાતર આપવું. નવી રોપણી માટે જમીન તૈયારી/જરમિનેશન/વાનસ્પતિક વિકાસ અવસ્થા • શેરડીની નવી રોપણી માટે યોગ્ય ભેજની પરિસ્થિતિમાં જમીન તૈયાર કરવી. • શેરડીની રોપણી ઓકટોબર-કેલ્લુઆરી માસ દરમાન કરવી. • ઐડ વખતે ખાતર્ય/ક્રમ્પોસ્ટ જમીનમાં લેળવવું. • રોપણી પહેલા પાયાનું ખાતર આપવું. • ખાતર વયસ્થાપન ૨૫૦-૧૨૫-૧૨૫ કી. ના. ફ્લ. પો. પ્રતિ લે. ખાતરનો ઉપયોગ કરો. મૂળભૂત માત્રા (વાવેતર સમયે) : ડી.એ.પી. : ૨૭૧ કી./લે. અથવા એસ એસ પી : ૭૮૨ કી./લે., મ્યુએટ ઓફ પોટાશ : ૨૦૮ કી./લે. અને યુરીયા : જ્યારે એસ એસ પી નો ઉપયોગ કરતાં હોય ત્યારે ૮૧ કી./લે પાયાના ખાતર તરીક આપો. • પૂર્તી ખાતરની ભલામણ મુજબ નાઈટ્રોજન ખાતર આપવું. – પ્રથમ ડોઝ – યુરીયા : ૧૬૩ કી/લે. મુજબ વાવણીના ૧.૫ થી ૨.૦ માસે, બીજો ડોઝ – યુરીયા ૧૦૮ કી/લે. મુજબ વાવણીના ૩ થી ૩.૫ માસ, ચીજો ડોઝ – યુરીયા : ૧૮૦ કી/લે. મુજબ વાવણીના પછી ૫.૫ માસ. • રોપણી માટે કુમળું અને તંદુરસ્ત તમારી પસંદગીની જાતનું બિયારણ વાપરવું. રોપણી માટે બે લાઈન વચ્ચે ૮૦ થી ૧૨૦ સેમી. અંતર રાખી બે આંખના કટકને બીજમાવજત આપી (કાર્બેન્ડાઝિમ ૫૦ ડિબલ્યુ પી ૧ ગ્રા. / ૧ લિટર પાણી) એક પછી એક કટક ચાસમાં રહે તે શેરીને રોપણી કરવી. એક આંખના રોપણું વાવેતર કરવાનું હોય તો લાઈનમાં બે રોપા વચ્ચે રૂપ થી ૬૦ સેમી. અંતર રાખી રોપણી કરવી. • રોપણી બાદ પિયત આપી ત દિવસમાં એટ્રોઝીન ૫૦ ડિબલ્યુ પી પ્રી ઈમરજન્સ ૮૦ ગ્રામ/૧૦ લી. પાણી નીંદણાશક નો છંટકાવ હવામાન ચોખ્યાં હોય ત્યારે કરવો. • જમીન/વાતાવરણ અને પાકની અવસ્થા મુજબ જરૂરી પિયત આપવું. ઉનાગમાં - ૧૫-૧૭ દિવસના ગાળે પિયત આપવું અથવા ટપક પિયત અપનાવી અને બે હર વચ્ચે સુકી પતારીનું આવરણ (મલચિંગ) કરી પિયત પાણીની બચત કરવી. • પાકને વાવણીના ચાર માસ સુધી નીંદણ મુક્ત રાખવું, આ માટે સમયાંતરે આંતરખેડ અને હાથથી નીંદણ કરવું અથવા નીંદણાશક દવા ૨,૪-D – Na સોલ્ટ (૧.૨ કિગ્રા. સંક્ષિપ્તત્વ/લે.) + પેરાક્વોટ (૦.૬૦૦ કિગ્રા. સંક્ષિપ્તત્વ/લે.) અને ૨,૪-D – Na સોલ્ટ ૩૦ ગ્રામ + પેરાક્વોટ (૫૦ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લિટર) ૩૦-૬૦ દિવસ વચ્ચે છંટકાવ કરવો. • વાવણીના ૩-૩.૫ માસે અને ૫.૫-૬ માસે પાગા ચડાવવા.

શીયાળુ કઠોળ	વાનસ્પતિક વિકાસ અવસ્થા: <ul style="list-style-type: none"> પાક નીદાળ મુકુંત રાખવું. આ માટે જરૂરી જાણાય તો વાવણી બાદ તુર્ણત ભવામણ મુજબની નિદાળનાશક દવાનો જરૂરી ઉપર છંટકાવ કરવો. જરૂરિયાત મુજબ પીધન આપવું. એમોમેડિટન બેન્જોએટ ૧.૮ ઈસી ૭.૫ મિલી./૧૦ લિટર પાણી મુજબ ચણાની પોપટા કોરનારી ઈયળના નિયંત્રણ માટે છંટકાવ કરવો. તુવેરમાં શીંગ કોરી ખાનાર ઈયળના નિયંત્રણ માટે કલોરાન્ટનીલીપ્ર ૧૮.૫ એસસી ૩ મિલી. અથવા ફ્લુબેન્નીઆમાઈડ ૨૦ ઉભલ્યુ છુ ૫ ગ્રામ અથવા ઈન્ડોક્ષાકાર્બ ૧૪.૫ એસસી ૮ મિલી. અથવા લ્યુક્ઝન્યુરોન ૫.૪ ઈસી ૧૨ મિલી. ૧૦ લિટર પાણીમાં બેળવીને છંટકાવ કરવો.
ભીડા	<ul style="list-style-type: none"> નીદાળ અને આંતર-પાક કામગીરી લાથ ધરવી જોઈએ. જરૂરિયાત મુજબ સિંચાઈ આપવી જોઈએ. ભીડામાં લૂટાણા અને પાનના ટપકના નિયંત્રણ માટે હેક્સકોનાઓલ પ ૯ ઈસી ૧૦ મિલી. અથવા કાર્બેન્ડાઝીમી પ૦ ઉભલ્યુપી પ ગ્રા પ્રતિ ૧૦ લી. પાણીમાં મીશ્ર કરી હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે છંટકાવ કરવો. ખેતરમાંથી પીળી નસના વિપાણુ જન્ય છોડ ને ઉપાડી નાશ કરો. હેક્ટરે ૪૦ ભીડામાં ફળ અને દુખ ની ઈયળના ફેરોમોન સાથેના ટ્રેપ મુકવા. રોગનો ફેલાવો સફેદ માનીશી થાતો હોય, શોપક પ્રકારની જંતુ નાશક દવાનો છંટકાવ કરવો. ભીડામાં પાન કથીરીના નિયંત્રણ માટે પ્રોપર્ગાઈટ ૫૭ ઈસી ૨૦ મિલી./૧૦ લીટર અથવા ફેનાઝાકવીન ૧૦ ઈસી ૧૦ મિલી./૧૦ લીટર પાણીમાં બેળવી પાક ઉપર છંટકાવ હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે કરવો.
રીંગણુ	<ul style="list-style-type: none"> જરૂરિયાત મુજબ સિંચાઈ આપવી જોઈએ. ફરોરોપાણીના ૨૦ દિવસ બાદ હેક્ટરે ૪૦ રીંગણુની ફળ અને દુખ ની ઈયળના ફેરોમોન સાથેના ટ્રેપ મુકવા. રીંગણુમાં પાન કથીરીના નિયંત્રણ માટે પ્રોપર્ગાઈટ ૫૭ ઈસી ૨૦ મિલી./૧૦ લીટર અથવા ફેનાઝાકવીન ૧૦ ઈસી ૧૦ મિલી./૧૦ લીટર પાણીમાં બેળવી પાક ઉપર છંટકાવ હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે કરવો.
ટામેટા	<ul style="list-style-type: none"> નીદાળ અને આંતર-પાક કામગીરી લાથ ધરવી જોઈએ. ફરોરોપાણીના ૨૦ દિવસ બાદ હેક્ટરે ૪૦ લસકરી ઈયળ તથા ટ્રેમટાની ફળ કોરી ખાનાર ઈયળના ફેરોમોન સાથેના ટ્રેપ મુકવા. ટામેટામાં પાનના ટપકના નિયંત્રણ માટે મેન્કોનેજેબ અપ ઉભલ્યુપી ૨૮ ગ્રા પ્રતિ ૧૦ લી. પાણીમાં મીશ્ર કરી હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે છંટકાવ કરવો.
મરચી	<ul style="list-style-type: none"> નીદાળ અને આંતર-પાક કામગીરી લાથ ધરવી જોઈએ. મરચીમાં ગ્રાસના નિયંત્રણ માટે એસીટામીનિડ ૨૦ એસ પી ૨ ગ્રામ અથવા બ્રોંક્લાનીલીડ ૨૦ એસ સી ૨.૫ મિલી અથવા સાયઅનેન્ટ્રોની લિપ્પોલ ૧૦.૨૬ ઓડી ૧૨ મિલી અથવા ઈથિઓન ૫૦ થી ૩૦ મિલી અથવા ફ્રીપ્રોનીલ પ અસ સી આઈસોસાઈકલોસીરેમ ૮.૨ ઓડી ૧૫ મિલી પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં બેળવી પાક ઉપર હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે છંટકાવ કરવો. મરચીમાં પાન કથીરીના નિયંત્રણ માટે પ્રોપર્ગાઈટ ૫૭ ઈસી ૨૦ મિલી./૧૦ લીટર અથવા ફેનાઝાકવીન ૧૦ ઈસી ૧૦ મિલી./૧૦ લીટર પાણીમાં બેળવી પાક ઉપર હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે છંટકાવ કરવો. મરચીમાં ફળનો સડોના નિયંત્રણ માટે કાર્બેન્ડાઝીમી પ૦ ઉભલ્યુપી ૧૦ ગ્રા પ્રતિ ૧૦ લી. પાણીમાં મીશ્ર કરી હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે છંટકાવ કરવો.
પરવળ	<ul style="list-style-type: none"> ફળની પરિપક્વતા મુજબ લાણણી કરવી. જાન્યુઆરીમાં જરૂરિયાત મુજબ ૧૫ થી ૨૦ દિવસે પિયત આપવું.
ટિંડોળા	<ul style="list-style-type: none"> ફળની પરિપક્વતા મુજબ લાણણી કરવી. જાન્યુઆરીમાં જરૂરિયાત મુજબ ૧૫ થી ૨૦ દિવસે પિયત આપવું.
સુરણુ	<ul style="list-style-type: none"> સુરણુની પરિપક્વતા પ્રમાણે લાણણી શરૂ કરવી.
રતાળુ	<ul style="list-style-type: none"> રતાળુનીપરિપક્વતા પ્રમાણે લાણણી શરૂ કરવી.
તાનિયા	<ul style="list-style-type: none"> “પાતરા” નામની વાનગી બનાવવા માટે કુમગાપાનની વીણી શરૂ કરી દેવી જોઈએ. જરૂરિયાત મુજબ સિંચાઈ આપવી જોઈએ.
અંબા	<ul style="list-style-type: none"> અંબાનાં નાના રોપાની જગ્ઘણી માટે ટેકો આપવાની વ્યવસ્થા કરવી જેથી વરસાદ અને વધુ પવનની ઝડપ સામે ટકી શકે. છટણી બાદ કપાયેલ ડાળી પર બોડેક્સ પેસ્ટ ૧૦ ટકા લગાડવું. અંબા નવી વાડી બનાવવા તંદુરસ્ત અને રોગમુક્ત કલમો અધિકૃત અને સરકારી નર્સરી માંથી મેળવવી જોઈએ. નવી કલમો માટે તૈયાર કરેલ ખાડામાં ૧૦ કિગ્રા. ધાણિયું ખાતર, ૧ કિગ્રા. સિંગલ સુપર સલ્ફેટ અને ૧ કિગ્રા. ઘ્યેરેટ ઓફ પોટાશ ખાતર આપવું. ઉધાઈ અને કીલીનો ઉપદ્રવ કલમોમાં જોવા મળે તો ૫૦ મિલી./૧૦ લી. પાણીમાં કલોરપાયરીફોસ ની માવજત ખાડા પૂરી વાખતે કરી દેવી. અંબામાં મધ્યાના નિયંત્રણ માટે ઈમિડાકલોપિડ ૧૭.૮% ૩ મિલી અથવા થાયોમેથોક્ઝામ ૨૫% ૪ ગ્રા. અથવા લેમડા સાયલેલોશીન ૫ ઈસી ૧૦ મિલી પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં સંપર્સુ ઝાડ ઉપર હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે છંટકાવ કરવો. શ્રિષ્ટાની ડાજરી હોય ત્યારે તેના નિયંત્રણ માટે ટોકેનપાયરાડ ૧૫ ઈસી ૨૦ મિલી/૧૦ લિટર પાણી મુજબ


	<ul style="list-style-type: none"> આડ ઉપર છંટકાવ કરવો. આંભામાં વહેલો મોર લાવવા માટે પોટેશિયમ નાઈસ્ટ્રેટ ૧% (૧ કિગ્રા./૧૦૦ વિટર પાણીમાં) ૧૫ દિવસના આંતરે છંટકાવ કરવો. ભૂકીછારા ના નિયંત્રણ માટે લેઝકોનોઓવેપ ઈસી ૧૦ મિલી અથવા વેટેબલ સલ્ફર ૪૦ ગ્રા. પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિક્સ કરી હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે છંટકાવ કરવો. આંભામાં મોર વહેલા લાવવા માટે વાડીમાં લીમડા સહિતની વિવિધ વનસ્પતિઓનું ધુમાડિયું હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે કરવું.
ચીકુ	<ul style="list-style-type: none"> બીજી ખાતરનો હૃપ્તો ભવામણ કરેલ ખાતરનો ૨૫ ટકા ભાગ પ્રમાણે રસાયનિક ખાતર એમોનિયમ સંદર્ભે ૧.૩ કિગ્રા અથવા યુરિયા ૦.૬ કિગ્રા, સિંગલ સુપર ફ્રેસ્કેટ ૦.૮ કિગ્રા, મ્યુરેટ ઓફ્સ પોટાશ ૦.૩ કિગ્રા, ધાણિયુ ખાતર ૨૫ કિગ્રા આ મહિનામાં હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે આપવું.
પશુપાવન	<ul style="list-style-type: none"> પશુઓને દૂધ ઉત્પાદન અને નિભાવની જરૂરિયાત ધ્યાનમાં લઈ પૂરતા પ્રમાણમાં સમતોલ આહાર આપવો. તેમજ પશુઓના રહેઠાળ ચોખ્ખા રાખવા, દિવસ દરમયાન સમયાંતરે મળ-મૂતર નો નિકાલ કરવો. પશુઓને યોગ્ય આહારમાં જરૂરીયાત પ્રમાણે ખનિજયુક્ત મિશ્રણના સમાવેશ કરવો જોઈએ. ચાફ્ફ કટરથી લીલા તથા સૂક્ષ્મ ઘાસચારાને ટુકડા કરીને જ નીરણ કરવું. દુધાળા પશુઓના આઉને દૂધ દોહન પહેલા અને પછી જીક ઓક્સાઇડ અથવા બોરીક પાઉડર અથવા પોટેશિયમ પરમેગેનેટ ના દ્રાવણથી બચાવર સાફ કરવા. પશુઓનાં ઇંતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથીન અથવા એમીટાઝર ૨ મી.લી./લિટર પાણીમાં નાખને છાંટવી (દ્વારાની બોટલ ઉપર લખેલા સૂચનાનો અમલ કરવો). પશુઓ જયારે ઈચ્છે ત્યારે પાણી પી શકે તેવી વિવસ્થા ઉભી કરવી જોઈએ અથવા ઓછામાં ઓછુ દિવસમાં ચારથી પાંચ વખત જરૂરીયાત મુજબ પાણી પીવડાવવું જોઈએ. ક્રોફ્ટ/ગમાણની ઉચ્ચાઈ ૧૦ ફૂટથી વધારે રાખવી, જેથી હવાની હેચ્ફેર સરળતાથી થઈ શકે, બદ્ધશો/ગરમી ઓછી થાય અને ભોયાતળિયાનો ભાગ સુકો રહે. વિયામણ બાદ ગાય/ભેસના બચાને અડધાથી એક કલાકમાં ખીરું/ચીક પીવડાવની વિવસ્થા કરવી જોઈએ. શિયાળાના હંડા વાતાવરણમાં પશુઓને આરામ/સુવા માટે ઘાસચારા અને પથારીની વિવસ્થા કરવી. ખુબ હંડા પવન અથવા રાત્રી દરમયાન પશુને ગમાણમાં રાખવા.
વનીકરણ	<ul style="list-style-type: none"> પ્રથમ અને બીજી વર્ષના વાવેતરમાં નિદામણ, રોપા પર ચેલેલ વેલાની કાપણી તેમજ રોપાની આસપાસના ભાગમાં સંક્રિ કરવી.
ફીશરીઝ	<ul style="list-style-type: none"> મીઠા પાણીના મન્સ્ય મીઠા પાણીના છંગ ઉત્પાદન કરતા એટૂતોને જણાવવાનું કે, આ સમયગાળા દરમયાન પૂરતી માત્રામાં ખોરાક આપવોકરણ કે આ વાતાવરણ માછલી/મીઠા પાણીના છંગ માટે અનુકૂળ છે. તળાવના તળિયાનું અને સાપાટીનું તાપમાન સરભર કરવા એટેર અથવા પંખ ચવાવવા.

❖ એગ્રોમેટ સલાહકાર સેવા બુલેટીન કમિટીના સભ્યો :

- ડૉ. એચ. એમ. વિરદીયા, પ્રાધ્યાપક અને વડા (સંશોધન)
- ડૉ. જી. જી. પસ્નાગીયા, પ્રાધ્યાપક અને વડા (વનસ્પતિ ક્રીટકશાસ્ત્ર)
- ડૉ. કે. બી. રાખોલીયા, સહ પ્રાધ્યાપક (વનસ્પતિ રોગશાસ્ત્ર) :
- ડૉ. સી. જી. ઈટવાલા, સંશોધન વૈજ્ઞાનિક (શાકભાજી વિજ્ઞાન)
- ડૉ. વાય. એન. ટેલ, સહ પ્રાધ્યાપક (ફળ વિજ્ઞાન)
- ડૉ. વી. આર. પટેલ, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (પશુપાવન)
- ડૉ. એમ. બી. ટેલ, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (વનીકરણ)
- ડૉ. એમ. આર. પટેલ, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (ફીશરીઝ સાયન્સ)
- ડૉ. વિભા. ટાક, રીસર્ચ એસોસિએટ (જી.કે.એમ.એસ.)
- ડૉ. પી. કે. પરમાર, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (કૃપી હવામાનશાસ્ત્ર) અને પ્રિન્સિપાલ નોટલ ઓફિસર (જી.કે.એમ.એસ.)

NOAA/VIIRS/BLENDED NDVI Composite ending on Week no 52
(23.12.2024 to 29.12.2024) over Agricultural region

Gujarat



Agriculture vigour is moderate at few places of the state.

Source: <https://www.star.nesdis.noaa.gov>



NAVSARI AGRICULTURAL UNIVERSITY

Gramin Krishi Mausam Sewa
Agricultural Meteorological Cell
Department of Agricultural Engineering
N. M. College of Agriculture
Navsari Agricultural University
Navsari – 396450, Gujarat
E-mail :- aasnnavsari@gmail.com



(Jointly issued by Navsari Agricultural University & India Meteorological Department)

DATE OF ISSUE: 11/01/2025**Agromet Advisory Bulletin No: 82/2024 - 2025****-- Navsari District --****Weather summary of preceding week (07 January to 10 January - 2025)**

Sr. No.	Name of Weather Parameters	Value
1.	Range of Rainfall (mm)	0.0
2.	Range of Maximum Temperature (°C)	28.4-31.5
3.	Range of Minimum Temperature (°C)	12.5-15.5
4.	Range of Relative Humidity (%)	35-79
5.	Range of Wind Speed (km/hr)	2.6-8.3
6.	Range of Cloud Cover (Okta)	0-0
7.	Range of bright sunshine hours (hrs)	7.1-8.1
8.	Last five days cumulative rainfall (mm)	0.0
Total Rainfall (mm)		0.0

IMD based Weather forecast for (11 January to 15 January - 2025)

Sr. No.	Weathers Parameters	Day - 1 (11/01)	Day - 2 (12/01)	Day - 3 (13/01)	Day - 4 (14/01)	Day - 5 (15/01)
1.	Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
2.	Maximum temperature (°C)	32	31	32	33	32
3.	Minimum Temperature (°C)	16	14	15	17	17
4.	Max. Relative Humidity (%)	85	85	85	90	90
5.	Min. Relative Humidity (%)	60	65	60	60	65
6.	Wind Speed (km/hr.)	8	5	6	10	9
7.	Wind Direction (Compass point)	85	65	28	17	28
8.	Total Cloud Cover (Okta)	0	2	0	0	2

According to the extended range forecast, rainfall is expected to be above normal and maximum temperatures are expected to be normal and minimum temperatures are expected to be above normal till January 21, 2025.

Weather Summary/ Alert	<ul style="list-style-type: none"> As per the forecast issued by India Meteorological Department over the next five days, the sky will be clear and there are chances of no rainfall. The Maximum temperature is 31 °C to 33 °C, when the Minimum temperature is 14 °C to 17 °C likely to be around. The humidity in the air is likely to be between 60 and 90 percent. The wind direction will be North-East with an average speed of 5 to 10 km/h.
-----------------------------------	--

-:: South Gujarat Heavy Rainfall Zone ::-

General Advisory	<ul style="list-style-type: none"> • Farmers are advised to monitor the standing crop regularly for pest disease incidence and use the suitable recommended control measures. • Provide shade to newly planted/young plants of mango and apply mulch around the stem. • Farmers are advised to do the spraying chemical and fertilizer application activity as per the weather condition • Download the MEGHDOOT mobile application for Agromet Advisory Services and information on weather forecasting, which will provide weather based agricultural advice to farmers for their location, crops and livestock in their local language. Click on the following link to download the MEGHDOOT application: Android users: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot IOS users: https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155
Crop	Weather based Agro-Advisory
Sugarcane	<ul style="list-style-type: none"> • In seed plot add Nitrogen (50 kg/ha.) Before one month of seed cutting. <p>Land preparation for new planting/Germination/ Vegetative Stage</p> <ul style="list-style-type: none"> • New plantation of sugarcane crop should be done after proper preparation of land at proper moisture condition. Deep plough and level the soil. • Planting should be done from October to February. • Apply FYM/ Compost at the time of ploughing. Select healthy, diseases-insect free and immature seed materials of your selected variety. • Apply fertilizer application for plant Crop 250-125-125 kg NPK/ha. Basal dose (At time of planting) : DAP : 271 kg/ha or SSP : 782 kg/ha, MOP : 208 kg/ha. and Urea : When use SSP as basal dose than 81 kg/ha. • Apply split dose of Nitrogen fertilizer as per recommendation- 1st Split (At 1.5 to 2 months after planting) Urea : 163 kg/ha, 2nd split dose Urea 109 kg/ha at 3-3.5 month after planting, 3rd dose urea 190 kg/ha at 5 - 5.5 months after planting (before final earthing up). • Planting should be done at the spacing of 90 to 120 cm. 2 budded setts should be used with end to end method of planting after setts treatment with fungicide (<i>Carbendazim 50 wp @ 1g/1 lit. water</i>). If settling use intra row spacing should be 45 to 60 cm. • Within 3 days after planting and irrigation, spraying of <i>Atrazine 50 WP 80 g/10 li. water</i>. Pre-emergence weedicide should be applied to control weeds in clear weather conditions. • Application of <i>Trichoderma viride</i> in rich sugarcane pressmed @ 8 ton/ha at time of planting. • As per soil/climatic condition and stage of crop irrigation apply- summer at 15-17 day interval or adopt drip method of irrigation and mulching of trash in between two rows of crop to save irrigation water. • Keep crop weed free upto 4 months of planting by interculturing, hand weeding or apply post emergence weedicide like 2,4-D Na Salt (1.2 kg ai/ha)+ <i>Paraquat</i> (0.600 kg ai/ha) or 2,4-D (Na Salt, 30 g/10 lit. water)+ <i>Paraquat</i> (50 g/10 lit.) after 30-60 DAP. • Earthing up should be done at 3-3.5 and 5.5-6 months after planting.
Rabi Pulse	<p>Vegetative growth stage :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Weeding should be done as per need or apply recommended weedicide.

crop	<ul style="list-style-type: none"> Apply irrigation as per soil and climatic condition. For management of pod borer in chickpea, apply <i>Emamectin benzoate</i> 1.9 EC @ 7.5 ml./10 lit. water. Spray <i>Chlorantraniliprole</i> 18.5 SC @ 3.0 ml or <i>Flubendiamide</i> 20 WG @ 5 g or <i>Indoxocarb</i> 14.5 SC @ 8 ml. or <i>Lufenuran</i> 5.4 EC @ 12 ml. per 10 lit. of water for management of Pigeonpea pod borer.
Okra	<ul style="list-style-type: none"> Weeding and intercultural operations should be carried out. Irrigation should be given as per requirement. Spraying of Hexaconazole 5 EC @ 10 ml or Carbendazim 50 WP 5 g per 10 Lit of water for control of powdery mildew/leaf spot disease under clear weather condition. 40 pheromone trap of okra fruit and shoot borer should be kept per hectare. Up root and burn yellow vein mosaic infected okra plant from field. Spraying systemic insecticides for whitefly (vector) management. Spraying of <i>Propargite</i> 57 EC @ 20 ml/10 Lit. or <i>Fenazaquin</i> 10 EC @ 10 ml./10 Lit. of water for red Spider Mite during clear weather condition.
Brinjal	<ul style="list-style-type: none"> Irrigation should be given as per requirement. 40 pheromone trap of brinjal fruit and shoot borer should be kept per hectare after 20 days of transplanting. Spraying of <i>Propargite</i> 57 EC @ 20 ml./10 Lit. or <i>Fenazaquin</i> 10 EC @ 10 ml./10 Lit. of water for red Spider Mite during clear weather condition.
Tomato	<ul style="list-style-type: none"> Weeding and intercultural operations should be carried out. 40 pheromone traps of <i>Spodoptera</i> and <i>Helicoverpa</i> should be kept per hectare after 20 days of transplanting. For management of leaf spot disease, spray <i>Mancozeb</i> 75 WP @ 28 g/10 lit. of water under clear weather condition.
Chilli	<ul style="list-style-type: none"> Weeding and intercultural operations should be carried out. For management of thrips spray crop with <i>Acetamiprid</i> 20 SP @ 2g or <i>Broflanilide</i> 20 SC @ 2.5 ml or <i>Cyantraniliprole</i> 10.26 OD @ 12 ml or <i>Ethion</i> 50 EC @ 30ml or <i>Isocycloseram</i> 9.2 DC @ 12 ml or <i>Fipronil</i> 5 SC @ 15 ml per 10 liter of water under clear weather condition. Spraying of <i>Propargite</i> 57 EC @ 20 ml./10 Lit. or <i>Fenazaquin</i> 10 EC @ 10 ml./10 Lit. of water for red Spider Mite during clear weather condition. Spraying of Carbendazim 50 WP 10 g/10 Lit of water for control of fruit rot disease under clear weather condition.
Pointed gourd	<ul style="list-style-type: none"> Harvesting should be carried out as per maturity. Irrigation should be applied as per requirement in 15 to 20 days interval in January.
Little gourd	<ul style="list-style-type: none"> Harvesting should be carried out as per maturity. Irrigation should be applied as per requirement in 15 to 20 days interval in January.
Elephant foot yam	<ul style="list-style-type: none"> Harvesting should be carried out as per maturity.
Greater yam	<ul style="list-style-type: none"> Harvesting should be carried out as per maturity.
Tannia	<ul style="list-style-type: none"> Harvest the tender leaves of Tannia for making "paatra". Irrigation should be given as per requirement.
Mango	<p>General Advise :</p> <ul style="list-style-type: none"> Provide support to the young plants of mango to protect against rain and high wind speed. Application of 10 % Bordeaux paste in cut after pruning branches of fruit tree. Procure healthy and disease free planting material from authorized and government nursery for the new plantation. Prepare pit for plantation of new grafts by filling 10 kg FYM, 1 kg SSP and 1 kg MOP. Give 50 ml/10 lit. water Chlorpyriphos to manage termite and ants. Spray <i>Imidacloprid</i> 17.8 % 3 ml. or <i>Thiamethoxam</i> 25 % 4 g or <i>Lambda-Cyhalothrin</i> 5 EC @ 10 ml. per 10 lit. water on mango tree for control of mango hopper and mango shoot borer during clear weather condition. Spraying of <i>Tolfenpyrad</i> 15 EC @ 20 ml./10 lit. water for thrips management, if observed. Spray KNO_3 1% (1 kg/100 Lit. water) in evening cool hours to get early flowering at 15 days interval.


	<ul style="list-style-type: none"> • Spraying of Hexaconazole 5 EC @ 10 ml. or Wettable sulphur @ 40 g. per 10 lit. for control of powdery mildew in clear weather condition. • Do smudging with some neem based and other botanicals to get early flowering in mango during clear weather condition.
Sapota	General Advise : <ul style="list-style-type: none"> • Apply second split of 25% of RDF (Ammonium Sulphate -1.3 kg or Urea 0.6 kg, SSP 0.8 kg and MOP 0.3 kg + FYM 25 kg each tree) in clear weather condition.
Livestock	<ul style="list-style-type: none"> • Provide adequate quantity of balanced ration by considering the milk production and maintenance. • Good quality dry roughage with 15-20 kg green fodder provided to the animals, only after chaffing. • Feed silage & hay materials if available. • Before and after milking udder must be properly clean with zinc oxide or boric powder or potassium permanganate solutions. • For the control of tick and other parasites, spray <i>Deltemethrin</i> or <i>Aemitaz</i> 2 ml in 1 liter of water. • Height of animal shed should keep minimum 10 feet for aeration to maintain the floor dry and to control humidity. • After calving, the young cattle/Buffalo should get colostrums within half to one hour. • Provide bedding material in cold climatic condition.
Forestry	<ul style="list-style-type: none"> • Weeding climber cutting and cleaning should be carried out in first and second year plantations.
Fisheries	<ul style="list-style-type: none"> • Fresh water farmers give proper feed in fish/prawn farming for better growth rate because environment condition is very suitable. • Increase water depth and maintain water level through pond outlet. • Mixing the top and bottom water by using the aerators or pumps.

❖ **Members of Agro-Advisory Committee :**

- Dr. H. M. Viradia, Professor & Head (Agronomy)
- Dr. J. J. Pastagia, Professor & Head (Entomology)
- Dr. K. B. Rakholiya, Associate Professor (Plant Pathology):
- Dr. C. G. Intwala, Research Scientist (Vegetable Science)
- Dr. Y. N. Tandel, Associate Professor (Fruit Science)
- Dr. V. R. Patel, Assistant Professor (Animal Husbandry)
- Dr. M. B. Tandel, Assistant Professor (Forestry) & I/C Head (SAF) (Forestry)
- Dr. M. R. Patel, Assistant Professor (Fisheries Science)
- Dr. Vibha Tak, Research Associate(GKMS)
- Dr. P. K. Parmar, Assistant Professor (Agricultural Meteorology and Principal Nodal Officer (GKMS))

NOAA/VIIRS/BLENDED NDVI Composite ending on Week no 52
(23.12.2024 to 29.12.2024) over Agricultural region

Gujarat



Agriculture vigour is moderate at few places of the state.

હવામાન આગાહી

વિગત	તારીખ	ડાંગ	નવસારી	વલસાડ
વરસાદની શ્રેણી (મી.મી.)	૧૧/૦૧/૨૦૨૫	૦	૦	૦
	૧૨/૦૧/૨૦૨૫	૦	૦	૦
	૧૩/૦૧/૨૦૨૫	૦	૦	૦
	૧૪/૦૧/૨૦૨૫	૦	૦	૦
	૧૫/૦૧/૨૦૨૫	૦	૦	૦
મહનમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૧૧/૦૧/૨૦૨૫	૩૨	૩૨	૩૨
	૧૨/૦૧/૨૦૨૫	૩૨	૩૧	૩૧
	૧૩/૦૧/૨૦૨૫	૩૩	૩૨	૩૨
	૧૪/૦૧/૨૦૨૫	૩૩	૩૩	૩૩
	૧૫/૦૧/૨૦૨૫	૩૩	૩૨	૩૨
લધુનમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૧૧/૦૧/૨૦૨૫	૧૩	૧૬	૧૬
	૧૨/૦૧/૨૦૨૫	૧૪	૧૪	૧૪
	૧૩/૦૧/૨૦૨૫	૧૬	૧૫	૧૫
	૧૪/૦૧/૨૦૨૫	૧૬	૧૭	૧૭
	૧૫/૦૧/૨૦૨૫	૧૬	૧૭	૧૭
મહનમ ભેજ (%)	૧૧/૦૧/૨૦૨૫	૮૫	૮૫	૮૫
	૧૨/૦૧/૨૦૨૫	૮૫	૮૫	૮૫
	૧૩/૦૧/૨૦૨૫	૯૦	૮૫	૮૫
	૧૪/૦૧/૨૦૨૫	૯૦	૯૦	૯૦
	૧૫/૦૧/૨૦૨૫	૮૫	૯૦	૯૦
લધુનમ ભેજ (%)	૧૧/૦૧/૨૦૨૫	૪૫	૫૦	૫૦
	૧૨/૦૧/૨૦૨૫	૪૫	૫૫	૫૫
	૧૩/૦૧/૨૦૨૫	૫૦	૫૦	૫૦
	૧૪/૦૧/૨૦૨૫	૫૦	૫૦	૫૦
	૧૫/૦૧/૨૦૨૫	૫૦	૫૫	૫૫
પવનની ગતિ(કિ.મી./કલાક)	૧૧/૦૧/૨૦૨૫	૮	૮	૮
	૧૨/૦૧/૨૦૨૫	૮	૫	૭
	૧૩/૦૧/૨૦૨૫	૪	૬	૭
	૧૪/૦૧/૨૦૨૫	૨	૧૦	૮
	૧૫/૦૧/૨૦૨૫	૬	૮	૮
પવનની દિશા (ક્રમપાસ પોઈન્ટ)	૧૧/૦૧/૨૦૨૫	SE	E	E
	૧૨/૦૧/૨૦૨૫	SE	NE	E
	૧૩/૦૧/૨૦૨૫	SE	NE	NE
	૧૪/૦૧/૨૦૨૫	E	NE	NE
	૧૫/૦૧/૨૦૨૫	E	NE	NE
વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટો)	૧૧/૦૧/૨૦૨૫	૦	૦	૦
	૧૨/૦૧/૨૦૨૫	૨	૨	૨
	૧૩/૦૧/૨૦૨૫	૦	૦	૦
	૧૪/૦૧/૨૦૨૫	૦	૦	૦
	૧૫/૦૧/૨૦૨૫	૨	૨	૨