



નવસારી કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલય

ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા

કૃષિ હવામાનશાસ્ત્ર સેલ
કૃષિ ઈજનેરી વિભાગ, ન. મ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય
નવસારી કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલય
નવસારી - ૩૮૬૪૫૦, ગુજરાત
ઇ-મેઇલ:- aasnavsari@gmail.com



ભારત મૌસમ વિજ્ઞાન
વિભાગ

(નવસારી કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલય અને ભારત મૌસમ વિજ્ઞાન વિભાગ દ્વારા પ્રસારિત)

તા. ૨૬/૧૧/૨૦૨૪

કૃષિ હવામાન બુલેટીન નં : ૬૯/૨૦૨૪ - ૨૦૨૫

-- નવસારી જિલ્લો --

પાછળનાં સમયનું હવામાન (તા. ૨૨ નવેમ્બર થી ૨૬ નવેમ્બર - ૨૦૨૪)

| અનુ. નં. | હવામાન પરિબલો | Value |
|-----------|--|-----------|
| ૧. | વરસાદની શ્રેણી (મી.મી.) | ૦.૦ |
| ૨. | મહત્તમ તાપમાનની શ્રેણી (સે.ગ્રે.) | ૩૧.૦-૩૩.૦ |
| ૩. | લઘુત્તમ તાપમાનની શ્રેણી (સે.ગ્રે.) | ૧૫.૦-૧૮.૧ |
| ૪. | ભેજની શ્રેણી (%) | ૩૭-૬૦ |
| ૫. | પવનની ગતિની શ્રેણી (કિ.મી./કલાક) | ૧.૨-૩.૫ |
| ૬. | વાદળની સ્થિતિની શ્રેણી (ઓક્ટા) | ૦-૦ |
| ૭. | સુર્યપ્રકાશિત સમયની શ્રેણી (કલાક) | ૫.૭-૭.૨ |
| ૮. | પાછળના પાંચ દિવસમાં સંચિત વરસાદ (મી.મી.) | ૦.૦ |
| કુલ વરસાદ | | ૨૩૯૪.૦ |

આઈ. એમ. ડી. દ્વારા પ્રાપ્ત હવામાન આગાહી (તા. ૨૭ નવેમ્બર થી ૦૧ ડિસેમ્બર - ૨૦૨૪)

| અનુ. નં. | હવામાન પરિબલો | દિવસ-૧ (૨૭/૧૧) | દિવસ-૨ (૨૮/૧૧) | દિવસ-૩ (૨૯/૧૧) | દિવસ-૪ (૩૦/૧૧) | દિવસ-૫ (૦૧/૧૨) |
|----------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ૧. | વરસાદ (મી.મી.) | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ | ૦ |
| ૨. | મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.) | ૩૨ | ૩૧ | ૩૦ | ૩૦ | ૩૦ |
| ૩. | લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.) | ૨૦ | ૨૦ | ૧૯ | ૧૯ | ૨૦ |
| ૪. | મહત્તમ ભેજ (%) | ૫૦ | ૫૦ | ૫૦ | ૫૫ | ૫૫ |
| ૫. | લઘુત્તમ ભેજ (%) | ૩૫ | ૩૫ | ૩૫ | ૩૫ | ૪૦ |
| ૬. | પવનની ગતિ (કિ.મી./કલાક) | ૧૧ | ૧૧ | ૧૨ | ૧૩ | ૧૨ |
| ૭. | પવનની દિશા (કમ્પાસ પોઇન્ટ) | ૭૪ | ૬૬ | ૬૭ | ૬૫ | ૬૦ |
| ૮. | વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટા) | ૨ | ૨ | ૨ | ૦ | ૦ |

હવામાન સારાંશ / ચેતવણી

- આઈ. એમ. ડી. , દ્વારા મળેલી હવામાનની આગાહી મુજબ આગામી પાંચ દિવસમાં આકાશ ચોખ્ખું રહેશે અને વરસાદ પડવાની સંભાવના નથી.
- મહત્તમ તાપમાન ૩૦ સે. થી ૩૨ સે. જ્યારે લઘુત્તમ તાપમાન ૧૯ સે. થી ૨૦ સે. આસપાસ હોવાની સંભાવના છે.
- હવામાં ભેજનું પ્રમાણ ૩૫ થી ૫૫ ટકા વચ્ચે રહેવાની સંભાવના છે.
- પવનની દિશા ઉત્તર-પૂર્વીય રહેશે જેની સરેરાશ ગતિ ૧૧ થી ૧૩ કિ.મી./કલાક રહેવાની શક્યતા છે.
- વિસ્તૃત શ્રેણીની આગાહી મુજબ , ૦૭ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૪ સુધી સામાન્ય થી ઉપર વરસાદ અને મહત્તમ તાપમાન સામાન્યથી નીચે અને લઘુત્તમ તાપમાન સામાન્ય રહેવાની ધારણા છે.

-:: દક્ષિણ ગુજરાત ભારે વરસાદ વિસ્તાર ::-

| | |
|--|--|
| <p>સામાન્ય સલાહ</p> | <ul style="list-style-type: none"> જો પવનની ગતિ ૧૫ કિમી પ્રતિ કલાક કરતાં વધુ હોય તો ખેતરમાં કેમિકલ જેવાકે પેસ્ટિસાઈડ નો છંટકાવ ન કરવો. આગામી શિયાળુ પાકોની વાવણી માટે ખેત આયોજન કરવું. વાવણી માટે સારી ગુણવત્તાવાળું પ્રમાણિત બિયારણ, ખાતર અને દવાનો જથ્થો મેળવી લેવો. ઉભા પાકોમાં રોગ-જીવાતના ઉપદ્રવનું નિયમિત નિરીક્ષણ કરી ભલામણ મુજબના પાક સંરક્ષણના પગલા લેવા. ઊભા પાકોમાં ભલામણ મુજબના ખાતરો તથા જરૂરિયાત મુજબ પિયત આપવું . આકાશ ચોખ્ખું હોય તથા પવનની ગતિ ઓછી રહે ત્યારે જંતુનાશક તથા ફૂગનાશક દવાની જોડે ડીટરજન્ટ પાઉડર અથવા સ્ટીકર (ગુંદરીય)નો ઉપયોગ કરીને છંટકાવ કરવો. કેરીના નવા વાવેલા/યુવાન છોડને છાંયો આપો અને દાંડીની આસપાસ લીલા ઘાસ નાખો. કૃષિ હવામાન સલાહકારી બુલેટીન અને હવામાનની આગાહી અંગેની માહિતી મેળવવાં માટે ડાઉનલોડ કરો મેઘદૂત મોબાઈલ એપ્લિકેશન, જે ખેડુનો તેમની સ્થાનિક ભાષામાં સ્થાન, પાક અને પશુધન વિશે હવામાનઆધારિત કૃષિ સલાહ પ્રદાન કરશે. મેઘદૂત એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો: <p>એન્ડ્રોઈડ યુઝર્સ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot</p> <p>આઈ.ઓ.એસ. યુઝર્સ: https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155</p> <ul style="list-style-type: none"> દામિની મોબાઈલ એપ્લિકેશન દ્વારા આકાશીય વિજળીની અગાઉથી ચેતવણી આપવામાં આવે છે તેમજ આકાશીય વિજળીથી બચવા શું કરવું અને શું નહિ કરવું તેની વિગતવાર માહિતી પૂરી પાડવામાં આવે છે . આથી ખેડુતમિત્રોને દામિની મોબાઈલ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે . દામિની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો: એન્ડ્રોઈડ યુઝર્સ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightening.live.damini <p>આઈ.ઓ.એસ. યુઝર્સ: https://apps.apple.com/app/id1502385645</p> |
| <p style="font-size: small;">NOAA/VHRS/BIENED NDVI Composite ending on Week no 46 (11.11.2024 to 17.11.2024) over Agricultural region Gujarat</p> <p style="font-size: x-small;">Agriculture vigour is good at isolated places of the state.</p> | |
| પાક | હવામાન આધારિત કૃષિ સલાહ |
| <p>શેરડી</p> | <ul style="list-style-type: none"> શેરડીની રોપણી માટે બીજ પ્લોટ બનાવેલ હોય તો બીજ માટે શેરડી કાપવાની હોય તેના એક માસ પહેલા ૫૦ કિગ્રા / હે. નાઈટ્રોજન ખાતર આપવું. નવી રોપણી માટે જમીન તૈયારી: શેરડીની નવી રોપણી માટે યોગ્ય ભેજની પરિસ્થિતિમાં જમીન તૈયાર કરવી. શેરડીની રોપણી ઓક્ટોબર-ફેબ્રુઆરી માસ દરમ્યાન કરવી. ખેડ વખતે ખાતર/કમ્પોસ્ટ જમીનમાં ભેળવવું. રોપણી પહેલા પાયાનું ખાતર આપવું. રોપણી માટે કુમળૂ અને તંદુરસ્ત તમારી પસંદગીની જાતનું બિયારણ વાપરવું. રોપણી માટે બે લાઈન વચ્ચે ૮૦ થી ૧૨૦ સેમી. અંતર રાખી બે આંખના કટકાને બીજમાવજત આપી (કાર્બો-ડાઈમ ૫૦ ડબલ્યુ પી ૧ ગ્રા./૧ લીટર પાણી) એક પછી એક કટકા ચાસમાં રહે તે રીતે રોપણી કરવી. એક આંખના રોપનું વાવેતર કરવાનું હોય તો લાઈનમાં બે રોપા વચ્ચે ૪૫ થી ૬૦ સેમી. અંતર રાખી રોપણી કરવી. રોપણી બાદ પિયત આપી ૩ દિવસમાં એટ્રાઝીન ૫૦ ડબલ્યુ પી પ્રી ઈમરજન્સ ૮૦ ગ્રામ./૧૦ લી. પાણી નીંદણનાશક નો છંટકાવ હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે કરવો. રોપણી સમયે શેરડીમાં ટ્રાઈકોડર્મા વિરાઈડનો ઉપયોગ કરવો. |
| <p>શીયાળુ કઠોળ</p> | <p>જમીન તૈયારી/વાવણી :</p> <ul style="list-style-type: none"> શીયાળુ કઠોળના વાવેતર માટે ચોમાસુ પાક કાપ્યા બાદ યોગ્ય ભેજ સમયે જમીન તૈયાર કરવી. શીયાળુ કઠોળના જેવા કે વાલલ પાપડીલ ચણાલ મગ (સીઓ -૪) ની વાવણી યોગ્ય સમયે કરવીઈ જરૂરી બિયારણની સુધારેલ જાત મેળવી લેવી. પાયાનું ભલામણ મુજબ ખાતર આપવું. પાક નીંદણ મુક્ત રાખવું. આ માટે જરૂરી જણાય તો વાવણી બાદ તૂરંત ભલામણ મુજબની નિંદણનાશક દવાનો જમીન ઉપર છંટકાવ કરવો. જરૂરિયાત મુજબ પીયત આપવું. બીજ માવજત થાયરમ ૩ ગ્રા./ કિગ્રા. + રાયઝોબીયમ ૧૦ મિ.લી./કિગ્રા. બીજ થી આપવું. |

| | |
|---------|---|
| ભીંડા | <ul style="list-style-type: none"> કુમળા અને વેચાણ લાયક ફળોની વીણી કરતા રેલવું. રોગ-જીવાતવાળા અને બગડેલા ફળો દૂર કરવા જોઈએ. પ્લોટમાંથી નિંદામણ દૂર કરવું. ભીંડામાં ભૂકીછારા અને પાનના ટપકના નિયંત્રણ માટે હેક્સાકોનાઝોલ ૫ ઈસી ૧૦ મિલી. અથવા કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ ડબલ્યુપી ૫ ગ્રા પ્રતિ ૧૦ લી. પાણીમાં મીશ્ર કરી હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે છંટકાવ કરવો. ખેતરમાંથી પીળી નસના વિષાણુ જન્ય છોડ ને ઉપાડી નાશ કરો. રોગનો ફેલાવો સફેદ માખીથી થાતો હોય, શોષક પ્રકારની જંતુ નાશક દવાનો છંટકાવ કરવો. ભીંડામાં પાન કથીરીના નિયંત્રણ માટે પ્રોપર્ગાઈટ ૫૭ ઈસી ૨૦ મિલી./૧૦ લીટર અથવા ફેનાઝાકવીન ૧૦ ઈસી ૧૦ મિલી./૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી પાક ઉપર છંટકાવ હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે કરવો. |
| રીંગણ | <ul style="list-style-type: none"> ધરૂ ૨૮-૩૦ દિવસનું થાય ત્યારે ફેરોપાણી કરી દેવી. દર બે દિવસ બાદ પાણીના ટુવા આપવા. ફેરોપાણીના ૨૦ દિવસ બાદ હેક્ટરે ૪૦ રીંગણની ફળ અને ડુખ ની ઇયળના ફેરોમોન સાથેના ટ્રેપ મુકવા. રીંગણમાં પાન કથીરીના નિયંત્રણ માટે પ્રોપર્ગાઈટ ૫૭ ઈસી ૨૦ મિલી./૧૦ લીટર અથવા ફેનાઝાકવીન ૧૦ ઈસી ૧૦ મિલી./૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી પાક ઉપર છંટકાવ હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે કરવો. |
| ટામેટા | <ul style="list-style-type: none"> ૨૫-૩૦ દિવસનું ધરૂ થાય ત્યારે ફેરોપાણી કરવી. દર બે દિવસ બાદ પાણીના ટુવા આપવા. ફેરોપાણીના ૨૦ દિવસ બાદ હેક્ટરે ૪૦ લસકરી ઇયળ તથા ટમેટાની ફળ કોરી ખાનાર ઇયળના ફેરોમોન સાથેના ટ્રેપ મુકવા. ટામેટામાં પાનના ટપકના નિયંત્રણ માટે મેંકોજેબ ૭૫ ડબલ્યુપી ૨૮ ગ્રા પ્રતિ ૧૦ લી. પાણીમાં મીશ્ર કરી હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે છંટકાવ કરવો. |
| મરચી | <ul style="list-style-type: none"> ૩૫ થી ૪૦ દિવસે ધરૂ રોપવા લાયક બને છે એટલે કે ફેરોપાણી કરી દેવી. દર બે દિવસ બાદ પાણીના ટુવા આપવા. મરચીમાં શિપ્સના નિયંત્રણ માટે એસીટામીપ્રિડ ૨૦ એસ પી ૨ ગ્રામ અથવા બ્રોંફલાનીલીડ ૨૦ એસ સી ૨.૫ મિલી અથવા સાયઅએન્ટ્રાની લિપ્રોલ ૧૦.૨૬ ઓડી ૧૨ મિલી અથવા ઈથિઓન ૫૦ થી ૩૦ મિલી અથવા ફીપ્રોનીલ ૫ એસ સી આઈસોસાઈકલોસીરમ ૮.૨ ઓડી ૧૫ મિલી પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી પાક ઉપર હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે છંટકાવ કરવો હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે. મરચીમાં પાન કથીરીના નિયંત્રણ માટે પ્રોપર્ગાઈટ ૫૭ ઈસી ૨૦ મિલી./૧૦ લીટર અથવા ફેનાઝાકવીન ૧૦ ઈસી ૧૦ મિલી./૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી પાક ઉપર હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે છંટકાવ કરવો. મરચીમાં ફળનો સડોના નિયંત્રણ માટે કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ ડબલ્યુપી ૧૦ ગ્રા પ્રતિ ૧૦ લી. પાણીમાં મીશ્ર કરી હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે છંટકાવ કરવો. |
| ચોળી | <ul style="list-style-type: none"> ચોળીના પાકમાં નિંદામણ કરી પ્લોટ ચોખ્ખો રાખવો અને ચોળીની વીણી કરતા રેલવું. |
| પરવળ | <ul style="list-style-type: none"> પરવળના મંડપમાંથી સુકાયેલા વેલા દૂર કરવા તથા વધારાના પીલા કાપી દૂર કરવા. ખાલા પડેલ હોય તો નવા રોપ રોપવા. પરવળના ખામણાં ગોડી, ખાતર અને પાણી આપવું. |
| ટિંડોળા | <ul style="list-style-type: none"> ટિંડોળાનાં મંડપમાંથી સુકાયેલા વેલા દૂર કરવા તથા વધારાના પીલા કાપી દૂર કરવા. ખાલા પડેલ હોય તો નવા રોપ રોપવા. ટિંડોળાનાં ખામણાં ગોડી, ખાતર અને પાણી આપવું. |
| સુરણ | <ul style="list-style-type: none"> નિંદામણ દૂર કરી પ્લોટ ચોખ્ખો રાખવો. ખામણે ગોડ કરવી. પિયતની ખેંચ જણાય તો પિયત આપવું. |
| રતાળુ | <ul style="list-style-type: none"> નિંદામણ દૂર કરી પ્લોટ ચોખ્ખો રાખવો. વેલાની પ્રશાખાઓને ટેકા પર ચઢાવવી. |
| તાનિયા | <ul style="list-style-type: none"> નિંદામણ દૂર કરી પ્લોટ ચોખ્ખો રાખવો. કુમળા પાનની વીણી વીણી કરતા રેલવું. |
| આંબા | <ul style="list-style-type: none"> આંબાના મેઢની ઈયળો થડમાંથી શોધીને મારી નાખો અને કાણાંની અંદર ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦ ઈસી ૨૫ મી.લી./૧૦ લી. દ્રાવણ નાંખી કાઢવથી કાણાં બંધ કરી દેવા. આંબાનાં નાના રોપાની જાળવણી માટે ટેકો આપવાની વ્યવસ્થા કરવી જેથી વરસાદ અને વધુ પવનની ઝડપ સામે ટકી શકે. છટણી બાદ કપાયેલ ડાળી પર બોડેક્સ પેસ્ટ ૧૦ ટકા લગાડવું. આંબા નવી વાડી બનાવવા તંદુરસ્ત અને રોગમુક્ત કલમો અધિકૃત અને સરકારી નર્સરી માંથી મેળવવી જોઈએ. નવી કલમો માટે તૈયાર કરેલ ખાડામાં ૧૦ કિગ્રા. છાણિયું ખાતર , ૧ કિગ્રા. સિંગલ સુપર સફેટ અને ૧ કિગ્રા. મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ ખાતર આપવું. ઉધઈ અને કીડીનો ઉપદ્રવ કલમોમાં જોવા મળે તો ૫૦ મિલી ./૧૦ લી. પાણીમાં ક્લોરપાયરીફોસ ની માવજત ખાડા પૂરતી વખતે કરી દેવી. આંબાવાડીમાં પુખ્ત ઝાડ દિઠ ૧૦૦ કિગ્રા. છાણિયું ખાતર, ૮૦૦ ગ્રામ યુરિયા અથવા ૧.૮ કિગ્રા. અમોનિયમ |

| | |
|---------|---|
| | <p>સલ્ફેટ ૧.૦ કિગ્રા. સિંગલ સુપર સલ્ફેટ અને ૧.૩ કિગ્રા. મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ ખાતર ચોમાસામાં આપવું.</p> <ul style="list-style-type: none"> આંબામાં મધિયાના નિયંત્રણ માટે ઈમિડાક્લોપ્રિડ ૧૭.૮% ૩ મિલી અથવા થાયોમેથોક્ઝામ ૨૫% ૪ ગ્રા. અથવા બુપ્રોફેઝિન ૨૫ ઈસી ૨૦ મીલી અથવા લેમડા સાયહેલોગ્રીન ૫ ઈસી ૧૦ મીલી પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં સંપૂર્ણ ઝાડ ઉપર હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે છંટકાવ કરવો. ગ્રિપ્સની હાજરી હોય ત્યારે તેના નિયંત્રણ માટે ટોલફેનપાયરાડ ૧૫ ઈસી ૨૦ મીલી/૧૦ લિટર પાણી મુજબ ઝાડ ઉપર છંટકાવ કરવો. આંબાવાડીયામાં રાસાયણિક ખાતર આપ્યાના ૧૫ દિવસ પહેલા અથવા પછી બાયોફિટિવાઈઝર જેવા કે એઝોટોબેક્ટર, ૫૦ મિલી., ફોસ્ફેટ સોલ્યુબિલિઝિંગ બેક્ટેરિયા ૫૦ મિલી., પોટાશ મોબિલિઝિંગ બેક્ટેરિયા ૫૦ મિલી. અને ટ્રાયકોડર્મા ૫૦ ગ્રામ. પ્રતિ ઝાડ આપવું. આંબામાં વહેલો મોર લાવવા માટે પોટેશિયમ નાઈટ્રેટ ૧% (૧ કિગ્રા./૧૦૦ લિટર પાણીમાં) ૧૫ દિવસના આંતરે છંટકાવ કરવો. ભૂકીછારા ના નિયંત્રણ માટે લેક્કોનોઝોલ ૫ ઈસી ૧૦ મિલી અથવા વેટેબલ સલ્ફર ૪૦ ગ્રા. પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિક્સ કરી હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે છંટકાવ કરવો. આંબામાં મોર વહેલા લાવવા માટે વાડીમાં લીમડા સહિતની વિવિધ વનસ્પતિઓનું ધુમાડિયું હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે કરવું. |
| રીકુ | <ul style="list-style-type: none"> બીજા ખાતરનો હુપ્તો ભલામણ કરેલ ખાતરનો ૨૫ ટકા ભાગ પ્રમાણે રાસાયણિક ખાતર એમોનિયમ સલ્ફેટ ૧.૩ કિગ્રા અથવા યુરિયા ૦.૬ કિગ્રા, સિંગલ સુપર ફોસ્ફેટ ૦.૮ કિગ્રા, મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ ૦.૩ કિગ્રા, છાણિયુ ખાતર ૨૫ કિગ્રા આ મહિનામાં હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે આપવું. |
| પશુપાલન | <ul style="list-style-type: none"> પશુઓને દૂધ ઉત્પાદન અને નિભાવની જરૂરિયાત ધ્યાનમાં લઈ પૂરતા પ્રમાણમાં સમતોલ આહાર આપવો તેમજ પશુઓના રહેઠાણ ચોખ્ખા રાખવા, દિવસ દરમિયાન સમયાંતરે મળ-મૂતર નો નિકાલ કરવો. પશુઓને યોગ્ય આહારમાં જરૂરીયાત પ્રમાણે ખનિજયુક્ત મિશ્રણના સમાવેશ કરવો જોઈએ. ચાક કટરથી લીલા તથા સૂકા ઘાસચારાને ટુકડા કરીને જ નીરણ કરવું. દૂધાણા પશુઓના આઉને દૂધ દોહન પહેલા અને પછી ઝીંક ઓક્સાઈડ અથવા બોરીક પાઉડર અથવા પોટેશીયમ પરમેગેનેટ ના ટ્રાવણથી બરાબર સાફ કરવા. પશુઓનાં ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથીન અથવા એમીટાઝર ૨ મી.લી./લિટર પાણીમાં નાખને છાંટવી (દવાની બોટલ ઉપર લખેલી સૂચનાનો અમલ કરવો). પશુઓ જ્યારે ઈચ્છે ત્યારે પાણી પી શકે તેવી વ્યવસ્થા ઉભી કરવી જોઈએ અથવા ઓછામાં ઓછુ દિવસમાં ચારથી પાંચ વખત જરૂરીયાત મુજબ પાણી પીવડાવવું જોઈએ. કોઢ/ગમાણની ઉચાઈ ૧૦ ફૂટથી વધારે રાખવી, જેથી હવાની હેરફેર સરળતાથી થઈ શકે, બફારો/ગરમી ઓછી થાય અને ભોયાતગિયાનો ભાગ સુકો રહે. |
| વનીકરણ | <ul style="list-style-type: none"> પ્રથમ અને બીજા વર્ષના વાવેતરમાં નિંદામણ, રોપા પર ચઢેલા વેલાની કાપણી તેમજ રોપાની આસપાસના ભાગમાં સફાઈ કરવી. |
| ફીશરીઝ | <ul style="list-style-type: none"> મીઠા પાણીના મત્સ્ય મીઠા પાણીના જીંગા ઉત્પાદન કરતા ખેડૂતોને જણાવવાનું કે, આ સમયગાળા દરમિયાન પૂરતી માત્રામાં ખોરાક આપવોકારણ કે આ વાતાવરણ માછલી/મીઠા પાણીના જીંગા માટે અનુકૂળ છે. તળાવમાં પાણીનું લેવલ જાળવવું અને વધુ વરસાદ આવે ત્યારે તળાવના આઉટલેટ થોડી માત્રામાં ખોલવા તેથી પાણીનું લેવલ જાળવાયેલું રહે. તળાવના તળિયાનું અને સપાટીનું તાપમાન સરભર કરવા એરેટર અથવા પંપ ચલાવવા. |

❖ એગ્રોમેટ સલાહકાર સેવા બુલેટીન કમિટીના સભ્યો :

- ડૉ. એચ. એમ. વિરડીયા, પ્રાધ્યાપક અને વડા (સશ્ય વિજ્ઞાન)
- ડૉ. જે. જે. પસ્તાગીયા, પ્રાધ્યાપક અને વડા (વનસ્પતિ કીટકશાસ્ત્ર)
- ડૉ. કે. બી. રાખોલીયા, સહ પ્રાધ્યાપક (વનસ્પતિ રોગશાસ્ત્ર) :
- ડૉ. સી. જી. ઈટવાલા, સંશોધન વૈજ્ઞાનિક (શાકભાજી વિજ્ઞાન)
- ડૉ. વાય. એન. ટેડેલ, સહ પ્રાધ્યાપક (કૃષિ વિજ્ઞાન)
- ડૉ. વી. આર. પટેલ, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (પશુપાલન)
- ડૉ. એમ. બી. ટેડેલ, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક અને વડા (વનીકરણ)
- ડૉ. એમ. આર. પટેલ, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (ફીશરીઝ સાયન્સ)
- ડૉ. વિભા ટાક, રીસર્ચ એસોસીયેટ (જી.કે.એમ.એસ.)
- ડૉ. પી. કે. પરમાર, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (કૃષિ હવામાનશાસ્ત્ર) અને પ્રિન્સિપાલ નોડલ ઓફિસર (જી.કે.એમ.એસ.)



NAVSARI AGRICULTURAL UNIVERSITY

Gramin Krishi Mausam Sewa

Agricultural Meteorological Cell
Department of Agricultural Engineering
N. M. College of Agriculture
Navsari Agricultural University
Navsari - 396450, Gujarat
E-mail :- aasnavsari@gmail.com



(Jointly issued by Navsari Agricultural University & India Meteorological Department)

DATE OF ISSUE: 26/11/2024

Agromet Advisory Bulletin No: 69/2024 - 2025

-- Navsari District --

Weather summary of preceding week 22 November to 26 November - 2024

| Sr. No. | Name of Weather Parameters | Value |
|----------------------------|---|---------------|
| 1. | Range of Rainfall (mm) | 0.0 |
| 2. | Range of Maximum Temperature (°C) | 31.0-33.0 |
| 3. | Range of Minimum Temperature (°C) | 15.0-18.1 |
| 4. | Range of Relative Humidity (%) | 37-90 |
| 5. | Range of Wind Speed (km/hrs) | 1.2-3.5 |
| 6. | Range of Cloud Cover (Okta) | 0-0 |
| 7. | Range of bright sunshine hours (hrs) | 5.7-7.2 |
| 8. | Last five days cumulative rainfall (mm) | 0.0 |
| Total Rainfall (mm) | | 2394.0 |


Weather summary of preceding week 27 November to 01 December - 2024

| Sr. No. | Weathers Parameters | Day - 1 (27/11) | Day - 2 (28/11) | Day - 3 (29/11) | Day - 4 (30/11) | Day - 5 (01/12) |
|---------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Rainfall (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Maximum temperature (°C) | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 |
| 3. | Minimum Temperature (°C) | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 |
| 4. | Max. Relative Humidity (%) | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 |
| 5. | Min. Relative Humidity (%) | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 |
| 6. | Wind Speed (km/hr.) | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 |
| 7. | Wind Direction (Compass point) | 74 | 66 | 67 | 65 | 60 |
| 8. | Total Cloud Cover (Okta) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |

Weather Summary/ Alert

- As per the forecast issued by India Meteorological Department over the next five days, the sky will be clear and there are chances of no rainfall.
- The Maximum temperature is 30 °C to 32 °C, when the Minimum temperature is 19 °C to 20 °C likely to be around.
- The humidity in the air is likely to be between 35 and 55 percent.
- The wind direction will be North-East with an average speed of 11 to 13 km/h.
- As per extended range forecast, above normal rainfall and maximum below normal temperature and minimum normal temperature are expected till 07th December, 2024.

-:: South Gujarat Heavy Rainfall Zone ::-

| | |
|---|--|
| General Advisory | <ul style="list-style-type: none"> • Wind speed is high >15 kmph, so avoid spraying of pesticide. • Farmers are advised to monitor the standing crop regularly for pest disease incidence and use the suitable recommended control measures. • Make a planning for sowing of next rabi crops. Procure certified seeds, fertilizer and agrochemicals for rabi crops. • Provide shade to newly planted/young plants of mango and apply mulch around the stem. • Farmers are advised to do the spraying chemical and fertilizer application activity as per the weather condition • Download the MEGHDOOT mobile application for Agromet Advisory Services and information on weather forecasting, which will provide weather based agricultural advice to farmers for their location, crops and livestock in their local language. Click on the following link to download the MEGHDOOT application: Android users: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot IOS users:https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155 • Download the DAMINI Mobile application to ensure the safety through monitoring sky lightning activity. It will provide the alert and detail description of instruction, precaution, Do and Don't. Click on the following link to download the DAMINI application. Android users: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightning.live.damini IOS users:https://apps.apple.com/app/id1502385645 |
| <p style="font-size: small;">NOAA/VHRS/BLENDED NDVI Composite ending on Week no 46 (11.11.2024 to 17.11.2024) over Agricultural region</p> <p style="font-size: small;">Gujarat</p>  <p style="font-size: small;">Agriculture vigour is good at isolated places of the state.</p> <p style="font-size: x-small;">Source: https://www.star.nesdis.noaa.gov</p> | |
| Crop | Weather based Agro-Advisory |
| Sugarcane | <ul style="list-style-type: none"> • In seed plot add Nitrogen (50 kg/ha.) Before one month of seed cutting. • Prop the sugarcanes with strong bamboos or by tying together the canes in clump to protect against rain. <p>Land preparation for new planting:</p> <ul style="list-style-type: none"> • New plantation of sugarcane crop should be done after proper preparation of land at proper moisture condition. Deep plough and level the soil. • Planting should be done from October to February. • Apply FYM/ Compost at the time of ploughing. Select healthy, diseases-insect free and immature seed materials of your selected variety. • Planting should be done at the spacing of 90 to 120 cm. 2 budded setts should be used with end to end method of planting after setts treatment with fungicide (<i>Carbendazim</i> 50 wp @ 1g/1 lit. water). If settling use intra row spacing should be 45 to 60 cm. • Within 3 days after planting and irrigation, spraying of <i>Atrazine</i> 50 WP 80 g/10 li. water. Pre-emergence weedicide should be applied to control weeds in clear weather conditions. • Application of <i>Trichoderma viride</i> in rich sugarcane pressedmed at time of planting. |
| Rabi Pulse crop | <p>Land preparation/Sowing:</p> <ul style="list-style-type: none"> • After harvesting of kharif crop land should be prepared at proper moisture condition. • Rabi pulses like Indian bean, Gram, Green gram (CO-4) should be sown earliest. |

| | |
|--------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Procure seed of improved varieties. • Basal recommended fertilizer applied. • Weeding should be done as per need or apply recommended pre emergence weedicide. • Apply irrigation as per soil and climatic condition. • Seed treatment with Thiram 3 g/kg seed. Rhizobium seed treatment 10 ml/kg seed. |
| Okra | <ul style="list-style-type: none"> • Harvesting should be carried out as per the tenderness of marketable fruit • Discard damaged and diseased fruit. • Weeding should be carried out from the plot/field. • Spraying of Hexaconazole 5 EC @ 10 ml or Carbendazim 50 WP 5 g per 10 Lit of water for control of powdery mildew/leaf spot disease under clear weather condition. • Up root and burn yellow vein mosaic infected okra plant from field. • Spraying systemic insecticides for whitefly (vector) management. • Spraying of <i>Propargite</i> 57 EC @ 20 ml/10 Lit. or <i>Fenazaquin</i> 10 EC @ 10 ml./10 Lit. of water for red Spider Mite during clear weather condition. |
| Brinjal | <ul style="list-style-type: none"> • Transplanting should be carried out when the seedlings are 28-30 days old. • After every two days, give a water to the plants. • 40 pheromone trap of brinjal fruit and shoot borer should be kept per hectare after 20 days of transplanting. • Spraying of <i>Propargite</i> 57 EC @ 20 ml./10 Lit. or <i>Fenazaquin</i> 10 EC @ 10 ml./10 Lit. of water for red Spider Mite during clear weather condition. |
| Tomato | <ul style="list-style-type: none"> • Transplanting should be carried out when the seedlings are 25-30 days old. • After every two days, give water to the plants. • 40 pheromone traps of <i>Spodoptera</i> and <i>Helicoverpa</i> should be kept per hectare after 20 days of transplanting. • For management of leaf spot disease, spray <i>Mancozeb</i> 75 WP @ 28 g/10 lit. of water under clear weather condition. |
| Chilli | <ul style="list-style-type: none"> • Seedlings of chilli become suitable for transplanting in about 35 to 40 days. • After every two days, give a water to the plants. • For management of thrips spray crop with <i>Acetamiprid</i> 20 SP @ 2g or <i>Broflanilide</i> 20 SC @ 2.5 ml or <i>Cyantraniliprole</i> 10.26 OD @ 12 ml or <i>Ethion</i> 50 EC @ 30ml or <i>Isocycloseram</i> 9.2 DC @ 12 ml or <i>Fipronil</i> 55 SC @ 15 ml per 10 liter of water under clear weather condition. • Spraying of <i>Propargite</i> 57 EC @ 20 ml./10 Lit. or <i>Fenazaquin</i> 10 EC @ 10 ml./10 Lit. of water for red Spider Mite during clear weather condition. • Spraying of Carbendazim 50 WP 10 g/10 Lit of water for control of fruit rot disease under clear weather condition. |
| Cow Pea | <ul style="list-style-type: none"> • Keep the plot clean by weeding and harvesting should be carried out time to time. |
| Pointed gourd | <ul style="list-style-type: none"> • Remove the dried vines from the mandap of pointed gourd and to remove the excess sprouting. • Plant new saplings in gap. • Hoeing, fertilizing and irrigation should be applied in pointed gourd field. |
| Little gourd | <ul style="list-style-type: none"> • Remove the dried vines from the mandap of little gourd and to remove the excess sprouting. • Plant new saplings in gap. • Hoeing, fertilizing and irrigation should be applied in little gourd field. |
| Elephant foot yam | <ul style="list-style-type: none"> • Keeping plot clean by removing weed. • Hoeing should be carried out. • Irrigation should be given as and when required.. |
| Greater yam | <ul style="list-style-type: none"> • Keeping plot clean by removing weed. • Give proper support or train branches of vines. |
| Tannia | <ul style="list-style-type: none"> • Keeping plot clean by removing weed. • Harvest the tender leaves of Tannia |
| Mango | <p>General Advise :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Find grubs of stem borer from gallery and holes on the stem and kill them. Do pouring of Chlorpyriphos 20 EC @ 25 ml/ 10 lit in hole and plug it with mud under clear weather condition. • Provide support to the young plants of mango to protect against rain and high wind speed. |

| | |
|------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Application of 10 % Bordeaux paste in cut after pruning branches of fruit tree. • Procure healthy and disease free planting material from authorized and government nursery for the new plantation. • Prepare pit for plantation of new grafts by filling 10 kg FYM, 1 kg SSP and 1 kg MOP. Give 50 ml/10 lit water Chlorpyrifos to manage termite and ants. • Spray <i>Imidacloprid</i> 17.8 % 3 ml. or <i>Thiamethoxam</i> 25 % 4 g or <i>Buprofezin</i> 25 SC @ 20 ml. or <i>Lambda-Cyhalothrin</i> 5 EC @ 10 ml. per 10 lit. water on mango tree trunk for control of mango hopper during clear weather condition. • Spraying of <i>Tolfenpyrad</i> 15 EC @ 20 ml./10 lit. water for thrips management, if observed. • Apply recommended dose of fertilizer per tree @ 800 g Urea or 1.8 kg Ammonium Sulphate, 1.0 kg SSP and 1.3 kg MOP along with 100 kg FYM to adult tree. • In addition RDF, give biofertilizers viz., <i>Azotobactor</i> 50 ml, <i>PSB</i> 50 ml, <i>KMB</i> 50 ml and <i>Trichoderma</i> 50 g per adult tree in monsoon. Before or after 15 days of fertilizer application. • Spray KNO_3 1% (1 kg/100 Lit. water) in evening cool hours to get early flowering at 15 days interval. • Spraying of <i>Hexaconazole</i> 5 EC @ 10 ml. or Wettable sulphur @ 40 g. per 10 lit. for control of powdery mildew in clear weather condition. • Do smudging with some neem based and other botanicals to get early flowering in mango during clear weather condition. |
| Sapota | <p>General Advise :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apply second split of 25% of RDF (Ammonium Sulphate -1.3 kg or Urea 0.6 kg, SSP 0.8 kg and MOP 0.3 kg + FYM 25 kg each tree) in clear weather condition. |
| Livestock | <ul style="list-style-type: none"> • Provide adequate quantity of balanced ration by considering the milk production and maintenance. • Good quality dry roughage with 15-20 kg green fodder provided to the animals, only after chaffing. • Feed silage & hay materials if available. • Before and after milking udder must be properly clean with zinc oxide or boric powder or potassium permanganate solutions. • For the control of tick and other parasites, spray <i>Deltemethrin</i> or <i>Aemitaz</i> 2 ml in 1 liter of water. • Height of animal shed should keep minimum 10 feet for aeration to maintain the floor dry and to control humidity. |
| Forestry | <ul style="list-style-type: none"> • Weeding climber cutting and cleaning should be carried out in first and second year plantations. |
| Fisheries | <ul style="list-style-type: none"> • Fresh water farmers give proper feed in fish/prawn farming for better growth rate because environment condition is very suitable. • Increase water depth and maintain water level through pond outlet. • Mixing the top and bottom water by using the aerators or pumps. |

❖ **Members of Agro-Advisory Committee :**

- Dr. H. M. Viradia, Professor & Head (Agronomy)
- Dr. J. J. Pastagia, Professor & Head (Entomology)
- Dr. K. B. Rakholiya, Associate Professor (Plant Pathology):
- Dr. C. G Intwala, Research Scientist (Vegetable Science)
- Dr. Y. N. Tandel, Associate Professor (Fruit Science)
- Dr. V. R. Patel, Assistant Professor (Animal Husbandry)
- Dr. M. B. Tandel, Assistant Professor (Forestry) & I/C Head (SAF) (Forestry)
- Dr. M. R. Patel, Assistant Professor (Fisheries Science)
- Dr. Vibha Tak, Research Associate(GKMS)
- Dr. P. K. Parmar, Assistant Professor (Agricultural Meteorology and Principal Nodal Officer (GKMS))

હવામાન આગાહી

| વિગત | તારીખ | ડાંગ | નવસારી | વલસાડ |
|-----------------------------|------------|------|--------|-------|
| વરસાદની શ્રેણી (મી.મી.) | ૨૭/૧૧/૨૦૨૪ | ૦ | ૦ | ૦ |
| | ૨૮/૧૧/૨૦૨૪ | ૦ | ૦ | ૦ |
| | ૨૯/૧૧/૨૦૨૪ | ૦ | ૦ | ૦ |
| | ૩૦/૧૧/૨૦૨૪ | ૦ | ૦ | ૦ |
| | ૦૧/૧૨/૨૦૨૪ | ૦ | ૦ | ૦ |
| મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.) | ૨૭/૧૧/૨૦૨૪ | ૩૧ | ૩૨ | ૩૨ |
| | ૨૮/૧૧/૨૦૨૪ | ૩૧ | ૩૧ | ૩૨ |
| | ૨૯/૧૧/૨૦૨૪ | ૩૦ | ૩૦ | ૩૨ |
| | ૩૦/૧૧/૨૦૨૪ | ૩૦ | ૩૦ | ૩૨ |
| | ૦૧/૧૨/૨૦૨૪ | ૩૧ | ૩૦ | ૩૨ |
| લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.) | ૨૭/૧૧/૨૦૨૪ | ૧૯ | ૨૦ | ૨૧ |
| | ૨૮/૧૧/૨૦૨૪ | ૧૯ | ૨૦ | ૨૦ |
| | ૨૯/૧૧/૨૦૨૪ | ૧૯ | ૧૯ | ૨૦ |
| | ૩૦/૧૧/૨૦૨૪ | ૨૦ | ૧૯ | ૨૦ |
| | ૦૧/૧૨/૨૦૨૪ | ૨૦ | ૨૦ | ૨૧ |
| મહત્તમ ભેજ (%) | ૨૭/૧૧/૨૦૨૪ | ૬૫ | ૫૦ | ૫૫ |
| | ૨૮/૧૧/૨૦૨૪ | ૬૫ | ૫૦ | ૫૫ |
| | ૨૯/૧૧/૨૦૨૪ | ૬૫ | ૫૦ | ૫૫ |
| | ૩૦/૧૧/૨૦૨૪ | ૬૦ | ૫૫ | ૫૫ |
| | ૦૧/૧૨/૨૦૨૪ | ૬૦ | ૫૫ | ૬૦ |
| લઘુત્તમ ભેજ (%) | ૨૭/૧૧/૨૦૨૪ | ૬૦ | ૩૫ | ૪૫ |
| | ૨૮/૧૧/૨૦૨૪ | ૬૦ | ૩૫ | ૪૫ |
| | ૨૯/૧૧/૨૦૨૪ | ૬૦ | ૩૫ | ૪૫ |
| | ૩૦/૧૧/૨૦૨૪ | ૫૫ | ૩૫ | ૪૫ |
| | ૦૧/૧૨/૨૦૨૪ | ૫૫ | ૪૦ | ૫૦ |
| પવનની ગતિ(કિ.મી./કલાક) | ૨૭/૧૧/૨૦૨૪ | ૮ | ૧૧ | ૧૦ |
| | ૨૮/૧૧/૨૦૨૪ | ૮ | ૧૧ | ૯ |
| | ૨૯/૧૧/૨૦૨૪ | ૯ | ૧૨ | ૧૦ |
| | ૩૦/૧૧/૨૦૨૪ | ૯ | ૧૩ | ૧૦ |
| | ૦૧/૧૨/૨૦૨૪ | ૧૦ | ૧૨ | ૧૦ |
| પવનની દિશા. (કમ્પાસ પોઈન્ટ) | ૨૭/૧૧/૨૦૨૪ | E | E | E |
| | ૨૮/૧૧/૨૦૨૪ | E | NE | E |
| | ૨૯/૧૧/૨૦૨૪ | E | NE | E |
| | ૩૦/૧૧/૨૦૨૪ | E | NE | E |
| | ૦૧/૧૨/૨૦૨૪ | E | NE | E |
| વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા) | ૨૭/૧૧/૨૦૨૪ | ૨ | ૨ | ૨ |
| | ૨૮/૧૧/૨૦૨૪ | ૨ | ૨ | ૨ |
| | ૨૯/૧૧/૨૦૨૪ | ૨ | ૨ | ૨ |
| | ૩૦/૧૧/૨૦૨૪ | ૦ | ૦ | ૦ |
| | ૦૧/૧૨/૨૦૨૪ | ૦ | ૦ | ૦ |