



નવસારી કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલય

ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા

કૃષિ હવામાનશાસ્ત્ર સેલ
કૃષિ ઈજનેરી વિભાગ, ન. મ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય
નવસારી કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલય
નવસારી - ૩૮૬૪૫૦, ગુજરાત
ઈ-મેઈલ:- aasnavsari@gmail.com



ભારત મૌસમ વિજ્ઞાન
વિભાગ

(નવસારી કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલય અને ભારત મૌસમ વિજ્ઞાન વિભાગ દ્વારા પ્રસારિત)

જારી કરવાની તારીખ: ૧૫/૦૭/૨૦૨૫

કૃષિ હવામાન બુલેટીન નં : ૩૧/૨૦૨૫ - ૨૦૨૬

-- નવસારી જિલ્લો --

પાછળનાં સમયનું હવામાન (તા. ૧૧ જુલાઈ થી ૧૫ જુલાઈ - ૨૦૨૫)

અનુ. નં.	હવામાન પરિબલો	Value
૧.	વરસાદની શ્રેણી (મી.મી.)	૦.૦-૧૩.૦
૨.	મહત્તમ તાપમાનની શ્રેણી (સે.ગ્રે.)	૩૦.૦-૩૧.૭
૩.	લઘુત્તમ તાપમાનની શ્રેણી (સે.ગ્રે.)	૨૨.૯-૨૫.૪
૪.	ભેજની શ્રેણી (%)	૭૮-૧૦૦
૫.	પવનની ગતિની શ્રેણી (કિ.મી./કલાક)	૫.૦-૬.૪
૬.	વાદળની સ્થિતિની શ્રેણી (ઓકટા)	૩-૮
૭.	સૂર્યપ્રકાશિત સમયની શ્રેણી (કલાક)	૦.૦-૭.૨
૮.	પાછળના પાંચ દિવસમાં સંચિત વરસાદ (મી.મી.)	૩૧.૦
કુલ વરસાદ		૫૮૬.૦

આઈ. એમ. ડી. દ્વારા પ્રાપ્ત હવામાન આગાહી (તા. ૧૬ જુલાઈ થી ૨૦ જુલાઈ - ૨૦૨૫)

અનુ. નં.	હવામાન પરિબલો	દિવસ-૧ (૧૬/૦૭)	દિવસ-૨ (૧૭/૦૭)	દિવસ-૩ (૧૮/૦૭)	દિવસ-૪ (૧૯/૦૭)	દિવસ-૫ (૨૦/૦૭)
૧.	વરસાદ (મી.મી.)	૬૫	૨૩	૨૧	૨૦	૨૩
૨.	મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૩૩	૩૩	૩૩	૩૩	૩૩
૩.	લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૭	૨૭	૨૭	૨૬	૨૬
૪.	મહત્તમ ભેજ (%)	૮૦	૮૫	૮૫	૮૫	૮૫
૫.	લઘુત્તમ ભેજ (%)	૭૫	૭૦	૬૫	૬૫	૬૫
૬.	પવનની ગતિ (કિ.મી./કલાક)	૧૫	૧૪	૧૩	૧૨	૧૧
૭.	પવનની દિશા (કમ્પાસ પોઈન્ટ)	૨૨૮	૨૨૫	૨૧૭	૨૧૧	૨૧૭
૮.	વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	૮	૭	૭	૭	૭

વિસ્તૃત શ્રેણીની આગાહી મુજબ, ૨૦ જુલાઈ, ૨૦૨૫ થી ૨૬ જુલાઈ, ૨૦૨૫ સુધી સામાન્ય વરસાદ થવાની ધારણા છે અને મહત્તમ અને લઘુત્તમ તાપમાન સામાન્ય રહેવાની ધારણા છે.

હવામાન સારાંશ / ચેતવણી	- આઈ. એમ. ડી., દ્વારા મળેલી હવામાનની આગાહી મુજબ આગામી પાંચ દિવસમાં આકાશમાં વાદળછાયું રહેશે અને છૂટાછવાયા જગ્યાઓમાં મધ્યમથી ભારે વરસાદ આવવાની સંભાવના છે. - મહત્તમ તાપમાન ૩૩ સે. જ્યારે લઘુત્તમ તાપમાન ૨૬ સે. થી ૨૭ સે. આસપાસ હોવાની સંભાવના છે. - હવામાં ભેજનું પ્રમાણ ૬૫ થી ૮૦ ટકા વચ્ચે રહેવાની સંભાવના છે. - પવનની દિશા દક્ષિણ-પશ્ચિમ રહેશે જેની સરેરાશ ગતિ ૧૧ થી ૧૫ કિ.મી./કલાક રહેવાની શક્યતા છે.
---------------------------------------	---

-:: દક્ષિણ ગુજરાત ભારે વરસાદ વિસ્તાર ::-

સામાન્ય સલાહ	- જો પવનની ગતિ ૧૫ કિમી પ્રતિ કલાક કરતાં વધુ હોય તો ખેતરમાં કેમિકલ જેવકે પેસ્ટિસાઈડ નો છંટકાવ ન કરવો. - દવા છંટકાવ અને ખાતર આપવાની કામગીરી થોડા દિવસ પુરતી મુલતવી રાખવી. - ખેડૂતોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે, ખેડૂતોને ખેતરના જુદા જુદા ખેતી કાર્યો કરવા નહીં. - મછીમારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે અતિ ભારે વરસાદના સાએ દરિયાઈ વિસ્તારમાં પ્રવેશ ન કરવો. - વધુ ઝડપી પવન સામે રક્ષણ માટે ઊભા બાગાયતી અને શાકભાજી પાકોની જાળવણી માટે લાકડાના અથવા વાંસ વડે યાંત્રિક ટેકા આપવો. - ખુબ વીજળી અને વરસાદના સમયે પશુ વૃક્ષ નીચે બાંધવા નહિ. - શેરડીના પાકમાં આજુબાજુના સાંઠાઓને બાંધી દેવા જેથી પવનની ઝડપ તેમજ વધુ વરસાદ સામે ટકી શકે. - જો ખેતરમાં વધુ વરસાદી પાણી હોય, તો વધારાનું પાણી નીકળી ન જાય ત્યાં સુધી ડાંગરની રોપણી કરવાનું ટાળો. કૃષિ હવામાન સલાહકારી બુલેટીન અને હવામાનની આગાહી અંગેની માહિતી મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો મેઘદૂત મોબાઈલ એપ્લિકેશન, જે ખેડૂતોને તેમની સ્થાનિક ભાષામાં સ્થાન, પાક અને પશુધન વિશે હવામાનઆધારિત કૃષિ સલાહ પ્રદાન કરશે. મેઘદૂત એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો: એન્ડ્રોઈડ યુઝર્સ:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot આઈ.ઓ.એસ. યુઝર્સ:https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155 - દામિની મોબાઈલ એપ્લિકેશનદ્વારા આકાશીય વિજળીની અગાઉથી ચેતવણી આપવામાં આવે છે તેમજ આકાશીય વિજળીથી બચવા શું કરવું અને શું નહિ કરવું તેની વિગતવાર માહિતી પૂરી પાડવામાં આવે છે. આથી ખેડુતમિત્રોને દામિની મોબાઈલ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. દામિની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લીંક પર ક્લિક કરો: એન્ડ્રોઈડ યુઝર્સ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightening.live.damini આઈ.ઓ.એસ. યુઝર્સ:https://apps.apple.com/app/id1502385645
પાક	હવામાન આધારિત કૃષિ સલાહ
શેરડી	વાનસ્પતિક વિકાસ અવસ્થા/મહત્તમ પ્રાપ્તિ અવસ્થા - રોપણીના ૬, ૭ અને ૮ માસ બાદ સૂકા પાન કાઢીને તેનો ઉપયોગ આવરણ તરીકે કરો. - અંગારીઓ અને સુકરા રોગના નિયંત્રણ માટે રોગીસ્ત છોડનો નાશ કરવો. - કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ ડબલ્યુપી ૧૦ ગ્રા./૧૦ લી. પાણીમાં મિક્સ કરી તંદુરસ્ત છોડની નજીક છોડનો નાશ કરવો. - ખેતરમાંથી વરસાદનું વધારાના પાણીના નિકાલ કરવી.
ચોમાસુ ડાંગર	- ફેરોપાણી માટે ઘાવલ કરી/કાદવ પાડી કપારી સમતળ તૈયાર કરવી. - ભલામણ મુજબ સેન્દ્રિય અને પાયાનું રાસાયણિક ખાતર આપવું. - જેવિક ખાતરની ધરૂના મૂળને માવજત આપવી અથવા સેન્દ્રિય ખાતર સાથે મિશ્ર કરી આપવું. - ફેરોપાણી માટે ૨ થી ૩ ધરૂ દરેક થાણે રોપવા. - ફેરોપાણી ૨૦ સે. મી. x ૧૫ સે. મી. અંતરે કરવું. - ફેરોપાણી બાદ ૩ દિવસમાં નિદણનાશકનો છંટકાવ કરવો. - બીજ માવજત : ૨૫ કિલો બીજને ૨૪ લીટર પાણીમાં મરકુરી ફૂગનાશક ૧૨ ગ્રામ +સ્ટ્રેપ્ટો સાયકલીન ૬ ગ્રામ ૮ કલાક પાણીમાં પલાળી પછી નર્સરીમા વાવેતર કરવું. - ખેતરમાંથી વરસાદનું વધારાના પાણીના નિકાલ કરવી.
ચોમાસુ ભીંડા	- કુમળા અને વેચાણલાયક ફળોની વીણી હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે કરવી જોઈએ. - રોગ-જીવાતવાળા અને બગડેલા ફળો દૂર કરવા જોઈએ. - નિદાંમણના નાશ માટે યોગ્ય પગલાં લેવા. - ભીંડામાં ભૂકીછારા અને પાનના ટપકના નિયંત્રણ માટે હેક્સાકોનાઝોલ ૫ એસિ ૧૦ મિલી. અથવા કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ ડબલ્યુપી ૫ ગ્રા પ્રતિ ૧૦ લી. પાણીમાં મીશ્ર કરી હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે છંટકાવ કરવો. - ખેતરમાંથી પીળી નસના વિષાણુ જની છોડ ને ઉપાડી નાશ કરો. - રોગનો ફેલાવો સફેદ માખીથી થાતો હોય, શોષક પ્રકારની જંતુ નાશક દવાનો છંટકાવ કરવો. - ખેતરમાંથી વરસાદનું વધારાના પાણીના નિકાલ કરવી.
પરવળ	- ફળ તૈયાર થયા બાદ તેની વીણી કરવી. - ખેતરમાંથી વરસાદનું વધારાના પાણીના નિકાલ કરવી.
દિંડોળા	- ફળ તૈયાર થયા બાદ તેની વીણી કરવી. - ખેતરમાંથી વરસાદનું વધારાના પાણીના નિકાલ કરવી.


સુરણ	- નિદાંમણના નાશ માટે યોગ્ય પગલાં લેવા. - ખાતર આપવાની કામગિરી હાલ પુર્તી મુલતવી રાખવી. - ખેતરમાંથી વરસાદનું વધારાના પાણીના નિકાલ કરવી.
સ્તાણુ	- વેલાની પ્રશાખાઓને ટેકા પર ચઢાવવી. - નિદાંમણના નાશ માટે યોગ્ય પગલાં લેવા. - ખાતર આપવાની કામગિરી હાલ પુર્તી મુલતવી રાખવી. - ખેતરમાંથી વરસાદનું વધારાના પાણીના નિકાલ કરવી.
તાનિયા	- નિદાંમણના નાશ માટે યોગ્ય પગલાં લેવા. - ખાતર આપવાની કામગિરી હાલ પુર્તી મુલતવી રાખવી. - ખેતરમાંથી વરસાદનું વધારાના પાણીના નિકાલ કરવી.
આંબા	- આંબાના મેઢની ઈયળો થડમાંથી શોધીને મારી નાખો અને કાણાંની અંદર ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦ ઈસી ૨૫ મી.લી./૧૦ લી. દ્રાવણ નાંખી કાઢવથી કાણાં બંધ કરી દેવા. - આંબાનાં નાના રોપાની જળવણી માટે ટેકો આપવાની વ્યવસ્થા કરવી જેથી વરસાદ અને વધુ પવનની ઝડપ સામે ટકી શકે. - કપાયેલ ડાળી પર બોડિકસ પેસ્ટ ૧૦ ટકા લગાડવું. - આંબાની નવી વાડી બનાવવા તંદુરસ્ત અને રોગમુક્ત ક્લમો અધિકૃત અને સરકારી નર્સરી માંથી મેળવવી જોઈએ. - નવી ક્લમો માટે તૈયાર કરેલ ખાડામાં ૧૦ કિગ્રા. છાણિયું ખાતર, ૧ કિગ્રા. સિંગલ સુપર સલ્ફેટ અને ૧ કિગ્રા. મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ ખાતર આપવું. ઉધઈ અને કીડીનો ઉપદ્રવ ક્લમોમાં જોવા મળે તો ૫૦ મિલી ક્લોરપાયરીફોસ અથવા ૧૦૦ ગ્રામ મિથાઈલ પેરાથીઓન ની માવજત ખાડા પૂરતી વખતે કરી દેવી. - આંબાવાડીમાં પુખ્ત ઝાડ દિઠ ૧૦૦ કિગ્રા. છાણિયું ખાતર, ૮૦૦ ગ્રામ યુરિયા અથવા ૧.૮ કિગ્રા. અમોનિયમ સલ્ફેટ ૧.૦ કિગ્રા.સિંગલ સુપર સલ્ફેટ અને ૧.૩ કિગ્રા.મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ ખાતર ચોમાસામાં આપવું. - આંબાવાડીમાં રાસાયણિક ખાતર આપ્યાના ૧૫ દિવસ પહેલા અથવા પછી બાયોફિટિવાઈઝર જેવા કે એઝોટોબેક્ટર, ૫૦ મિલી., ફોસ્ફેટ સોલ્યુબિલિઝિંગ બેક્ટેરિયા ૫૦ મિલી., પોટાશ મોબિલિઝિંગ બેક્ટેરિયા ૫૦ મિલી. અને ટ્રાયકોડર્મા ૧૦૦ ગ્રામ. પ્રતિ ઝાડ આપવું. - આંબાવાડીમાં વરસાદનું વધારાના પાણીના નિકાલ કરવી.
ચીકુ	- ચીકુનાં નાના રોપાની જળવણી માટે ટેકો આપવાની વ્યવસ્થા કરવી જેથી વરસાદ અને વધુ પવનની ઝડપ સામે ટકી શકે. - ચીકુની નવી વાડી બનાવવા તંદુરસ્ત અને રોગમુક્ત ક્લમો અધિકૃત અને સરકારી નર્સરી માંથી મેળવવી જોઈએ. - નવી ક્લમો માટે તૈયાર કરેલ ખાડામાં ૧૦ કિગ્રા. છાણિયું ખાતર, ૧ કિગ્રા. સિંગલ સુપર સલ્ફેટ અને ૧ કિગ્રા. મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ ખાતર આપવું. ઉધઈ અને કીડીનો ઉપદ્રવ ક્લમોમાં જોવા મળે તો ૫૦ મિલી ક્લોરપાયરીફોસ અથવા ૧૦૦ ગ્રામ મિથાઈલ પેરાથીઓન ની માવજત ખાડા પૂરતી વખતે કરી દેવી. - બીજા ખાતરનો હુપ્તો ભલામણ કરેલ ખાતરનો ૨૫ ટકા ભાગ પ્રમાણે રાસાયણિક ખાતર અમોનિયમ સલ્ફેટ ૧.૩ કિગ્રા અથવા યુરિયા ૦.૬ કિગ્રા, સિંગલ સુપર ફોસ્ફેટ ૦.૮ કિગ્રા, મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ ૦.૩ કિગ્રા, છાણિયુ ખાતર ૨૫ કિગ્રા આ મહિનામાં હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે આપવું.
પશુપાલન	- પશુઓને ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળું ખનીજક્ષાર મિશ્રણ દૈનિક આપવું જોઈએ. જેની માત્રા પશુચિકિત્સક સલાહ મુજબ અથવા તેનું પેકિંગ પરના નિર્દેશાનુસાર આપવાનો રહે છે. - પશુઓને તેમની, આયુ, વિકાસ અને ઉત્પાદકતાના આધારે સમતોલ આહાર આપવો, જેમા ગુણવત્તુક દાણા, લીલોચારો અને સુકાચારાનો સમાવેશ કરવો. - વધુ ઉત્પાદન (દૈનિક ૧૦ લીટરથી વધુ) ધરાવવા પશુઓની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારવા અને પોષક તત્વોની જરૂરીયાત સંતોષી શકાય તે માટે બાયબાસ પ્રોટીન તેમજ સીલેટેડ મિનરલ મિશ્રણ પશુ ચિકિત્સકની સલાહ મુજબ ઉપયોગ કરી શકાય. - ચાફ કટરથી લીલા તથા સૂકા ઘાસચારાને ટુકડા કરીને જ નીરણ કરવું. - દુધાણા પશુઓના આઉને દૂધ દોહન પહેલા અને પછી ઝીંક ઓક્સાઈડ અથવા બોરીક પાઉડર અથવા પોટેશીયમ પરમેંગેનેટ ના દ્રાવણથી બરાબર સાફ કરવા. - પશુઓનાં ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથીન અથવા એમીટાઝર ૨ મી.લી./લિટર પાણીમાં નાખને છાંટવી (દવાની બોટલ ઉપર લખેલી સૂચનાનો અમલ કરવો). - પશુઓ જ્યારે ઈચ્છે ત્યારે પાણી પી શકે તેવી વ્યવસ્થા ઉભી કરવી જોઈએ અથવા ઓછામાં ઓછુ દિવસમાં ચારથી પાંચ વખત જરૂરીયાત મુજબ પાણી પીવડાવવું જોઈએ. - કોઢ/ગમાણની ઉંચાઈ ૧૦ ફૂટથી વધારે રાખવી, જેથી હવાની હેરફેર સરળતાથી થઈ શકે, બફારો/ગરમી ઓછી થાય અને ભોયાતળિયાનો ભાગ સુકો રહે. - ચોમાસાની શરૂઆત થતી હોઈ પશુઓના રહેઠાણમાં વરસાદી પાણીનો ભરાવો ના થાય તે પ્રમાણે કોઢ/ગમાણના ભોયાતળિયાનો ઢોળાવ અપાવો. - વિષાણ/જુવાણુ ગ્રસ્ત વધુ પશુ અથવા, અન્ય કોઈપણ બિમાર પશુને બાકીના તંદુરસ્ત પશુઓથી અલગ

	રાખવાની વ્યવસ્થા કરવી તેમજ તાત્કાલીક સારવાર કરવી
વનીકરણ	- ખુબ વીજળી અને વરસાદના સમયે પશુ વૃક્ષ નીચે બાંધવા નહિ. - પ્રથમ અને બીજા વર્ષના વાવેતર દરમ્યાનમાં નિંદણ અને સફાઈ કરવી જોઈએ. - ધરુવાડિયામાં ઉછરેલા સાગના રોપાને સાગ સ્ટેમ્પની તૈયારી માટે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરી શકાય છે. - ખેતરમાંથી વરસાદનું વધારાના પાણીના નિકાલ કરવી.
ફીશરીઝ	સામાન્ય સલાહ : - મીઠા પાણીના મત્સય મીઠા પાણીના જંગા ઉત્પાદન કરતા ખેડૂતોને જાણાવવાનું કે, આ સમયગાળા દરમ્યાન પૂરતી માત્રામાં ખોરાક આપવોકારણ કે આ વાતાવરણ માછલી/મીઠા પાણીના જંગા માટે અનુકૂળ છે. - તળાવમાં પાણીનું લેવલ જળવધુ અને વધુ વરસાદ આવે ત્યારે તળાવના આઉટલેટ થોડી માત્રામાં ખોલવા તેથી પાણીનું લેવલ જળવાયેલું રહે - તળાવના તળિયાનું અને સપાટીનું તાપમાન સરભર કરવા એરેટર અથવા પંખ ચલાવવા.

❖ **એગ્રોમેટ સલાહકાર સેવા બુલેટીન કમિટીના સભ્યો :**

- ડૉ. એચ. એમ. વિરડીયા, પ્રાધ્યાપક અને વડા (સશ્ય વિજ્ઞાન)
- ડૉ. જે. જે. પરતાગીયા, પ્રાધ્યાપક અને વડા (વનસ્પતિ કીટકશાસ્ત્ર)
- ડૉ. કે. બી. રાખોલીયા, સહ પ્રાધ્યાપક (વનસ્પતિ રોગશાસ્ત્ર) :
- ડૉ. સી. જી. ઈટવાલા, સંશોધન વૈજ્ઞાનિક (શાકભાજી વિજ્ઞાન)
- ડૉ. વાય. એન. ટેડલ, પ્રાધ્યાપક (ફળ વિજ્ઞાન)
- ડૉ. વી. આર. પટેલ, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (પશુપાલન)
- ડૉ. એમ. બી. ટેડલ, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક અને વડા (વનીકરણ)
- ડૉ. એમ. આર. પટેલ, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (ફીશરીઝ સાયન્સ)
- ડૉ. વિભા ટાક, રીસર્ચ એસોસીયેટ (જી.કે.એમ.એસ.)
- ડૉ. પી. કે. પરમાર, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (કૃષિ હવામાનશાસ્ત્ર) અને પ્રિન્સિપાલ નોડલ ઓફિસર (જી.કે.એમ.એસ.)

NOAA/VIRS/BLENDED NDVI Composite ending on Week no 27
(02.07.2025 to 08.07.2025) over Agricultural region
Gujarat



Agriculture vigour is moderate at isolated places of the state.

Source: <https://www.star.nesdis.noaa.gov>

NAVSARI AGRICULTURAL UNIVERSITY
AMFU_Navsari



Gramin Krishi Mausam Sewa

Agricultural Meteorological Cell
Department of Agricultural Engineering
N. M. College of Agriculture
Navsari Agricultural University
Navsari – 396450, Gujarat
E-mail :- aasnavsari@gmail.com



(Jointly issued by Navsari Agricultural University & India Meteorological Department)

DATE OF ISSUE: 15/07/2025

Agromet Advisory Bulletin No: 31/2025 - 2026

-- Navsari District --

Weather summary of preceding week (11 July to 15 July - 2025)

Sr. No.	Name of Weather Parameters	Value
1.	Range of Rainfall (mm)	0.0-13.0
2.	Range of Maximum Temperature (°C)	30.0-31.7
3.	Range of Minimum Temperature (°C)	22.9-25.4
4.	Range of Relative Humidity (%)	78-100
5.	Range of Wind Speed (km/hrs)	5.0-6.4
6.	Range of Cloud Cover (Okta)	3-8
7.	Range of bright sunshine hours (hrs)	0.0-7.2
8.	Last five days cumulative rainfall (mm)	31.0
Total Rainfall (mm)		596.0

IMD based Weather forecast for (16 July to 20 July - 2025)

Sr. No.	Weathers Parameters	Day - 1 (16/07)	Day - 2 (17/07)	Day - 3 (18/07)	Day - 4 (19/07)	Day - 5 (20/07)
1.	Rainfall (mm)	65	23	21	20	23
2.	Maximum temperature (°C)	33	33	33	33	33
3.	Minimum Temperature (°C)	27	27	27	26	26
4.	Max. Relative Humidity (%)	90	85	85	85	85
5.	Min. Relative Humidity (%)	75	70	65	65	65
6.	Wind Speed (km/hr.)	15	14	13	12	11
7.	Wind Direction (Compass point)	228	225	217	211	217
8.	Total Cloud Cover (Okta)	8	7	7	7	7

According to the extended range forecast, normal rainfall is expected and maximum and minimum temperatures are expected to be normal till 20th July, 2025 to 26th July, 2025.

Weather Summary/ Alert

- As per the forecast issued by India Meteorological Department over the next five days, the sky will be cloudy and there are chances of medium to heavy rainfall at isolated places.
- The Maximum temperature is 33 °C, when the Minimum temperature is 26 °C to 27 °C likely to be around.
- The humidity in the air is likely to be between 65 and 90 percent.
- The wind direction will be South-West with an average speed of 11 to

-:: South Gujarat Heavy Rainfall Zone ::-


General Advisory	• Wind speed is high >15 kmph, so avoid spraying of pesticide. • Provide mechanical support to horticultural and vegetable crops during forecasts of high wind velocity. • Farmers are advised to drain excess rainwater from standing crop fields. • Farmers are advised to postpone spraying chemicals and applying fertilizers. • Farmers are advised to postpone various farm operations. • Fishermen are advised not to venture into the sea during heavy rainfall. • Do not keep animals under trees during heavy lightning and rain. • Prop the sugarcane canes with strong bamboos or tie the canes together in a clump with sugarcane leaves to protect against wind and heavy rain. • If there is excess rainwater in the field, avoid transplanting paddy until the excess water is drained. • Download the MEGHDOOT mobile application for Agromet Advisory Services and information on weather forecasting, which will provide weather based agricultural advice to farmers for their location, crops and livestock in their local language. Click on the following link to download the MEGHDOOT application: Android users: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot IOS users: https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155 • Download the DAMINI Mobile application to ensure the safety through monitoring sky lightning activity. It will provide the alert and detail description of instruction, precaution, Do and Don't. Click on the following link to download the DAMINI application. Android users: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lighteninglive.damini IOS users: https://apps.apple.com/app/id1502385645
Crop	Weather based Agro-Advisory
Sugarcane	Vegetative Stage/Grand Growth stage: • After 6, 7 & 8 month of planting remove dry leaves and use it as mulch. • Up root and burn whip smut and wilted plant from field. • Drenching carbendazim 50 wp 10gm/10 lit water from prevent spread of both disease (Sugarcane red rot & Wilt) nearby healthy plants. • Drains out excess rain water from crop fields.
Kharif Paddy	• For transplanting (TP) of paddy, Field should be puddle either with power tiller/mini tractor/bullock just before TP. Level the puddle land. • Apply recommended dose of manures and basal dose of fertilizer. • Give root deep treatment with Bio-fertilizer or apply with manure. • Transplant younger seedling at 20 cm x 15 cm spacing. • Use 2-3 seedlings per hill for TP. • Apply Pre emergence weedicide within 3 days of TP. • 25 kg Seeds dip in 24 liter of water treated with mercury fungicide 12 gm + Streptocycline sulphate 6 gm seeds dip 8 hours for management of seed borne diseases. • Drains out excess rain water from crop fields.
Kharif Okra	• Harvesting should be carried out as per the tenderness of marketable fruit during clear weather condition. • Discard damaged and diseased fruit. • Weeding should be carried out. • Spraying of Hexaconazole 5 EC @ 10 ml or Carbendazim 50 WP 5 g per 10 Lit of water for control of powdery mildew/leaf spot disease under clear weather condition. • Up root and burn whip yellow vein mosaic infected okra plant from field. • Spraying systemic insecticides for whitefly (vector) management. • Drains out excess rain water from crop fields.
Pointed gourd	• Marketable fruit should be harvested. • Drains out excess rain water from crop fields.
Little	• Marketable fruit should be harvested.

gourd	• Drains out excess rain water from crop fields.
Elephant foot yam	• Take measures for weed control. • Postpone fertilizer application activity. • Drains out excess rain water from crop fields.
Greater yam	• Take measures for weed control. • Give proper support or train branches of vines. • Postpone fertilizer application activity. • Drains out excess rain water from crop fields.
Tannia	• Take measures for weed control. • Postpone fertilizer application activity. • Drains out excess rain water from crop fields.
Mango	• Find grubs of stem borer from gallery and holes on the stem and kill them. Do pouring of Chlorpyriphos 20 EC @ 25 ml/ 10 lit in hole and plug it with mud in clear weather condition under clear weather condition.. • Provide support to the young plants of mango to protect against rain and high wind speed. • Application of 10 % Bordeaux paste in cut/pruning branches of fruit tree. • Procure healthy and disease free planting material from authorized and government nursery for the new plantation. • Prepare pit for plantation of new grafts by filling 10 kg FYM, 1 kg SSP and 1 kg MOP. Give 50 ml. Chlorpyriphos or 100 g Methyl Parathion to manage termite and ants. • Apply recommended dose of fertilizer per tree @ 800 g Urea or 1.8 kg Ammonium Sulphate, 1.0 kg SSP and 1.3 kg MOP along with 100 kg FYM to adult tree. • In addition RDF, give biofertilizers viz., Azotobactor 50 ml, PSB 50 ml, KMB 50 ml and Trichoderma 100 g per adult tree in monsoon. Before or after 15 days of fertilizer application. • Drains out excess rain water from mango orchard.
Sapota	• Provide support to the young plants of Sapota to protect against rain and high wind speed. • Procure healthy and disease free planting material from authorized and government nursery for the new plantation. • Prepare pit for plantation of new grafts by filling 10 kg FYM, 1 kg SSP and 1 kg MOP. Give 50 ml. Chlorpyriphos or 100 g Methyl Parathion to manage termite and ants. • Apply second split of 25% of RDF (Ammonium Sulphate -1.3 kg or Urea 0.6 kg, SSP 0.8 kg and MOP 0.3 kg + FYM 25 kg each tree) in clear weather condition.
Livestock	• Provide adequate quantity of balanced ration by considering the milk production and maintenance. • For high yielding (more than 10 lit. milk/day) animal, to improve resistance power and to fulfill nutrient requirement after by pass protein & cheleted mineral mixture with guidance of Veterinary Officer. • All the livestock should provided with good quality of mineral mixture, for that dose rate are as per the prescription label on the packing or as guided by veterinary doctor. • Before and after milking udder must be properly clean with zinc oxide or boric powder or potassium permanganate solutions. • For the control of tick and other parasites, spray <i>Deltamethrin</i> or <i>Aemita</i> 2 ml in 1 liter of water. • Isolate any infected animal from healthy breed, and get treatment as earliest. • In rainy season, give sufficient slop on the floor of animal shed to avoid water logging. • Don't keep the animal under tree when there is heavy lightning during rain.
Forestry	• Weeding and cleaning should be done during first and second year plantations. • The nursery raised teak seedling may be transplanted for teak stamp preparation for further filed planting. • Drains out excess rain water from crop fields.
Fisheries	• Fresh water farmers give proper feed in fish/prawn farming for better growth rate because environment condition is very suitable. • Increase water depth and maintain water level through pond outlet. • Mixing the top and bottom water by using the aerators or pumps.

❖ Members of Agro-Advisory Committee :

- Dr. H. M. Viradia, Professor & Head (Agronomy)
- Dr. J. J. Pastagia, Professor & Head (Entomology)
- Dr. K. B. Rakholiya, Associate Professor (Plant Pathology):
- Dr. C. G. Intwala, Research Scientist (Vegetable Science)
- Dr. Y. N. Tandel, Professor (Fruit Science)
- Dr. V. R. Patel, Assistant Professor (Animal Husbandry)
- Dr. M. B. Tandel, Assistant Professor (Forestry) & I/C Head (SAF) (Forestry)
- Dr. M. R. Patel, Assistant Professor (Fisheries Science)
- Dr. Vibha Tak, Research Associate(GKMS)
- Dr. P. K. Parmar, Assistant Professor (Agricultural Meteorology and Principal Nodal Officer (GKMS))

NOAA/VIIRS/BLENDED NDVI Composite ending on Week no 27
(02.07.2025 to 08.07.2025) over Agricultural region
Gujarat



Agriculture vigour is moderate at isolated places of the state.

Source: <https://www.star.nesdis.noaa.gov>

NAVSARI AGRICULTURAL UNIVERSITY
AMFU_Navsari

હવામાન આગાહી

વિગત	તારીખ	ડાંગ	નવસારી	વલસાડ
વરસાદની શ્રેણી (મી.મી.)	૧૬/૦૭/૨૦૨૫	૬૫	૬૫	૭૦
	૧૭/૦૭/૨૦૨૫	૨૫	૨૩	૨૮
	૧૮/૦૭/૨૦૨૫	૨૩	૨૧	૨૭
	૧૯/૦૭/૨૦૨૫	૨૧	૨૦	૨૬
	૨૦/૦૭/૨૦૨૫	૨૨	૨૩	૨૯
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૧૬/૦૭/૨૦૨૫	૨૯	૩૩	૩૩
	૧૭/૦૭/૨૦૨૫	૩૦	૩૩	૩૩
	૧૮/૦૭/૨૦૨૫	૩૧	૩૩	૩૩
	૧૯/૦૭/૨૦૨૫	૩૧	૩૩	૩૩
	૨૦/૦૭/૨૦૨૫	૩૧	૩૩	૩૩
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૧૬/૦૭/૨૦૨૫	૨૬	૨૭	૨૭
	૧૭/૦૭/૨૦૨૫	૨૬	૨૭	૨૭
	૧૮/૦૭/૨૦૨૫	૨૫	૨૭	૨૭
	૧૯/૦૭/૨૦૨૫	૨૫	૨૬	૨૬
	૨૦/૦૭/૨૦૨૫	૨૫	૨૬	૨૬
મહત્તમ ભેજ (%)	૧૬/૦૭/૨૦૨૫	૯૫	૯૦	૯૦
	૧૭/૦૭/૨૦૨૫	૯૫	૮૫	૮૫
	૧૮/૦૭/૨૦૨૫	૮૫	૮૫	૮૫
	૧૯/૦૭/૨૦૨૫	૮૫	૮૫	૮૫
	૨૦/૦૭/૨૦૨૫	૮૫	૮૫	૮૫
લઘુત્તમ ભેજ (%)	૧૬/૦૭/૨૦૨૫	૯૦	૭૫	૭૫
	૧૭/૦૭/૨૦૨૫	૮૦	૭૦	૭૦
	૧૮/૦૭/૨૦૨૫	૭૦	૬૫	૬૫
	૧૯/૦૭/૨૦૨૫	૭૦	૬૫	૬૫
	૨૦/૦૭/૨૦૨૫	૭૦	૬૫	૬૫
પવનની ગતિ(કિ.મી./કલાક)	૧૬/૦૭/૨૦૨૫	૧૨	૧૫	૧૩
	૧૭/૦૭/૨૦૨૫	૧૦	૧૪	૧૧
	૧૮/૦૭/૨૦૨૫	૯	૧૩	૧૦
	૧૯/૦૭/૨૦૨૫	૮	૧૨	૧૦
	૨૦/૦૭/૨૦૨૫	૮	૧૧	૯
પવનની દિશા (કમ્પાસ પોઈન્ટ)	૧૬/૦૭/૨૦૨૫	SW	SW	SW
	૧૭/૦૭/૨૦૨૫	SW	SW	SW
	૧૮/૦૭/૨૦૨૫	SW	SW	SW
	૧૯/૦૭/૨૦૨૫	SW	SW	S
	૨૦/૦૭/૨૦૨૫	SW	SW	SW
વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	૧૬/૦૭/૨૦૨૫	૮	૮	૮
	૧૭/૦૭/૨૦૨૫	૭	૭	૭
	૧૮/૦૭/૨૦૨૫	૭	૭	૭
	૧૯/૦૭/૨૦૨૫	૬	૭	૭
	૨૦/૦૭/૨૦૨૫	૭	૭	૭