



નવસારી ફુલ વિશ્વવિદ્યાલય

ગ્રામીણ ફુલ મૌસમ સેવા

ફુલ હવામાનશાહ્ર સેલ

ફુલ ઈજનેરી વિભાગ, ન. મ. ફુલ મહાવિદ્યાલય

નવસારી ફુલ વિશ્વવિદ્યાલય

નવસારી - ૩૬૯૪૫૦, ગુજરાત

ઈ-મેઇલ:- aasnavsari@gmail.com

ભારત મૌસમ વિજ્ઞાન
વિભાગ

(નવસારી ફુલ વિશ્વવિદ્યાલય અને ભારત મૌસમ વિજ્ઞાન વિભાગ દ્વારા પ્રસારિત)

તા. ૨૦/૧૨/૨૦૨૪

ફુલ હવામાન બુલેટીન નં : ૭૯/૨૦૨૪ - ૨૦૨૫

-- નવસારી જિલ્લો --

પાછળનાં સમયનું હવામાન (તા. ૧૭ ડિસેમ્બર થી ૨૦ ડિસેમ્બર - ૨૦૨૪)

અંકુ. નં.	હવામાન પરિબળો	Value
૧.	વરસાદની શ્રેણી (મી.મી.)	૦.૦
૨.	મહત્તમ તાપમાનની શ્રેણી (સે.ગ્રે.)	૩૧.૮-૩૩.૫
૩.	લધુતમ તાપમાનની શ્રેણી (સે.ગ્રે.)	૧૦.૬-૧૪.૪
૪.	ભેજની શ્રેણી (%)	૨૭-૬૫
૫.	પવનની ગતિની શ્રેણી (કિ.મી./કલાક)	૧.૧-૧.૬
૬.	વાદળની સ્થિતિની શ્રેણી (ઓક્ટા)	૦-૦
૭.	સુર્યપ્રકાશન સમયની શ્રેણી (કલાક)	૬.૨-૬.૦
૮.	પાછળના પાંચ દિવસમાં સંચિત વરસાદ (મી.મી.)	૦.૦
કુલ વરસાદ		૨૩૬૪.૦

આઈ. એમ. ડી. દ્વારા પ્રાપ્ત હવામાન આગાહી (તા. ૨૧ ડિસેમ્બર થી ૨૫ ડિસેમ્બર - ૨૦૨૪)

અંકુ. નં.	હવામાન પરિબળો	દિવસ-૧ (૨૧/૧૨)	દિવસ-૨ (૨૨/૧૨)	દિવસ-૩ (૨૩/૧૨)	દિવસ-૪ (૨૪/૧૨)	દિવસ-૫ (૨૫/૧૨)
૧.	વરસાદ (મી.મી.)	૦	૦	૦	૦	૦
૨.	મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૮	૩૦	૩૦	૩૦	૩૦
૩.	લધુતમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૧૭	૧૮	૧૭	૧૭	૧૮
૪.	મહત્તમ ભેજ (%)	૮૦	૮૦	૮૫	૮૫	૮૦
૫.	લધુતમ ભેજ (%)	૬૦	૬૦	૬૫	૬૫	૬૫
૬.	પવનની ગતિ (કિ.મી./કલાક)	૬	૪	૫	૦	૭
૭.	પવનની દિશા (ક્રમાસ પોર્ટન્ટ)	૪૫	૧૦૭	૧૮૪	૦	૩૫
૮.	વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટા)	૦	૦	૦	૨	૨

હવામાન સારાંશ / ચેતવણી	<ul style="list-style-type: none"> આઈ. એમ. ડી. , હવારા મળેલી હવામાનની આગાહી મુજબ આગામી પાંચ દિવસમાં આકાશ આંશિક વાદળથાં રહેશે અને વરસાદ પડવાની સંભાવના નથી. મહત્તમ તાપમાન ૨૮ સે. થી ૩૦ સે. જયારે લધુતમ તાપમાન ૧૭ સે. થી ૧૮ સે. આસપાસ હોવાની સંભાવના છે. હવામાન ભેજનું પ્રમાણ ૬૦ થી ૮૫ ટકા વચ્ચે રહેવાની સંભાવના છે. પવનની દિશા ઉત્તર-પૂર્વ રહેશે જેની સરેરાશ ગતિ ૦ થી ૭ કિ.મી./કલાક રહેવાની શક્યતા છે. વિસ્તૃત રેન્જની આગાહી મુજબ , ૨૧મી ડિસેમ્બર, ૨૦૨૪ સુધી સામાન્ય થી ઉપર વરસાદ સામાન્ય થી ઉપર અને મહત્તમ સામાન્યથી સાધારણ નીચે અને લધુતમ તાપમાન સામાન્ય રહેવાની અપેક્ષા છે.
---------------------------	--

-:: દક્ષિણ ગુજરાત ભારે વર્સાદ વિસ્તાર ::-

સામાન્ય સલાહ	<ul style="list-style-type: none"> આગામી શિયાળું પાકોની વાવણી માટે ખેત આયોજન કરવું. વાવણી માટે સારી ગુણવત્તાવાળું પ્રમાણિત બિયારણ, ખાતર અને દવાનો જથ્થો મેળવી લેવો. ઉભા પાકોમાં રોગ-જ્વાતના ઉપદ્રવનું નિયમિત નિરીક્ષણ કરી ભલામણ મુજબના પાક સંરક્ષણના પગલા લેવો. ઉભા પાકોમાં ભલામણ મુજબના ખાતરો તથા જરૂરિયાત મુજબ પિયત આપવું . આકાશ ચોખ્ખનું હોય તથા પવનની ગતિ ઓછી રહે ત્યારે જંતુનાશક તથા ફુગનાશક દવાની જોડે ડીટરજન્ટ પાઉડર અથવા સ્ટીકર (ગુંદરીયું)નો ઉપયોગ કરીને છંટકાવ કરવો. કેરીના નવા વાવેલા/યુવાન છોડને છાંધો આપો અને દાંડીની આસપાસ લીલા ઘાસ નાખો. કૃષિ હવામાન સલાહકારી બુલેટિન અને હવામાનની આગાહી અંગેની માહિતી મેળવવાં માટે ડાઉનલોડ કરો મેધદૂત મોબાઈલ ઓપ્લિક્ષન, જે ખેડુતોને તેમની સ્થાનિક ભાપવામાં સ્થાન, પાક અને પશુધન વિશે હવામાનાખાનિત કૃષિ સલાહ પ્રદાન કરશે. મેધદૂત ઓપ્લિક્ષનને ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો: <p>એન્ટ્રોઇટ યુર્જર્સે: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot</p> <p>આઈ.ઓ.એસ. યુર્જર્સે: https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155</p> <ul style="list-style-type: none"> દામિની મોબાઈલ એપ્લિક્ષન દ્વારા આકાશીય વિજણીની અગાઉથી ચેતવણી આપવામાં આવે છે તેમજ આકાશીય વિજણીથી બચવા શું કરવું અને શું નહિ કરવું તેની વિગતવાર માહિતી પૂરી પાડ વામાં આવે છે . આથી ખેડુતમિત્રોને દામિની મોબાઈલ ઓપ્લિક્ષન ડાઉનલોડ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે . દામિની એપ્લિક્ષન ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો: એન્ટ્રોઇટ યુર્જર્સે: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightening.live.damini <p>આઈ.ઓ.એસ. યુર્જર્સે: https://apps.apple.com/app/id1502385645</p>
	<p>NOAA/VIIIRS/BLENDED NDVI Composite ending on Week no 50 (09.12.2024 to 15.12.2024) over Agricultural region</p> <p style="text-align: center;">Gujarat</p>

પાક	હવામાન આધ્યાત્મિક કૃષિ સલાહ
શેરડી <ul style="list-style-type: none"> શેરડીની રોપણી માટે બીજ પ્લોટ બનાવેલ હોય તો બીજ માટે શેરડી કાપવાની હોય તેના એક માસ પહેલા પ્રક્રિયા / ડે. નાઈટર્ઝેન ખાતર આપવું. નવી રોપણી માટે જમીન તૈયારી: <ul style="list-style-type: none"> શેરડીની નવી રોપણી માટે યોગ્ય ભેજની પરિસ્થિતિમાં જમીન તૈયાર કરવી. શેરડીની રોપણી ઓક્ટોબર-દેસ્ટ્રીબ્યુઅરી માસ દરમયાન કરવી. એડ વાખતે ખાતર્યકર્માસ્ટ જમીનમાં ભેળવવું. રોપણી પહેલા પાયાનું ખાતર આપવું. રોપણી માટે કુમળું અને તંદુરસ્ત તમારી પસંદગીની જાતનું બિયારણ વાપરવું. રોપણી માટે બે લાઈન વચ્ચે ૮૦ થી ૧૨૦ સેમી. અંતર રાખી બે આંખના કટકને બીજમાંના જીતું આપી (કાર્બોનાઇડ ૫૦ ડબલ્યુ પી. ૧ ગ્રા. / ૧ લિટર પાણી) એક પછી એક કટક ચાસમાં રહે તે રીતે રોપણી કરવી. એક આંખના રોપણનું વાવેતર કરવાનું હોય તો લાઈનમાં બે રોપા વચ્ચે ૪૮ થી ૬૦ સેમી. અંતર રાખી રોપણી કરવી. રોપણી બાદ પિયત આપી તૃદિવસમાં એટ્રોઝીન ૫૦ ડબલ્યુ પી. ગ્રી. ઈમરજન્સ ૮૦ ગ્રામ./૧૦ લી. પાણી નીદ્રાનાશક નો છંટકાવ હવામાન ચોખ્ખનું હોય ત્યારે કરવો. રોપણી સમયે શેરડીમાં ટ્રાઇક્રોમાર્ફ વિરાઇટ્નો ઉપયોગ કરવો. 	
શીયાળ કઠોળ <ul style="list-style-type: none"> વાનસ્પતિક વિકાસ અવસ્થા: <ul style="list-style-type: none"> પાક નીદ્રાનાશક મુક્ત રાખવું. આ માટે જરૂરી જણાય તો વાવણી બાદ તૂર્ણત ભલામણ મુજબની નિદ્રાનાશક દવાનો જમીન. ઉપર છંટકાવ કરવો. જરૂરિયાત મુજબ પીયત આપવું. એમોમેટિન બેન્જોએટ ૧.૮ ઈસી ૭.૫ મિલી./૧૦ લિટર પાણી મુજબ ચાળાની પોપટા કોરનારી ઈયળના 	

	<p>નિયંત્રણ માટે છંટકાવ કરવો.</p> <ul style="list-style-type: none"> • તુવેરમાં શીગ સોરી ખાનાર ઈયળના નિયંત્રણ માટે કલોરઅન્ટાનીલીપ્ર ૧૮.૫ એસસી ૩ મિલી. અથવા ફ્લુબેન્ડીઓમાઈડ ૨૦ ડબલ્યુ જી ૫ ગ્રામ અથવા ઈન્ડોક્ષાકાર્બ ૧૪.૫ એસસી ૮ મિલી. અથવા લ્યુક્સ્ન્યુરોન ૫.૪ ઈસી ૧૨ મિલી. ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેગવીને છંટકાવ કરવો.
ભીડા	<ul style="list-style-type: none"> • કુમળા અને વેચાણ લાયક ફ્લોની વીણી કરતા રેહવું. • રોગ-જીવાતવાળા અને બગડેલા ફ્લો દૂર કરવા જોઈએ. • પ્લોટમાંથી નિંદામણ દૂર કરવું. • ભીડામાં ભૂકીશારા અને પાનના ટપકના નિયંત્રણ માટે હેક્સાકોનાઓલ ૫ ઈસી ૧૦ મિલી. અથવા કાર્બન્ડાજીમ ૫૦ ડબલ્યુપી ૫ ગ્રા. પ્રતિ ૧૦ લી. પાણીમાં મીશ્ર કરી હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે છંટકાવ કરવો. • ખેતરમાંથી પીળી નસના વિપાણુ જનય છોડ ને ઉપાડી નાશ કરો. • હેક્ટરે ૪૦ ભીડામાં ફ્લો અને દુખ ની ઈયળના ફ્રેઝોમોન સાથેના ટ્રેપ મુકવા. • રોગનો ફ્લોવો સંક્રેદ માખીથી થાતો હોય, શોષક પ્રકારની જંતુ નાશક દવાનો છંટકાવ કરવો. • ભીડામાં પાન કથીરીના નિયંત્રણ માટે પ્રોપર્ગાઈટ ૫૭ ઈસી ૨૦ મિલી./૧૦ લિટર અથવા ફેનાજાકવીન ૧૦ ઈસી ૧૦ મિલી./૧૦ લિટર પાણીમાં બેળવી પાક ઉપર છંટકાવ હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે કરવો.
રીંગણુ	<ul style="list-style-type: none"> • ધરુ ૨૮-૩૦ દિવસનું થાય ત્યારે ફેરોપણી કરી દેવી. • દર બે દિવસ બાદ પાણીના ટુવા આપવા. • ફેરોપણીના ૨૦ દિવસ બાદ હેક્ટરે ૪૦ રીંગણુની ફ્લો અને દુખ ની ઈયળના ફ્રેઝોમોન સાથેના ટ્રેપ મુકવા. • રીંગણુમાં પાન કથીરીના નિયંત્રણ માટે પ્રોપર્ગાઈટ ૫૭ ઈસી ૨૦ મિલી./૧૦ લિટર અથવા ફેનાજાકવીન ૧૦ ઈસી ૧૦ મિલી./૧૦ લિટર પાણીમાં બેળવી પાક ઉપર છંટકાવ હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે કરવો.
ટામેટા	<ul style="list-style-type: none"> • ૨૫-૩૦ દિવસનું ધરુ થાય ત્યારે ફેરોપણી કરવી. • દર બે દિવસ બાદ પાણીના ટુવા આપવા. • ફેરોપણીના ૨૦ દિવસ બાદ હેક્ટરે ૪૦ લસકરી ઈયળ તથા ટમેટાની ફ્લો કોરી ખાનાર ઈયળના ફ્રેઝોમોન સાથેના ટ્રેપ મુકવા. • ટામેટાની પાનના ટપકના નિયંત્રણ માટે મેંડોજેબ ઉપ ડબલ્યુપી ૨૮ ગ્રા. પ્રતિ ૧૦ લી. પાણીમાં મીશ્ર કરી હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે છંટકાવ કરવો.
મરચી	<ul style="list-style-type: none"> • ઉપ થી ૪૦ દિવસે ધરુ રોપવા લાયક બને છે એટલે કે ફેરોપણી કરી દેવી. • દર બે દિવસ બાદ પાણીના ટુવા આપવા. • મરચીમાં ગ્રિપ્સના નિયંત્રણ માટે એસીટામીપ્રિડ ૨૦ એસ પી ૨ ગ્રામ અથવા બ્રોંક્સાનીલીડ ૨૦ એસ સી ૨.૫ મિલી. અથવા સાયઅનેન્ટ્રાની લિપ્રોલ ૧૦.૨ ડા ઓડી ૧૨ મિલી. અથવા ઈથીઓન ૫૦ થી ૩૦ મિલી. અથવા ફ્રીપ્રોનીલ ૫ અસ સી આઈસોસાઈકલોસીરમ ૮.૨ ઓડી ૧૫ મિલી. પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં બેળવી પાક ઉપર હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે છંટકાવ કરવો. • મરચીમાં પાન કથીરીના નિયંત્રણ માટે પ્રોપર્ગાઈટ ૫૭ ઈસી ૨૦ મિલી./૧૦ લિટર અથવા ફેનાજાકવીન ૧૦ ઈસી ૧૦ મિલી./૧૦ લિટર પાણીમાં બેળવી પાક ઉપર હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે છંટકાવ કરવો. • મરચીમાં ફ્લોનો સડોના નિયંત્રણ માટે કાર્બન્ડાજીમ ૫૦ ડબલ્યુપી ૧૦ ગ્રા. પ્રતિ ૧૦ લી. પાણીમાં મીશ્ર કરી હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે છંટકાવ કરવો.
ચોળી	<ul style="list-style-type: none"> • ચોળીના પાકમાં નિંદામણ કરી પ્લોટ ચોખ્ખો રાખવો અને ચોળીની વીણી કરતા રેહવું.
પરવળ	<ul style="list-style-type: none"> • પરવળના મંડપમાંથી સુકાયેલા વેલા દૂર કરવા તથા વધારાના પીલા કાપી દૂર કરવા. • ખાલા પદેલ હોય તો નવા રોપ રોપવા. • પરવળના ખામણું ગોડી, ખાતર અને પાણી આપવું.
ટિડોળા	<ul style="list-style-type: none"> • ટિડોળાના મંડપમાંથી સુકાયેલા વેલા દૂર કરવા તથા વધારાના પીલા કાપી દૂર કરવા. • ખાલા પદેલ હોય તો નવા રોપ રોપવા. • ટિડોળાના ખામણું ગોડી, ખાતર અને પાણી આપવું.
સુરણુ	<ul style="list-style-type: none"> • સુરણુના કંદની લાણુણી કરવી.
રતાળુ	<ul style="list-style-type: none"> • નિંદામણ દૂર કરી પ્લોટ ચોખ્ખો રાખવો. • વેલાની પ્રશાખાઓને ટેકા પર ચઠાવવી.
તાનિયા	<ul style="list-style-type: none"> • નિંદામણ દૂર કરી પ્લોટ ચોખ્ખો રાખવો. • કુમળા પાનની વીણી વીણી કરતા રેહવું.
આંબા	<ul style="list-style-type: none"> • આંબાનાં નાના રોપાની જગતાણી માટે ટેકો આપવાની વ્યવસ્થા કરવી જેથી વરસાદ અને વધુ પવનતી જરૂર સામે ટકી શકે. • છટાળું બાદ કપાયેલ ડાળી પર બોઝેક્સ પેસ્ટ ૧૦ ટકા લગાડવું. • આંબા નવી વાડી બનાવવા તંડુરસ્ત અને રોગમુક્ત કલમો અધિકૃત અને સરકારી નર્સરી માંથી મેળવવી જોઈએ. • નવી કલમો માટે તૈયાર કરેલ ખાડામાં ૧૦ કિગ્રા. છાણિયું ખાતર, ૧. કિગ્રા. સિંગલ સુપર સંફેટ અને ૧ કિગ્રા. મ્યુનેટ ઓફ પોટાશ ખાતર આપવું. ઉધર અને કીડીનો ઉપદ્રવ કલમોમાં જોવા મળે તો ૫૦ મિલી. ૧૦ લી. પાણીમાં કલોરપાયરીફોસ ની માવજત ખાડા પૂરતી વખતે કરી દેવી. • આંબામાં મંજિયાના નિયંત્રણ માટે ઈમિડાક્લોપ્રિડ ૧૭.૮% ૩ મિલી. અથવા થાયોમેથોક્ઝામ ૨૫% ૪ ગ્રા.

	<p>અથવા લેમડા સાયહેલોશ્રીન પદ ઈસી ૧૦ મીલી પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં સંપૂર્ણ જાડ ઉપર હવામાન ચોખ્ખુ હોય તારે છંટકાવ કરવો.</p> <ul style="list-style-type: none"> શ્રાપસની હાજરી હોય તારે તેના નિયંત્રણ માટે ટોલ્ક્ફેનપાયરાડ ૧૫ ઈસી ૨૦ મીલી/૧૦ લિટર પાણીમાં મુજબ જાડ ઉપર છંટકાવ કરવો. આંબામાં વહેલો મોર લાવવા માટે પોટેશિયમ નાઈટ્રોપ્ટ ૧% (૧ કિગ્રા./૧૦૦ લિટર પાણીમાં) ૧૫ દિવસના આંતરે છંટકાવ કરવો. ભૂકીશારા ના નિયંત્રણ માટે હેલ્પનોઓલ્ઝ પદ ઈસી ૧૦ મીલી અથવા વેટેબલ સદ્ફર ૪૦ ગ્રા. પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં મિક્સ કરી હવામાન ચોખ્ખુ હોય તારે છંટકાવ કરવો. આંબામાં મોર વહેલા લાવવા માટે વાડીમાં લીમડા સહિતની વિવિધ વનસ્પતિઓનું ધૂમાહિયું હવામાન ચોખ્ખુ હોય તારે કરવું.
ચીકુ	<ul style="list-style-type: none"> બીજા ખાતરનો ડુપ્ટો ભલામણ કરેલ ખાતરનો ૨૫ ટકા ભાગ પ્રમાણે રાસાયનિક ખાતર એમોનિયમ સદ્ફેટ ૧.૩ કિગ્રા અથવા યુરિયા ૦.૬ કિગ્રા, સિંગલ સુપર ફોસ્ફેટ ૦.૮ કિગ્રા, મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ ૦.૩ કિગ્રા, છાણિયુ ખાતર ૨૫ કિગ્રા આ મહિનામાં હવામાન ચોખ્ખુ હોય તારે આપવું.
પશુપાલન	<ul style="list-style-type: none"> પશુઓને દૂધ ઉત્પાદન અને નિભાવની જરૂરિયાત ધ્યાનમાં લઈ પૂરતા પ્રમાણમાં સમતોલ આહાર આપવો . તેમજ પશુઓના રહેઠાણ ચોખ્ખા રાખવા, દિવસ દરમાન સમયાંતરે મળ-મૂતર નો નિકાલ કરવો. પશુઓને યોગ્ય આહારમા જરૂરીયાત પ્રમાણે ખનિજ્યુકત મિશ્રણના સમાવેશ કરવો જોઈએ. ચાદ્ર કટરથી લીલા તથા સૂક્ષ્મ ધાસચારાને ટુકડા કરીને જ નીરણ કરવું. દૂધાણા પશુઓના આઉને દૂધ દોહન પહેલા અને પછી ઝિક ઓક્સાઇડ અથવા બોરીક પાઉડર અથવા પોટેશીયમ પરમેગેનેટ ના દ્રાવણથી બરાબર સાદ્ધ કરવા. પશુઓનાં દીતરીના નિયંત્રણ માટે ડેવટામેથીન અથવા એમીટાજર ૨ મી.લી./લિટર પાણીમાં નાખને છાંટવી (દવાની બોટલ ઉપર લાખેલી સૂચનાનો અમલ કરવો). પશુઓ જ્યારે ઈંછે તારે પાણી પી શકે તેવી વ્યવસ્થા ઉભી કરવી જોઈએ અથવા ઓછામાં ઓછુ દિવસમાં ચારથી પાંચ વખત જરૂરીયાત મુજબ પાણી પીવડાવવું જોઈએ. કોઢ/ગમાણની ઉચાઈ ૧૦ ફૂટથી વધારે રાખવી, જેથી હવાની હેરેફેર સરળતાથી થઈ શકે, બક્સરો/ગરમી ઓછી થાપ અને ભોયાતિયાનો ભાગ સુકો રહે. વિયામણ બાદ ગાય/બેસના બચછાને અડ્વાથી એક કલાકમાં ભીરુ/ચીક પીવડાવની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. શિયાળાના ઠંડા વાતાવરણમાં પશુઓને આરામ/સુવા માટે ધાસચારા અને પથારીની વ્યવસ્થા કરવી. ખુબ ઠંડા પવન અથવા રાત્રી દરમાન પશુને ગમાણમાં રાખવા.
વનીકરણ	<ul style="list-style-type: none"> પ્રથમ અને બીજા વર્ષના વાવેતરમાં નિંદામણ, રોપા પર ચઢેલા વેલાની કાપાણી તેમજ રોપાની આસપાસના ભાગમાં સફાઈ કરવી.
ફીશરીઝ	<ul style="list-style-type: none"> મીઠા પાણીના મંત્સ્ય મીઠા પાણીના છંગા ઉત્પાદન કરતા ખેડૂતોને જણાવવાનું કે , આ સમયગાળા દરમાન પૂરતી માત્રામાં ઓરાક આપવોકારણ કે આ વાતાવરણ માછલી/મીઠા પાણીના છંગા માટે અનુકૂળ છે. તળાવના તણિયાનું અને સપાટીનું તાપમાન સરભર કરવા એરટર અથવા પંખ ચલાવવા.

❖ એગ્રોમેટ સલાહકાર સેવા બુક્સ્ટોન કમિટીના સભ્યો :

- ડૉ. એચ. એમ. વિરદીયા, પ્રાધ્યાપક અને વડા (સંસ્કૃત વિજ્ઞાન)
- ડૉ. જે. જે. પસ્તાંજીયા, પ્રાધ્યાપક અને વડા (વનસ્પતિ કીટકશાસ્ત્ર)
- ડૉ. કે. બી. રાખોલીયા, સહ પ્રાધ્યાપક (વનસ્પતિ રોગશાસ્ત્ર)
- ડૉ. સી. જી. ઈટવાલા, સંશોધન વૈજ્ઞાનિક (શાકભાજી વિજ્ઞાન)
- ડૉ. વાય. એન. ટેલે, સહ પ્રાધ્યાપક (ફળ વિજ્ઞાન)
- ડૉ. વી. આર. પટેલ, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (પશુપાલન)
- ડૉ. એમ. બી. ટેલે, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક અને વડા (વનીકરણ)
- ડૉ. એમ. આર. પટેલ, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (ફીશરીઝ સાયન્સ)
- ડૉ. વિભા ટાક, રીસર્ચ એસોસીયેટ (જી.કે.એમ.એસ.)
- ડૉ. પી. કે. પરમાર, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (કૃપિ હવામાનશાસ્ત્ર) અને પ્રિન્સિપાલ નોડલ ઓફિસર (જી.કે.એમ.એસ.)



NAVSARI AGRICULTURAL UNIVERSITY

Gramin Krishi Mausam Sewa
 Agricultural Meteorological Cell
 Department of Agricultural Engineering
 N. M. College of Agriculture
 Navsari Agricultural University
 Navsari – 396450, Gujarat
 E-mail :- aasnnavsari@gmail.com



(Jointly issued by Navsari Agricultural University & India Meteorological Department)

DATE OF ISSUE: 20/12/2024**Agromet Advisory Bulletin No: 76/2024 - 2025****-- Navsari District --****Weather summary of preceding week (17 December to 20 December - 2024)**

Sr. No.	Name of Weather Parameters	Value
1.	Range of Rainfall (mm)	0.0
2.	Range of Maximum Temperature (°C)	31.8-33.5
3.	Range of Minimum Temperature (°C)	10.6-14.4
4.	Range of Relative Humidity (%)	27-95
5.	Range of Wind Speed (km/hr)	1.1-1.6
6.	Range of Cloud Cover (Okta)	0-0
7.	Range of bright sunshine hours (hrs)	6.2-9.0
8.	Last five days cumulative rainfall (mm)	0.0
Total Rainfall (mm)		2394.0

IMD based Weather forecast for (21 December to 25 December – 2024)

Sr. No.	Weathers Parameters	Day - 1 (21/12)	Day - 2 (22/12)	Day - 3 (23/12)	Day - 4 (24/12)	Day - 5 (25/12)
1.	Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
2.	Maximum temperature (°C)	29	30	30	30	30
3.	Minimum Temperature (°C)	17	18	17	17	18
4.	Max. Relative Humidity (%)	80	80	85	85	80
5.	Min. Relative Humidity (%)	60	60	65	65	65
6.	Wind Speed (km/hr.)	6	4	5	0	7
7.	Wind Direction (Compass point)	45	107	184	0	35
8.	Total Cloud Cover (Okta)	0	0	0	2	2


Weather Summary/ Alert	<ul style="list-style-type: none"> As per the forecast issued by India Meteorological Department over the next five days, the sky will be partly cloudy and there are chances of no rainfall. The Maximum temperature is 29 °C to 30 °C, when the Minimum temperature is 17 °C to 18 °C likely to be around. The humidity in the air is likely to be between 60 and 85 percent. The wind direction will be North-East with an average speed of 0 to 7 km/h. As per extended range forecast, above normal rainfall above normal and maximum moderately below Normal and minimum normal temperature are expected till 31th December, 2024.
-----------------------------------	--

-:: South Gujarat Heavy Rainfall Zone ::-

General Advisory <ul style="list-style-type: none"> • Farmers are advised to monitor the standing crop regularly for pest disease incidence and use the suitable recommended control measures. • Make a planning for sowing of next rabi crops. Procure certified seeds, fertilizer and agrochemicals for rabi crops. • Provide shade to newly planted/young plants of mango and apply mulch around the stem. • Farmers are advised to do the spraying chemical and fertilizer application activity as per the weather condition • Download the MEGHDOOT mobile application for Agromet Advisory Services and information on weather forecasting, which will provide weather based agricultural advice to farmers for their location, crops and livestock in their local language. Click on the following link to download the MEGHDOOT application: <p>Android users: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot</p> <p>IOS users:https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155</p> <ul style="list-style-type: none"> • Download the DAMINI Mobile application to ensure the safety through monitoring sky lightning activity. It will provide the alert and detail description of instruction, precaution, Do and Don't. Click on the following link to download the DAMINI application. <p>Android users: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightening.live.damini</p> <p>IOS users:https://apps.apple.com/app/id1502385645</p>
--

NOAA/VIIRS/BLENDED NDVI Composite ending on Week no 50
(09.12.2024 to 15.12.2024) over Agricultural region

Gujarat



Agriculture vigour is good at isolated places of the state.

Crop	Weather based Agro-Advisory
Sugarcane <ul style="list-style-type: none"> • In seed plot add Nitrogen (50 kg/ha.) Before one month of seed cutting. • Prop the sugarcanes with strong bamboos or by tying together the canes in clump to protect against rain. <p>Land preparation for new planting:</p> <ul style="list-style-type: none"> • New plantation of sugarcane crop should be done after proper preparation of land at proper moisture condition. Deep plough and level the soil. • Planting should be done from October to February. • Apply FYM/ Compost at the time of ploughing. Select healthy, diseases-insect free and immature seed materials of your selected variety. • Planting should be done at the spacing of 90 to 120 cm. 2 budded setts should be used with end to end method of planting after setts treatment with fungicide (<i>Carbendazim 50 wp @ 1g/1 lit. water</i>). If settling use intra row spacing should be 45 to 60 cm. • Within 3 days after planting and irrigation, spraying of <i>Atrazine 50 WP 80 g/10 li. water</i>. Pre-emergence weedicide should be applied to control weeds in clear weather conditions. • Application of <i>Trichoderma viride</i> in rich sugarcane pressmed at time of planting. 	

Rabi Pulse crop	<p>Vegetative growth stage :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Weeding should be done as per need or apply recommended weedicide. • Apply irrigation as per soil and climatic condition. • For management of pod borer in chickpea, apply <i>Emamectin benzoate</i> 1.9 EC @ 7.5 ml./10 lit. water. • Spray <i>Chlorantraniliprole</i> 18.5 SC @ 3.0 ml or <i>Flubendiamide</i> 20 WG @ 5 g or <i>Indoxocarb</i> 14.5 SC @ 8 ml. or <i>Lufenuran</i> 5.4 EC @ 12 ml. per 10 Lit. of water for management of Pigeonpea pod borer.
Okra	<ul style="list-style-type: none"> • Harvesting should be carried out as per the tenderness of marketable fruit • Discard damaged and diseased fruit. • Weeding should be carried out from the plot/field. • Spraying of Hexaconozole 5 EC @ 10 ml or Carbendazim 50 WP 5 g per 10 Lit of water for control of powdery mildew/leaf spot disease under clear weather condition. • 40 pheromone trap of okra fruit and shoot borer should be kept per hectare. • Up root and burn yellow vein mosaic infected okra plant from field. • Spraying systemic insecticides for whitefly (vector) management. • Spraying of <i>Propargite</i> 57 EC @ 20 ml/10 Lit. or <i>Fenazaquin</i> 10 EC @ 10 ml./10 Lit. of water for red Spider Mite during clear weather condition.
Brinjal	<ul style="list-style-type: none"> • Transplanting should be carried out when the seedlings are 28-30 days old. • After every two days, give a water to the plants. • 40 pheromone trap of brinjal fruit and shoot borer should be kept per hectare after 20 days of transplanting. • Spraying of <i>Propargite</i> 57 EC @ 20 ml./10 Lit. or <i>Fenazaquin</i> 10 EC @ 10 ml./10 Lit. of water for red Spider Mite during clear weather condition.
Tomato	<ul style="list-style-type: none"> • Transplanting should be carried out when the seedlings are 25-30 days old. • After every two days, give water to the plants. • 40 pheromone traps of <i>Spodoptera</i> and <i>Helicoverpa</i> should be kept per hectare after 20 days of transplanting. • For management of leaf spot disease, spray <i>Mancozeb</i> 75 WP @ 28 g/10 lit. of water under clear weather condition.
Chilli	<ul style="list-style-type: none"> • Seedlings of chilli become suitable for transplanting in about 35 to 40 days. • After every two days, give water to the plants. • For management of thrips spray crop with <i>Acetamiprid</i> 20 SP @ 2g or <i>Broflanilide</i> 20 SC @ 2.5 ml or <i>Cyantraniliprole</i> 10.26 OD @ 12 ml or <i>Ethion</i> 50 EC @ 30ml or <i>Isocyccloseram</i> 9.2 DC @ 12 ml or <i>Fipronil</i> 5 SC @ 15 ml per 10 liter of water under clear weather condition. • Spraying of <i>Propargite</i> 57 EC @ 20 ml./10 Lit. or <i>Fenazaquin</i> 10 EC @ 10 ml./10 Lit. of water for red Spider Mite during clear weather condition. • Spraying of Carbendazim 50 WP 10 g/10 Lit of water for control of fruit rot disease under clear weather condition.
Cow Pea	<ul style="list-style-type: none"> • Keep the plot clean by weeding and harvesting should be carried out time to time.
Pointed gourd	<ul style="list-style-type: none"> • Remove the dried vines from the mandap of pointed gourd and to remove the excess sprouting. • Plant new saplings in gap. • Hoeing, fertilizing and irrigation should be applied in pointed gourd field.
Little gourd	<ul style="list-style-type: none"> • Remove the dried vines from the mandap of little gourd and to remove the excess sprouting. • Plant new saplings in gap. • Hoeing, fertilizing and irrigation should be applied in little gourd field.
Elephant foot yam	<ul style="list-style-type: none"> • Harvesting should be carried out.
Greater yam	<ul style="list-style-type: none"> • Keeping plot clean by removing weed. • Give proper support or train branches of vines.
Tannia	<ul style="list-style-type: none"> • Keeping plot clean by removing weed. • Harvest the tender leaves of Tannia
Mango	<p>General Advise :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provide support to the young plants of mango to protect against rain and high wind speed. • Application of 10 % Bordeaux paste in cut after pruning branches of fruit tree.

	<ul style="list-style-type: none"> • Procure healthy and disease free planting material from authorized and government nursery for the new plantation. • Prepare pit for plantation of new grafts by filling 10 kg FYM, 1 kg SSP and 1 kg MOP. Give 50 ml/10 lit water Chlorpyriphos to manage termite and ants. • Spray <i>Imidacloprid</i> 17.8 % 3 ml. or <i>Thiamethoxam</i> 25 % 4 g or <i>Lambda-Cyhalothrin</i> 5 EC @ 10 ml. per 10 lit. water on mango tree for control of mango hopper and mango shoot borer during clear weather condition. • Spraying of <i>Tolfenpyrad</i> 15 EC @ 20 ml./10 lit. water for thrips management, if observed. • Spray KNO₃ 1% (1 kg/100 Lit. water) in evening cool hours to get early flowering at 15 days interval. • Spraying of <i>Hexaconazole</i> 5 EC @ 10 ml. or Wettable sulphur @ 40 g. per 10 lit. for control of powdery mildew in clear weather condition. • Do smudging with some neem based and other botanicals to get early flowering in mango during clear weather condition.
Sapota	General Advise : <ul style="list-style-type: none"> • Apply second split of 25% of RDF (Ammonium Sulphate -1.3 kg or Urea 0.6 kg, SSP 0.8 kg and MOP 0.3 kg + FYM 25 kg each tree) in clear weather condition.
Livestock	<ul style="list-style-type: none"> • Provide adequate quantity of balanced ration by considering the milk production and maintenance. • Good quality dry roughage with 15-20 kg green fodder provided to the animals, only after chaffing. • Feed silage & hay materials if available. • Before and after milking udder must be properly clean with zinc oxide or boric powder or potassium permanganate solutions. • For the control of tick and other parasites, spray <i>Deltemethrin</i> or <i>Aemitaz</i> 2 ml in 1 liter of water. • Height of animal shed should keep minimum 10 feet for aeration to maintain the floor dry and to control humidity. • After calving, the young cattle/Buffalo should get colostrums within half to one hour. • Provide bedding material in cold climatic condition.
Forestry	<ul style="list-style-type: none"> • Weeding climber cutting and cleaning should be carried out in first and second year plantations.
Fisheries	<ul style="list-style-type: none"> • Fresh water farmers give proper feed in fish/prawn farming for better growth rate because environment condition is very suitable. • Increase water depth and maintain water level through pond outlet. • Mixing the top and bottom water by using the aerators or pumps.

❖ **Members of Agro-Advisory Committee :**

- Dr. H. M. Viradia, Professor & Head (Agronomy)
- Dr. J. J. Pastagia, Professor & Head (Entomology)
- Dr. K. B. Rakholiya, Associate Professor (Plant Pathology):
- Dr. C. G Intwala, Research Scientist (Vegetable Science)
- Dr. Y. N. Tandel, Associate Professor (Fruit Science)
- Dr. V. R. Patel, Assistant Professor (Animal Husbandry)
- Dr. M. B. Tandel, Assistant Professor (Forestry) & I/C Head (SAF) (Forestry)
- Dr. M. R. Patel, Assistant Professor (Fisheries Science)
- Dr. Vibha Tak, Research Associate(GKMS)
- Dr. P. K. Parmar, Assistant Professor (Agricultural Meteorology and Principal Nodal Officer (GKMS))

દવામાન આગાહી

વિગત	તારીખ	દાંડા	નવચારી	વલચાર
વરસાદની શ્રેણી (મી.મી.)	૨૧/૧૨/૨૦૨૪	૦	૦	૦
	૨૨/૧૨/૨૦૨૪	૦	૦	૦
	૨૩/૧૨/૨૦૨૪	૦	૦	૦
	૨૪/૧૨/૨૦૨૪	૦	૦	૦
	૨૫/૧૨/૨૦૨૪	૦	૦	૦
મહત્વમાન (સે.ગ્રે.)	૨૧/૧૨/૨૦૨૪	૩૨	૨૬	૨૬
	૨૨/૧૨/૨૦૨૪	૩૨	૩૦	૩૦
	૨૩/૧૨/૨૦૨૪	૩૨	૩૦	૩૦
	૨૪/૧૨/૨૦૨૪	૩૧	૩૦	૩૦
	૨૫/૧૨/૨૦૨૪	૩૧	૩૦	૩૦
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૧/૧૨/૨૦૨૪	૧૪	૧૭	૧૭
	૨૨/૧૨/૨૦૨૪	૧૫	૧૮	૧૮
	૨૩/૧૨/૨૦૨૪	૧૪	૧૭	૧૭
	૨૪/૧૨/૨૦૨૪	૧૪	૧૭	૧૭
	૨૫/૧૨/૨૦૨૪	૧૫	૧૮	૧૮
મહત્વમાન ભેજ (%)	૨૧/૧૨/૨૦૨૪	૮૦	૮૦	૮૦
	૨૨/૧૨/૨૦૨૪	૮૦	૮૦	૮૦
	૨૩/૧૨/૨૦૨૪	૬૦	૮૪	૮૪
	૨૪/૧૨/૨૦૨૪	૮૪	૮૪	૮૪
	૨૫/૧૨/૨૦૨૪	૮૦	૮૦	૮૦
લઘુત્તમ ભેજ (%)	૨૧/૧૨/૨૦૨૪	૫૦	૫૦	૫૦
	૨૨/૧૨/૨૦૨૪	૫૦	૫૦	૫૦
	૨૩/૧૨/૨૦૨૪	૫૦	૫૫	૫૫
	૨૪/૧૨/૨૦૨૪	૫૫	૫૫	૫૫
	૨૫/૧૨/૨૦૨૪	૫૫	૫૫	૫૫
પવનની ગતિ(ક્રિ.મી./કલાક)	૨૧/૧૨/૨૦૨૪	૪	૫	૫
	૨૨/૧૨/૨૦૨૪	૫	૪	૫
	૨૩/૧૨/૨૦૨૪	૫	૫	૫
	૨૪/૧૨/૨૦૨૪	૩	૦	૨
	૨૫/૧૨/૨૦૨૪	૩	૭	૬
પવનની દિશા (ક્રમપાસ પોઈન્ટ)	૨૧/૧૨/૨૦૨૪	SE	NE	E
	૨૨/૧૨/૨૦૨૪	SE	E	SE
	૨૩/૧૨/૨૦૨૪	SE	S	SE
	૨૪/૧૨/૨૦૨૪	SE	SE	E
	૨૫/૧૨/૨૦૨૪	E	NE	NE
વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટો)	૨૧/૧૨/૨૦૨૪	૦	૦	૦
	૨૨/૧૨/૨૦૨૪	૦	૦	૦
	૨૩/૧૨/૨૦૨૪	૦	૦	૦
	૨૪/૧૨/૨૦૨૪	૨	૨	૨
	૨૫/૧૨/૨૦૨૪	૨	૨	૨