



નવસારી કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલય

ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા

કૃષિ હવામાનશાસ્ત્ર સેલ
કૃષિ ઈજનેરી વિભાગ, ન. મ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય
નવસારી કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલય
નવસારી - ૩૮૪૪૫૦, ગુજરાત

ઇ-મેઇલ:- aasnavsari@gmail.com



ભારત મૌસમ વિજ્ઞાન
વિભાગ

(નવસારી કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલય અને ભારત મૌસમ વિજ્ઞાન વિભાગ દ્વારા પ્રસારિત)

જારી કરવાની તારીખ: ૦૮/૦૮/૨૦૨૬

કૃષિ હવામાન બુલેટીન નં : ૪૬/૨૦૨૬ - ૨૦૨૭

-- નવસારી જિલ્લો --

પાછળનાં સમયનું હવામાન (તા. ૦૩ સપ્ટેમ્બર થી ૦૮ સપ્ટેમ્બર - ૨૦૨૬)

અનુ. નં.	હવામાન પરિબલો	Value
૧.	વરસાદની શ્રેણી (મી.મી.)	૦.૦-૨.૦
૨.	મહત્તમ તાપમાનની શ્રેણી (સે.ગ્રે.)	૩૧.૦-૩૨.૨
૩.	લઘુત્તમ તાપમાનની શ્રેણી (સે.ગ્રે.)	૨૬.૫-૨૭.૫
૪.	ભેજની શ્રેણી (%)	૭૭-૮૮
૫.	પવનની ગતિની શ્રેણી (કિ.મી./કલાક)	૩.૭-૫.૨
૬.	વાદળની સ્થિતિની શ્રેણી (ઓકટા)	૩-૭
૭.	સૂર્યપ્રકાશિત સમયની શ્રેણી (કલાક)	૧.૮-૭.૪
૮.	પાછળના પાંચ દિવસમાં સંચિત વરસાદ (મી.મી.)	૨.૦
કુલ વરસાદ		૧૮૩૨.૦

આઈ. એમ. ડી. દ્વારા પ્રાપ્ત હવામાન આગાહી (તા ૦૮ સપ્ટેમ્બર મે થી ૧૩ સપ્ટેમ્બર - ૨૦૨૬)

અનુ. નં.	હવામાન પરિબલો	દિવસ-૧ (૦૮/૦૮)	દિવસ-૨ (૧૦/૦૮)	દિવસ-૩ (૧૧/૦૮)	દિવસ-૪ (૧૨/૦૮)	દિવસ-૫ (૧૩/૦૮)
૧.	વરસાદ (મી.મી.)	૧૮	૨૨	૨૦	૨૨	૩૩
૨.	મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૩૨	૩૨	૩૨	૩૨	૩૨
૩.	લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૫	૨૫	૨૫	૨૪	૨૪
૪.	મહત્તમ ભેજ (%)	૮૦	૮૫	૮૦	૮૫	૮૫
૫.	લઘુત્તમ ભેજ (%)	૭૫	૭૫	૭૫	૭૦	૭૫
૬.	પવનની ગતિ (કિ.મી./કલાક)	૮	૮	૮	૮	૮
૭.	પવનની દિશા (કમ્પાસ પોઇન્ટ)	૨૫૧	૨૪૫	૨૩૮	૨૩૫	૨૩૪
૮.	વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	૫	૬	૫	૫	૬

વિસ્તૃત શ્રેણીની આગાહી મુજબ, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૬ થી ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૬ સુધી સામાન્યથી નીચે વરસાદની સંભાવના છે અને મહત્તમ અને લઘુત્તમ તાપમાન સામાન્ય રહેવાની ધારણા છે.

હવામાન સારાંશ / ચેતવણી	- આઈ. એમ. ડી., દ્વારા મળેલી હવામાનની આગાહી મુજબ આગામી પાંચ દિવસમાં આકાશમાં વાદળછાયું રહેશે અને મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે. - મહત્તમ તાપમાન ૩૨ સે, જ્યારે લઘુત્તમ તાપમાન ૨૪ સે. થી ૨૫ સે. આસપાસ હોવાની સંભાવના છે. - હવામાં ભેજનું પ્રમાણ ૭૦ થી ૮૫ ટકા વચ્ચે રહેવાની સંભાવના છે. - પવનની દિશા દક્ષિણ-પશ્ચિમ રહેશે જેની સરેરાશ ગતિ ૮ થી ૮ કિ.મી./કલાક રહેવાની શક્યતા છે.
-------------------------------	---

-:: દક્ષિણ ગુજરાત ભારે વરસાદ વિસ્તાર ::-

સામાન્ય સલાહ	- જો પવનની ગતિ ૧૫ કિમી પ્રતિ ક્લાક કરતાં વધુ હોય તો ખેતરમાં કેમિકલ જેવાકે પેસ્ટિસાઈડ નો છંટકાવ ન કરવો. - તેજ પવનથી રક્ષણ માટે ઊભા બાગાયતી અને શાકભાજી પાકોને વાંસ અથવા લાકડાના ટેકા આપવા. - જમીનમાં ભેજનું નિરીક્ષણ કરી પાકની જરૂરિયાત મુજબ પિયત આપવું. - વાદળછાયા અને ભેજવાળા વાતાવરણમાં ફૂજજન્ય રોગો અને ચૂસિયા જીવાતો માટે પાકનું નિયમિત નિરીક્ષણ કરવું. - વાતાવરણ યોખ્ખું હોય અને પવનની ઝડપ ઓછી હોય ત્યારે જ દવાનો છંટકાવ કરવો. - યોગ્ય વરાપની સ્થિતિમાં આંતરખેડ અને નીંદણ કરીને ખેતરને નીંદણમુક્ત રાખવું. - કની જરૂરિયાત અને ભલામણ મુજબ જરૂરી કૃષિ ઉત્પાદન ઘટકોનો ઉપયોગ કરવો. - શેરડીના પાકને તેજ પવન અને ભારે વરસાદથી બચાવવા માટે આજુબાજુના સાંઠાઓને એકસાથે બાંધી દેવા અથવા વાંસના ટેકા આપવા. - કૃષિ હવામાન સલાહકારી બુલેટીન અને હવામાનની આગાહી અંગેની માહિતી મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો મેઘદૂત મોબાઈલ એપ્લિકેશન, જે ખેડૂતોને તેમની સ્થાનિક ભાષામાં સ્થાન, પાક અને પશુધન વિશે હવામાનઆધારિત કૃષિ સલાહ પ્રદાન કરશે. મેઘદૂત એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો: એન્ડ્રોઈડ યુઝર્સ:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot આઈ.ઓ.એસ. યુઝર્સ:https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155 - દામિની મોબાઈલ એપ્લિકેશનદ્વારા આકાશીય વિજળીની અગાઉથી ચેતવણી આપવામાં આવે છે તેમજ આકાશીય વિજળીથી બચવા શું કરવું અને શું નહિ કરવું તેની વિગતવાર માહિતી પૂરી પાડવામાં આવે છે. આથી ખેડુતમિત્રોને દામિની મોબાઈલ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. દામિની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લીંક પર ક્લિક કરો: એન્ડ્રોઈડ યુઝર્સ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightening.live.damini આઈ.ઓ.એસ. યુઝર્સ:https://apps.apple.com/app/id1502385645
પાક	હવામાન આધારિત કૃષિ સલાહ
શેરડી	વાનસ્પતિક વિકાસ અવસ્થા/મહત્તમ પ્રપિ અવસ્થા - રોપણીના ૬, ૭ અને ૮ માસ બાદ સૂકા પાન કાઢીને તેનો ઉપયોગ આવરણ તરીકે કરો. - અંગારીઓ અને સુકરા રોગના નિયંત્રણ માટે રોગીસ્ત છોડનો નાશ કરવો - કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ ડબલ્યુપી ૧૦ ગ્રા./૧૦ લી. પાણીમાં મિક્સ કરી હવામાન યોખ્ખુ હોય ત્યારે તંદુરસ્ત છોડની નજીક છંટકાવ કરો. - શેરડીના પાકમાં આજુબાજુના સાંઠાઓને બાંધી દેવા જેથી પવનની ઝડપ તેમજ વધુ વરસાદ સામે ટકી શકે. - શેરડીની સફેદમાખીના નિયંત્રણ માટે લીમડા આધારિત એઝાડીરેક્ટીન ૧૦૦૦૦ પીપીએમ ૨૦ મિલી./૧૦ લી. પાણીમાં મીશ્ર કરી હવામાન યોખ્ખુ હોય ત્યારે છંટકાવ કરવો. અથવા - શેરડીમાં સફેદમાખી (Sugarcane Whitefly)ના અસરકારક નિયંત્રણ માટે લિંબોડીના તેલ ૦.૫% @ ૧૦ લિટર પાણીમાં ૫૦ મિ.લી. તથા ૧૦ ગ્રામ ડિટરજન્ટ પાવડર ભેળવી પ્રથમ છંટકાવ સફેદમાખીનો ઉપદ્રવ શરૂ થાય ત્યારે અને બીજો છંટકાવ પ્રથમ છંટકાવના ૧૦ દિવસ પછી હવામાન યોખ્ખુ હોય ત્યારે કરવો. - શેરડીની સફેદમાખીના કોશેટાવાળા પાન ૩૦ મેશની જાળીથી બનાવેળ પિંજરમાં મૂકવાથી સફેદમાખી પિંજરની અંદર રહેશે અને તેના પરજીવી બહાર નીકળશે અને સફેદમાખીનું પરજીવીકરણ કરશે.
ચોમાસુ ડાંગર	ફૂલ અવસ્થા: - ક્યારીમાં ૨-૩ સે. મી. જેટલું પાણી ભરી રાખવું. - ભલામણ મુજબ નાઈટ્રોજન ખાતરના હપ્તા સમયસર આપવાં. બીજા હપ્તામાં ૨૦ કિ. ગ્રા. નાઈટ્રોજન પ્રતિ હેક્ટર ફેરોપાણીના ૪૦-૪૫ દિવસે આપવો. - ફેરોપાણી બાદ ૪૫ દિવસ સુધી પાક નિંદણ મુક્ત રાખવો જરૂરિયાત મુજબ હાથથી નિંદણ અને પેડી વીડરથી આંતરખેડ અથવા ભલામણ કરેલ 'પોસ્ટ-ઈમર્જન્સ' (ઉગાવો થયા પછી વપરાતા) નીંદણનાશકનો ઉપયોગ કરવો. - ડાંગરમાં ફેરોપાણી બાદ વરસાદની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, ગાભમારાની ઈયળના નિયંત્રણ માટે ફ્લુબેન્ડાએમાઈડ ૨૦ ડબલ્યુજી @ ૨.૫ ગ્રામ અથવા ક્લોરાન્ટ્રાનિલિપ્રોલ ૧૮.૫ એસસી @ ૩ મિલી અથવા કાર્ટેપ હાઈડ્રોક્લોરાઈડ ૭૫ એસજી @ ૧૦ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરી હવામાન યોખ્ખુ હોય ત્યારે છંટકાવ કરવો.
તુવેર	નીંદણ અને આંતર-પાક કામગીરી હવામાન યોખ્ખુ હોય ત્યારે હાથ ધરવી જોઈએ.



ભીંડા	- ભીંડામાં શીંગોની વીણી ચાલુ હોય ત્યારે પિયતની ખેંચ ન વર્તાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. - ખેતરમાંથી પીળી નસના વિપાણુ જન્ય છોડ ને ઉપાડી નાશ કરો. - રોગનો ફેલાવો સફેદ માખીથી થાતો હોય, સાયઅએન્ટ્રાનીલિપ્રોલ ૧૦.૨૬ ઓડી ૧૮ મિલી અથવા ડાઇફેનિથાઇરોન ૫૦ ડબલ્યુ પી ૧૨ ગ્રા. પ્રતિ ૧૦ લી. પાણીમાં ભેળવી પાક ઉપર છંટકાવ હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે કરવો. - ભીંડામાં પાન કથીરીના નિયંત્રણ માટે પ્રોપર્ગાઈટ ૫૭ ઈસી ૨૦ મિલી./૧૦ લીટર અથવા ફેનાઝાક્વીન ૧૦ ઈસી ૧૦ મિલી./૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી પાક ઉપર છંટકાવ હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે કરવો.
રીંગણ	ધરૂ ૨૮-૩૦ દિવસનું થાય ત્યારે ફેરોપણી કરવી.
ટામેટા	ધરૂ ૨૫-૩૦ દિવસનું થાય ત્યારે ફેરોપણી કરવી.
મરચી	મરચીનું ધરૂ લગભગ ૩૫ થી ૪૦ દિવસે રોપવા લાયક બને છે.
પરવળ	ફળની પરિપક્વતા મુજબ લણણી કરવી.
ટિંડોળા	ફળની પરિપક્વતા મુજબ લણણી કરવી.
સુરણ	- નિદાંમણના નાશ માટે યોગ્ય પગલાં લેવા. ૫૦:૦૦:૩૭.૫ કિલો પ્રતિ હેક્ટર પ્રમાણે નાઈટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટાશ (યુરિયા ૧૦૮ કિલો અને મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ ૬૩ કિલો પ્રતિ હેક્ટર) પ્રમાણે આપવું.
રતાળુ	- નિદાંમણના નાશ માટે યોગ્ય પગલાં લેવા. - વેલાની પ્રશાખાઓને ટેકા પર ચઢાવવી. ૪૦:૦૦:૪૦ કિલો પ્રતિ હેક્ટર પ્રમાણે નાઈટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટાશ (યુરિયા ૮૭ કિલો અને મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ ૬૩ કિલો પ્રતિ હેક્ટર) પ્રમાણે આપવું.
તાનિયા	- નિદાંમણના નાશ માટે યોગ્ય પગલાં લેવા. - યોગ્ય કુમળા પાનની વીણી શરૂ કરવી. ૪૦:૦૦:૪૦ કિલો પ્રતિ હેક્ટર પ્રમાણે નાઈટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટાશ (યુરિયા ૮૭ કિલો અને મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ ૬૩ કિલો પ્રતિ હેક્ટર) પ્રમાણે આપવું.
આંબા	- આંબાના મેઢની ઈયળો થડમાંથી શોધીને મારી નાખો અને કાણાંની અંદર ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦ ઈસી @ ૨૫ મી.લી./૧૦ લી. દ્રાવણ નાંખી કાઢવથી કાણાં બંધ કરી દેવા. - કપાયેલ ડાળી પર બોડકસ પેસ્ટ ૧૦ ટકા લગાડવું. - આંબાનાં નાના રોપાની જાળવણી માટે ટેકો આપવાની વ્યવસ્થા કરવી જેથી વરસાદ અને વધુ પવનની ઝડપ સામે ટકી શકે. - નવી ક્લમો માટે તૈયાર કરેલ ખાડામાં ૧૦ કિગ્રા. છાણિયું ખાતર, ૧ કિગ્રા. સિંગલ સુપર સલ્ફેટ અને ૧ કિગ્રા. મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ ખાતર આપવું. ઉધઈ અને કીડીનો ઉપદ્રવ ક્લમોમાં જોવા મળે તો ૫૦ મિલી / ઝાડ ક્લોરપાયરીફોસ ની માવજત ખાડા પૂરતી વખતે કરી દેવી. - આંબામાં નાના રોપાની જાળવણી માટે ટેકો આપવાની વ્યવસ્થા કરવી જેથી વરસાદ અને વધુ પવનની ઝડપ સામે ટકી શકે. - આંબાવાડીમાં પુખ્ત ઝાડ દિઠ ૧૦૦ કિગ્રા. છાણિયું ખાતર, ૮૦૦ ગ્રામ યુરિયા અથવા ૧.૮ કિગ્રા. અમોનિયમ સલ્ફેટ ૧.૦ કિગ્રા. સિંગલ સુપર સલ્ફેટ અને ૧.૩ કિગ્રા. મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ ખાતર ચોમાસામાં આપવું. - આંબાવાડીયામાં રાસાયણિક ખાતર આપ્યાના ૧૫ દિવસ પહેલા અથવા પછી બાયોફિટિલાઈઝર જેવા કે એઝોટોબેક્ટર ૫૦ મિલી., ફોસ્ફેટ સોલ્યુબિલિઝિંગ બેક્ટેરિયા ૫૦ મિલી., પોટાશ મોબિલિઝિંગ બેક્ટેરિયા ૫૦ મિલી. અને ટ્રાયકોડર્મા ૧૦૦ ગ્રામ. પ્રતિ ઝાડ આપવું.
ચીકુ	- ચીકુનાં નાના રોપાની જાળવણી માટે ટેકો આપવાની વ્યવસ્થા કરવી જેથી વરસાદ અને વધુ પવનની ઝડપ સામે ટકી શકે. - ચીકુની નવી વાડી બનાવવા તંદુરસ્ત અને રોગમુક્ત ક્લમો અધિકૃત અને સરકારી નર્સરી માંથી મેળવવી જોઈએ. - નવી ક્લમો માટે તૈયાર કરેલ ખાડામાં ૧૦ કિગ્રા. છાણિયું ખાતર, ૧ કિગ્રા. સિંગલ સુપર સલ્ફેટ અને ૧ કિગ્રા. મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ ખાતર આપવું. - ઉધઈ અને કીડીનો ઉપદ્રવ ક્લમોમાં જોવા મળે તો ૫૦ મિલી / ઝાડ ક્લોરપાયરીફોસ ની માવજત ખાડા પૂરતી વખતે કરી દેવી. - બીજા ખાતરનો હુપ્તો ભલામણ કરેલ ખાતરનો ૨૫ ટકા ભાગ પ્રમાણે રાસાયણિક ખાતર એમોનિયમ સલ્ફેટ ૧.૩ કિગ્રા અથવા યુરિયા ૦.૬ કિગ્રા, સિંગલ સુપર ફોસ્ફેટ ૦.૮ કિગ્રા, મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ ૦.૩ કિગ્રા, છાણિયું ખાતર ૨૫ કિગ્રા આ મહિનામાં હવામાન ચોખ્ખુ હોય ત્યારે આપવું.

❖ એગ્રોમેટ સલાહકાર સેવા બુલેટીન કમિટીના સભ્યો :

- ડૉ. એચ. એમ. વિરડીયા, પ્રાધ્યાપક અને વડા (સશ્ય વિજ્ઞાન)
- ડૉ. જે. જે. પરતાગીયા, પ્રાધ્યાપક અને વડા (વનસ્પતિ કીટકશાસ્ત્ર)
- ડૉ. વાય. એન. ટેડેલ, પ્રાધ્યાપક (કૃષિ વિજ્ઞાન)
- ડૉ. વિભા ટાક, રીસર્ચ એસોસીયેટ (જી.કે.એમ.એસ.)
- ડૉ. બી. એમ. મોટે, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (કૃષિ હવામાનશાસ્ત્ર) અને પ્રિન્સિપાલ નોડલ ઓફિસર (જી.કે.એમ.એસ.)

NOAA/VIIRS/BLENDED NDVI Composite ending on Week no 35
(27.08.2026 to 02.09.2026) over Agricultural region

Gujarat



Agriculture vigour is moderate over the state.

Source: <https://www.star.nesdis.noaa.gov>

NAVSARI AGRICULTURAL UNIVERSITY
AMFU_Navsari



Gramin Krishi Mausam Sewa

Agricultural Meteorological Cell
Department of Agricultural Engineering
N. M. College of Agriculture
Navsari Agricultural University
Navsari – 396450, Gujarat
E-mail :- aasnavsari@gmail.com



(Jointly issued by Navsari Agricultural University & India Meteorological Department)

DATE OF ISSUE: 08/09/2026

Agromet Advisory Bulletin No: 46/2026 - 2027

-- Navsari District --

Weather summary of preceding week (03 September to 08 September -2026)

Sr. No.	Name of Weather Parameters	Value
1.	Range of Rainfall (mm)	0.0-2.0
2.	Range of Maximum Temperature (°C)	31.0-32.2
3.	Range of Minimum Temperature (°C)	26.5-27.5
4.	Range of Relative Humidity (%)	77-98
5.	Range of Wind Speed (km/hrs)	3.7-5.2
6.	Range of Cloud Cover (Okta)	3-7
7.	Range of bright sunshine hours (hrs)	1.8-7.4
8.	Last five days cumulative rainfall (mm)	2.0
Total Rainfall (mm)		1832.0

IMD based Weather forecast for (09 September to 13 September - 2026)

Sr. No.	Weathers Parameters	Day - 1 (09/09)	Day - 2 (10/09)	Day - 3 (11/09)	Day - 4 (12/09)	Day - 5 (13/09)
1.	Rainfall (mm)	18	22	20	22	33
2.	Maximum temperature (°C)	32	32	32	32	32
3.	Minimum Temperature (°C)	25	25	25	24	24
4.	Max. Relative Humidity (%)	90	85	90	85	95
5.	Min. Relative Humidity (%)	75	75	75	70	75
6.	Wind Speed (km/hr.)	9	8	8	8	8
7.	Wind Direction (Compass point)	251	245	238	235	234
8.	Total Cloud Cover (Okta)	5	6	5	5	6

According to the extended range forecast, below normal rainfall is expected. Maximum and minimum temperatures are expected to be normal till 13th September to 19th September, 2026.

Weather Summary/ Alert

- As per the forecast issued by India Meteorological Department over the next five days, the sky will be cloudy and there are chances of medium rainfall.
- The Maximum temperature is 32 °C, when the Minimum temperature is 24 °C to 25 °C, likely to be around.
- The humidity in the air is likely to be between 70 and 95 percent.
- The wind direction will be South-West with an average speed of 8 to 9 km/h.

-:: South Gujarat Heavy Rainfall Zone ::-



General Advisory	- If Wind speed is high >15 kmph, so avoid spraying of pesticide. - Provide mechanical support to horticultural and vegetable crops during forecasts of high wind velocity. - Monitor soil moisture and irrigate crops as per requirement. - Regularly monitor crops for fungal diseases and sucking pests under cloudy and humid conditions. - Carry out spraying only during clear weather and calm wind conditions. - Undertake intercultural operations and manual weeding under suitable Vapsa conditions to keep fields weed-free. - Farmers are advised to apply necessary inputs in the field. - Prop the sugarcane canes with bamboos or tie the canes together in a clump with sugarcane leaves to protect against wind and heavy rain. - Download the MEGHDOOT mobile application for Agromet Advisory Services and information on weather forecasting, which will provide weather based agricultural advice to farmers for their location, crops and livestock in their local language. Click on the following link to download the MEGHDOOT application: Android users: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot IOS users: https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155 - Download the DAMINI Mobile application to ensure the safety through monitoring sky lightning activity. It will provide the alert and detail description of instruction, precaution, Do and Don't. Click on the following link to download the DAMINI application. Android users: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lighteninglive.damini IOS users: https://apps.apple.com/app/id1502385645
Crop	Weather based Agro-Advisory
Sugarcane	Vegetative Stage/Grand Growth stage: - After 6, 7 & 8 month of planting remove dry leaves and use it as mulch. - Up root and burn whip smut and wilted plant from field. - Drenching of <i>Carbendazim</i> 50 wp 10gm/10 lit water from prevent spread of both disease (Sugarcane red rot & Wilt) nearby healthy plants during clear weather condition. - Prop the sugarcane canes with bamboos or tie the canes together in a clump with sugarcane leaves to protect against wind and heavy rain. - Putting sugarcane leaves having whitefly puparia in 30 mesh wire cage. The adult whitefly emerge from puparia remain inside cage and parasitoid will come out and parasitize other whiteflies. - Spraying <i>Azadirachtin</i> 10000 ppm @ 20 ml/10 lit. of water for management of sugarcane whitefly. Or - Application of neem oil 0.5% (50 ml + 10 g detergent powder/10 litre water) first when initiation of sugarcane whitefly and second spray at 10 days after first spray for effective management of sugarcane whitefly under clear weather condition.
Kharif Paddy	Flowering stage/Reproductive stage: - Keeps 2-3 cm standing water in field during vegetative/Reproductive growth. - Apply split dose of Nitrogen fertilizer as per recommendation. i.e. 2nd dose @ 20 kg N/ha at 40-45 days after transplanting. - Keep field weed free by hand weeding and intercultural with paddy weeder or by application of recommended post-emergence weedicide upto 45 days after transplanting. - After transplanting in paddy crop, monitor the crop condition and depending on rainfall, spraying of <i>Flubendiamide</i> 20 WG @ 2.5 g or <i>Chlorantraniliprole</i> 18.5 SC @ 3 ml or <i>Cartap hydrochloride</i> 75 SG @ 10 g per 10 litres of water during clear weather conditions for management of stem borer.
Pigeon Pea	Weeding and intercultural operations should be carried out during clear weather condition.
Okra	Special care should be taken that enough water should be supplied during the

	period of harvesting. - Up root and burn yellow vein mosaic infected okra plant from field during clear weather condition. - Spraying <i>Cyantraniliprole</i> 10.26 OD @ 18 ml or <i>Difenthiuron</i> 50 WP @ 12 g/10 Lit. for whitefly (vector) management during clear weather condition. - Spraying of <i>Propargite</i> 57 EC @ 20 ml/10 Lit. or <i>Fenazaquin</i> 10 EC @ 10 ml./10 Lit. of water for red Spider Mite during clear weather condition.
Brinjal	➤ Transplanting should be carried out when the seedlings are 28-30 days old.
Tomato	➤ Transplanting should be carried out when the seedlings are 25-30 days old.
Chilly	➤ Seedlings of chilli become suitable for transplanting in about 35 to 40 days.
Pointed gourd	➤ Harvesting should be carried out as per maturity.
Little gourd	➤ Harvesting should be carried out as per maturity.
Elephant foot yam	- Apply fertilizer 50: 00: 37.5 NPK kg/ha. (109 kg Urea and 63 kg MOP per hectare). - Take measures for weed control.
Greater yam	- Take measures for weed control. - Give proper support or train branches of vines. - Apply fertilizer 40:00:40 NPK kg/ha. (87 kg Urea and 67 kg MOP per hectare).
Tannia	- Take measures for weed control. - Harvest the suitable tender leaves of Tannia. - Apply fertilizer 40:00:40 NPK kg/ha. (87 kg Urea and 67 kg MOP per hectare).
Mango	- Find grubs of stem borer from gallery and holes on the stem and kill them. Do pouring of <i>Chlorpyrifos</i> 20 EC @ 25 ml/ 10 lit in hole and plug it with mud in clear weather condition. - Procure healthy and disease free planting material from authorized and government nursery for the new plantation. - Application of 10 % Bordeaux paste in cut/pruning branches of fruit tree during clear weather condition. - Prepare pit for plantation of new grafts by filling 10 kg FYM, 1 kg SSP and 1 kg MOP. Give 50 ml/tree <i>Chlorpyrifos</i> to manage termite and ants during clear weather condition. - Provide support to the young plants of mango plants to protect against rain and high wind speed. - Apply recommended dose of fertilizer per tree @ 800 g Urea or 1.8 kg Ammonium Sulphate, 1.0 kg SSP and 1.3 kg MOP along with 100 kg FYM to adult tree. - In addition RDF, give biofertilizers viz., <i>Azotobactor</i> 50 ml, PSB 50 ml, KMB 50 ml and <i>Trichoderma</i> 100 g per adult tree in monsoon. Before or after 15 days of fertilizer application.
Sapota	- Provide support to the young plants of Sapota plants to protect against rain and high wind speed. - Procure healthy and disease free planting material from authorized and government nursery for the new plantation. - Prepare pit for plantation of new grafts by filling 10 kg FYM, 1 kg SSP and 1 kg MOP. - Give 50 ml/tree <i>Chlorpyrifos</i> to manage termite and ants during clear weather condition. - Apply second split of 25% of RDF (Ammonium Sulphate -1.3 kg or Urea 0.6 kg, SSP 0.8 kg and MOP 0.3 kg + FYM 25 kg each tree) in clear weather condition.

❖ **Members of Agro-Advisory Committee :**

- Dr. H. M. Viradia, Professor & Head (Agronomy)
- Dr. J. J. Pastagia, Professor & Head (Entomology)
- Dr. Y. N. Tandel, Professor (Fruit Science)
- Dr. Vibha Tak, Research Associate(GKMS)
- Dr. B. M. Mote, Assistant Professor (Agricultural Meteorology and Principal Nodal Officer (GKMS)

Gujarat



Agriculture vigour is moderate over the state.

Source: <https://www.star.nesdis.noaa.gov>



NAVSARI AGRICULTURAL UNIVERSITY
AMFU_Navsari

હવામાન આગાહી

વિગત	તારીખ	ડાંગ	નવસારી	વલસાડ
વરસાદની શ્રેણી (મી.મી.)	૦૮/૦૮/૨૦૨૬	૨૦	૧૮	૧૮
	૧૦/૦૮/૨૦૨૬	૧૮	૨૨	૨૦
	૧૧/૦૮/૨૦૨૬	૨૨	૨૦	૨૨
	૧૨/૦૮/૨૦૨૬	૨૫	૨૨	૨૫
	૧૩/૦૮/૨૦૨૬	૩૦	૩૩	૩૫
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૦૮/૦૮/૨૦૨૬	૩૦	૩૨	૩૨
	૧૦/૦૮/૨૦૨૬	૩૦	૩૨	૩૨
	૧૧/૦૮/૨૦૨૬	૩૧	૩૨	૩૨
	૧૨/૦૮/૨૦૨૬	૩૧	૩૨	૩૨
	૧૩/૦૮/૨૦૨૬	૩૨	૩૨	૩૨
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૦૮/૦૮/૨૦૨૬	૨૫	૨૫	૨૫
	૧૦/૦૮/૨૦૨૬	૨૬	૨૫	૨૫
	૧૧/૦૮/૨૦૨૬	૨૫	૨૫	૨૫
	૧૨/૦૮/૨૦૨૬	૨૫	૨૪	૨૪
	૧૩/૦૮/૨૦૨૬	૨૫	૨૪	૨૪
મહત્તમ ભેજ (%)	૦૮/૦૮/૨૦૨૬	૯૫	૯૦	૯૦
	૧૦/૦૮/૨૦૨૬	૯૫	૮૫	૮૫
	૧૧/૦૮/૨૦૨૬	૯૫	૯૦	૯૦
	૧૨/૦૮/૨૦૨૬	૯૫	૮૫	૮૫
	૧૩/૦૮/૨૦૨૬	૯૫	૯૫	૯૫
લઘુત્તમ ભેજ (%)	૦૮/૦૮/૨૦૨૬	૭૫	૭૫	૭૫
	૧૦/૦૮/૨૦૨૬	૭૫	૭૫	૭૫
	૧૧/૦૮/૨૦૨૬	૭૫	૭૫	૭૫
	૧૨/૦૮/૨૦૨૬	૭૫	૭૦	૭૦
	૧૩/૦૮/૨૦૨૬	૭૫	૭૫	૭૫
પવનની ગતિ (કિ.મી./કલાક)	૦૮/૦૮/૨૦૨૬	૭	૯	૫
	૧૦/૦૮/૨૦૨૬	૭	૮	૬
	૧૧/૦૮/૨૦૨૬	૭	૮	૫
	૧૨/૦૮/૨૦૨૬	૬	૮	૪
	૧૩/૦૮/૨૦૨૬	૬	૮	૪
પવનની દિશા (કમ્પાસપોઈન્ટ)	૦૮/૦૮/૨૦૨૬	SW	W	SW
	૧૦/૦૮/૨૦૨૬	SW	SW	SW
	૧૧/૦૮/૨૦૨૬	SW	SW	SW
	૧૨/૦૮/૨૦૨૬	SW	SW	SW
	૧૩/૦૮/૨૦૨૬	SW	SW	SW
વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટા)	૦૮/૦૮/૨૦૨૬	૬	૫	૫
	૧૦/૦૮/૨૦૨૬	૬	૬	૬
	૧૧/૦૮/૨૦૨૬	૫	૫	૬
	૧૨/૦૮/૨૦૨૬	૬	૫	૬
	૧૩/૦૮/૨૦૨૬	૭	૬	૭