


અભિગમ બદલીએ સીકલ સેલ એનિમિયાને રોકીએ



:: લેખક ::

કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી
દેડીયાપાડા - ૩૮૩ ૦૪૦, ગુ. નર્મદા

સિકલ સેલ એનિમિયા વિશે જાણો

- સિકલ સેલ એનિમિયા રક્તકષમાં રહેલા ખામીયુક્ત ડિમોગ્લોબિન-એસ (hb-s) ના કારણે થતો જનીનજન્ય રોગ છે. જેમાં રક્તકષાનો આકાર ગોળમાંથી દાતરડા જેવો બની જાય છે.
- સિકલ સેલ એ વારસાગત રોગ છે જેને સંપુર્ણપણે મટારી ન શકાય પણ આ સમસ્યાનો વ્યાપ વધતો અટકાવી શકાય છે.
- જો સ્ત્રી પુરુષ બંને સિકલ સેલ વાહક/રોગ ધરાવતા હોય તો એમના લગ્ન એકબીજા સાથે ન થવા જોઈએ.
- લગ્ન પહેલા આ રોગની તપાસ દ્વારા આ રોગને વધતો અટકાવી શકાય છે.
- આ રોગને અટકાવવા લગ્નશ્રદ્ધીથી જોડાતા પહેલા સિકલ સેલની તપાસ કરાવી કાઉન્સેલોંગ ફરજીયાત કરાવવું
- ગુજરાતમાં મુખ્યત્વે દાહોદ, પંચમહાલ, નરમદા, ભરુચ, સુરત, નવસારી, વાપી, વલસાડ અને ડાંગ જલ્દાના આદિવાસીઓમાં સિકલ સેલ એનિમિયાનું પ્રમાણ વધુ જોવા મળે છે.

સિકલ સેલ એનિમિયાના પ્રકાર

માતા પિતા બંને માંથી કોઈ એકનું રંગસૂત્ર ખામીયુક્ત હોવાથી ભાવિ બાળક સિકલ સેલ એનિમિયા વાહકવાળું આવી શકે છે.	માતા અથવા પિતા બંનેના રંગસૂત્રમાં ખામી હોવાથી ભાવિ બાળક સિકલ સેલ એનિમિયા (રોગ)નો ભોગ બની શકે છે.
સિકલ સેલ એનિમિયા વાહક (Sickle Cell Trait)	સિકલ સેલ એનિમિયા રોગ (Sickle Cell Disease)

નંદુરસન રક્તકષા



સિકલ સેલ એનિમિયાના લક્ષણો

- વારંવાર તાવ આવવો
- શરીરમાં કળતર થવો.
- સાંધારો તેમજ હાડકાંમાં સોજો આવવો તેમજ દુખાવો રહેવો.
- બરોગ મોટી થવી.
- સગર્ભા માતાને ગર્ભપાત થવાની શક્યતા.
- સિકલ સેલ રોગ વાળી વ્યક્તિ વારંવાર શરીરમાં થતી કટોકટીને (Crisis) લીધે હુકા આયુષ્યમાં જ મૃત્યુ પામી શકે છે.
- સહેલાઈથ સંકામક રોગના ભોગ બનાવું ખાસ કરીને ફેફસાંનાં રોગો.

સિકલ સેલ વાહકના લક્ષણો

સિકલ સેલ વાહકમાં કોઈ ખાસ લક્ષણો જોવા મળતા નથી. છતાં કેટલાક લક્ષણો સિકલ સેલ વાહકમાં રહેલા હિમોગ્લોબિનના પ્રમાણ તથા કેટલાક અસામાન્ય સંઝોગો ઉપર આધાર રાખે છે. જેવા કે...

- ચેપ લાગવાથી
- ખુબ કસરત કરવાથી
- તડકામાં જવાથી
- ન્યુમોનિયા જેવા રોગોથી ઉપરોક્ત સંજોગોમાં વહેલી તથીબી સારવાર મેળવવી જરૂરી છે.

સિકલ સેલ એનિમિયાની સારવાર

- વધુમાત્રામાં પ્રવાહી પીવું. રોજના ૧૦ થી ૧૫ ગલાસ પાણી પીવું.
- રોજ ફોલિક એસિડની પ મિ.ગ્ર.ની ગોળી લેવી.
- દુઃખાવા માટે દર્દશામક ગોળી દુઃખાવો મટે તાં સુધી લેવી.
- સિકલ સેલના ઘણાં દર્દીઓમાં હાઈડ્રોક્ષીયુરીયાનામની દવા ખુબ જ ઉપયોગી નિવાર છે.
- સમતોલ આહાર લેવો.
- વધુ ઉંચાઈ વાળી જગ્યાને ન જવું.
- વધુ ઠીકમાં મફલાર કે સ્વેટર પહેરવા.
- વધુ ગર્મીઓં બહાર ન ફરવું.
- સિકલ સેલ એનિમિયાના દર્દીને હિપેટાઈસ-બી તેમજ ન્યુમોનિયાનું રતીકરણ કરાવવું જરૂરી છે.
- સિકલ સેલના દર્દીને વારંવાર લોહી ચાડાવવાની જરૂર પડે છે.
- સિકલ સેલ એનિમિયામાં શરીરના સાંચા બગડે તો તેની સારવાર સીવીલ હોસ્પિટલ ખાતે મફતમાં કરવામાં આવે છે.

સિકલ સેલ એનીમિયા વારસામાં કઈ રીતે મળે છે ?

સિકલ સેલ એનીમિયા રોગના લક્ષણો :

- શરીર ફિક્કુ પરી જવું.
- હાથ-પગનાં સાંધામાં સોજો આવવો.
- વારંવાર તાવ આવવો.
- વારંવાર કમળો થવો.
- પેટમાં દુઃખાવો થવો.
- મૂત્રપિંડમાં બગાડ થવો.
- પિતાશયમાં પથરી થવી.

જ્યારે કોઈપણ વ્યક્તિને આ પ્રકારની શારીરિક તકલીફ થતી હોય તો તેણે લાડીની સિકલસેલ એનીમિયાની તપાસ કરાવવી ખૂબ જરૂરી છે.

સિકલ સેલ એનીમિયાના પ્રકાર:

- (૧) સિકલ સેલ ટ્રેઇટ (૨) સિકલ સેલ ડીસીજ

(૧) સિકલ સેલ ટ્રેઇટ:

સિકલ સેલ ટ્રેઇટ એટલે કે સિકલ સેલના ગુણવાળી વ્યક્તિ રોગના વાહક તરીકે કામ કરે છે. જેમાં અસામાન્ય હિમોગ્લોબીનનું પ્રમાણ 40% થી ઓછું હોય છે અને સામાન્ય હિમોગ્લોબીનનું પ્રમાણ 40%થી વધુ હોય છે. આથી વ્યક્તિમાં સિકલસેલ રોગના ચિહ્નો કાયમ ન રહેતાં કોઈકવાર દેખાતા હોય છે. ઇતાં તેઓ પોતાના બાળકોમાં આ રોગ વારસામાં આપી શકે છે.

(૨) સિકલસેલ ડીસીજ :

આ રોગમાં અસામાન્ય હિમોગ્લોબીનનું પ્રમાણ 40% થી વધુ જ લગભગ 80% જેટલું હોય તૈથા સામાન્ય હિમોગ્લોબીન ગેરહાજર જ હોય છે. આવી વ્યક્તિમાં સિકલસેલ રોગનાં લક્ષણો કાયમ રહે છે. જેથી તેના શરીરનો વિકાસ દુંહાય છે. આવી વ્યક્તિ પોતાના બાળકને આ રોગ ચોકસપણે આપે છે.

સિકલસેલ એનીમિયા રોગ વારસામાં કઈ રીતે મળે છે ?

(૧) જો માતા અને પિતામાંસિકલસેલના ગુણ અથવા સિકલસેલનો રોગ ન હોય તો તેમના બાળકોમાં આ રોગ થતો નથી. એટલે કે સામાન્ય હિમોગ્લોબીન ધરાવતા માતા-પિતાના બાળકોને આ રોગ થતો નથી અને બાળકોમાં સામાન્ય હિમોગ્લોબીન જ વારસામાં મળે છે.

નોર્મલ હિમોગ્લોબીનવાળી માતા.



+



+

નોર્મલ હિમોગ્લોબીનવાળા પિતા

= બાળકની સંભાવના : 100% તંદુરરસત

(૨) જ્યારે માતા અથવા પિતા બેમાંથી કોઈપણ એક વ્યક્તિ સિકલસેલ ટ્રેઇટવાળી હોય તો 40% બાળકોને સિકલસેલ ટ્રેઇટ હોવાનો અને 40% બાળકો સામાન્ય હોવાની શક્યતા રહે છે. પરંતુ આમાં કોઈપણ બાળકને સિકલસેલ ડીસીજ થતો નથી.

નોર્મલ હિમોગ્લોબીનવાળી વ્યક્તિ



+



+

સિકલસેલ ટ્રેઇટ(વાહક)વાળી વ્યક્તિ

= બાળકની સંભાવના : 40% તંદુરરસત, 40% સિકલસેલ ટ્રેઇટ (વાહક)

(૩) જો માતા અને પિતામાંથી કોઈપણ એક વ્યક્તિ સિકલસેલ ડીસીજવાળી અને બીજી વ્યક્તિ સામાન્ય હોય તો 100% એટલે કે બધા જ બાળકોને સિકલસેલ ટ્રેઇટ થઈ શકે પરંતુ સિકલસેલ ડીસીજ થતો નથી.

નોર્મલ હિમોગ્લોબીનવાળી વ્યક્તિ



+



+

સિકલસેલ ડીસીજવાળી વ્યક્તિ

= બાળકની સંભાવના : 100% સિકલસેલ ટ્રેઇટ (વાહક)

(૪) જો માતા અને પિતા બંને સિકલસેલ ટ્રેઇટવાળા હોય તો તેમના ૫૦% બાળકોને સિકલ સેલ ટ્રેઇટ, ૨૫% બાળકોને સિકલસેલ ડીસીજ અને ફક્ત ૨૫% સામાન્ય બાળકો થવાની શક્યતા રહે છે.

સિકલસેલ ટ્રેઇટવાળી વ્યક્તિ



+



સિકલસેલ ટ્રેઇટવાળી વ્યક્તિ

= બાળકની સંભાવના : ૫૦% સિકલસેલ ટ્રેઇટ, ૨૫% સિકલસેલ ડીસીજ, ૨૫% તંદુરસ્ત

(૫) જો માતા અને પિતા બંનેમાંથી એક ડીસીજવાળી અને એક વ્યક્તિ ટ્રેઇટવાળી હશે તો તેમના ૫૦ બાળકો ટ્રેઇટવાળા હશે.

સિકલસેલ ટ્રેઇટવાળી વ્યક્તિ



+



સિકલસેલ ડીસીજવાળી વ્યક્તિ

= બાળકની સંભાવના : ૫૦% સિકલસેલ ટ્રેઇટ, ૫૦% સિકલસેલ ડીસીજ (રોગ)

(૬) જો માતા અને પિતા સિકલસેલ ડીસીજવાળા હોય તો ૧૦૦% અટવે કે બધા જ બાળકો સિકલસેલ ડીસીજવાળા જ હોય છે.

સિકલસેલ ડીસીજવાળી વ્યક્તિ



+



સિકલસેલ ડીસીજવાળી વ્યક્તિ

= બાળકની સંભાવના : ૧૦૦% સિકલસેલ ડીસીજ

સિકલસોલ એનીમિયાવાળી વ્યક્તિઓ યું ન કરતું જોઈએ ?

- વધારે ગરમીમાં કે તડકામાં બાહાર ન નીકળવું.
- વધારે ઢીમાં બાહાર ન નીકળવું.
- વધુ શારીરિક શ્રમવાળી કસરતો ન કરવી.
- વધારે તકલીફ થાય તો ઘરગથું ઉપચાર ન કરતાં નિષ્ણાંત ડોક્ટરનો અથવા સિકલસેલ કોમ્પ્રાન્સીન કલીનીકનો સંપર્ક સાથે.

આટાંતું ધ્યાન રાખો :

- શરાબ તથા કેફી દ્વયોનું સેવન કે ધુમપાન ન કરતું. સિકલ સેલ એનીમિયાથી ડરવાની જરૂર નથી, જરૂર છે માત્ર આ રોગને સમજવાની.
- સિકલ સેલ એનીમિયા એ વારસાગત રોગ હોવાથી જ્યાં સુધી લોહીની તપાસ કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી આ રોગની જાણ થતી નથી.
- સિકલ સેલ દર્દીના કુંદુભના દરેક સભ્યનો સિકલ સેલ રિપોર્ટ થબો જરૂરી છે.
- સિકલ સેલ રોગનું નિદાન અને સારવાર આપના નજીકારી દવાખાનામાં મફતમાં કરવામાં આવે છે.

સિકલ સેલના નિદાન માટે લે પ્રકારના ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે :

- (૧) સ્કિનીંગ ટેસ્ટ (૨) ઈલેક્ટ્રોક્રોનોસીસ

(૧) સ્કિનીંગ ટેસ્ટ : દરેક સરકારી દવાખાનામાં મફતમાં કરવામાં આવે છે.

(૨) ઈલેક્ટ્રોક્રોનોસીસ : જેનાથી સિકલ સેલ ટ્રેઇટ (Trait) કે ડીસીજ (રોગ-Disease) છે તે નક્કી કરવામાં આવે છે.

- સિકલ સેલના દર્દીઓએ ડોક્ટરની સલાહ વગર આયર્ની (Iron) ગોળી ન લેવી.
- કોઈપણ ડોક્ટર પાસે કે હોસ્પિટલમાં જતા પહેલાત મને (૨) સિકલ સેલ હોય તો તેની જાણ કરવી.
- સિકલ સેલ એનીમિયા હોવું શરમ કે પરેશાની નથી પરંતુ આ રોગને ધૃપાવવો પરેશાનીનું કારણ બની શકે છે.
- આવો સાથે મળીને સિકલ સેલ એનીમિયા મુક્ત સમાજનું નિર્માણ કરીએ.
- પહેલાં સિકલ સેલ તપાસ પછી જ શાળા/મહાશાળા પ્રવેશ.
- સિકલ સેલ એનીમિયા અંગે કોઈ મુંબાવણ હોય તો તાત્કાલીક પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અથવા સરકારી દવાખાનામાં ઉપસ્થિત કાઉન્સીલર કે ડોક્ટર અથવા સાયનેપ્સ એસોસીએશન નો સંપર્ક કરવો.