

જુવારના પાકમાં આવતા મુખ્ય રોગો અને તેનું નિયંત્રણ

ડૉ. ટી. વી. ઘેવરીયા, ડૉ. એન. વી. રાદડીયા, ડૉ. એચ. એન. કેર, ડૉ. વી. આર. જીંજાના, ડૉ. કે. જી. કંજારિયા, ડૉ. એચ. ઈ. પાટિલ અને ડૉ. બી. કે. દાવડા.

મુખ્ય જુવાર સંશોધન કેન્દ્ર, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, અઠવા ફાર્મ, સુરત

દાણા – ઢિંદેતું પ્રકારની જુવારમાં મુખ્યત્વે જુવારનો મધિયો (અરગટ), દાણાની ફૂગ, પ્રકાંડનો કાજલ સડો તેમજ પર્ણનો રોગ ઉપદ્રવ બેવા મળે છે. જેના નિયંત્રણ માટે નીચે મુજબના પગલા લેવા.

➤ જુવારના પાકમાં આવતા મુખ્ય રોગો અને તેનું નિયંત્રણ

૧. જુવારનો મધિયો (અરગટ)

ઓળખ:-

આ રોગ અલગ અલગ કણસલા સુધી માર્યાદિત રહે છે. પ્રથમ લક્ષણમાં ચેપગ્રસ્ત ફૂલોમાંથી મધ જેવા પદાર્થનો સ્રાવ થાય છે. અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓમાં, લાંબા, સીધા, અથવા વળાંકવાળા, ફીમથી આછો ભૂરો, સખત રક્તરોટીયા વિકસે છે તેમજ મધિયાનું પ્રવાહી પાન ઉપર પડી પાન અને જમીનને સફેદ શર્કરાથી આરછાદિત કરે છે. જમીન પર મધીયા નું પ્રવાહી પડવાથી કીટકો અને માખીઓ આકર્ષાય છે અને રોગનો ચેપ ફેલાઈ છે. સમય જતા આ પ્રવાહી સુકાયને ભૂખરા રંગનાં જલારમ તેયાર કરે છે જે જમીનમાં પણ પડે છે અને બીજ સાથે પણ રહે છે. જે બીજે વર્ષે રોગનો ચેપ ફેલાવે છે.



નુકશાનકર્તા અવસ્થા: -

ભેજમય વાતાવરણમાં કણસલું આવવાના સમયે.

નિયંત્રણ વ્યવસ્થાપન:-

- તંદુરસ્ત બીજનો વાવની માટે ઉપયોગ કરવો.
- બીજને ૫% મીઠાના દ્રાવણમાં અડધા કલાક ડુબાડી રાખવા અને ઉપર તરવા લાગેલ રોગીષ્ટ દાણાને વીણી લઈ નાશ કરવો તથા નીચે બેસેલા બીજને સારા પાણીથી ઘોઈ સાફ કરી છાયામાં સુકવીને વાવણી કરવી બેઈએ.

૨. દાણાની કૂગ

ઓળખ:-

કણસલા દુરથી ભૂખરા અથવા કાળશ પડતાં રંગના દેખાય છે .



નુકશાનકર્તા અવસ્થા:-

કણસલા નિકળવાના સમયથી પરીપક્વ અવસ્થા સુધીમાં વરસાદ પડે તો, ઉપદ્રવ બેવા મળે છે. કૂગની વિવિધ જાતિઓ તેમજ ચેપની ડીઝીનાં આધારે આવરણનાં લક્ષણો સ્ફેદ, ગુલાબી અથવા કાળા રંગના દેખાય છે. દાણા ઉપર કૂગ લાગવાથી ખોરાક તરીકેની ગુણવત્તા નબળી થાય છે. તેનો સંગ્રહ પણ કરી શકાતો નથી અને આર્થિક નુકશાન થાય છે.

નિયંત્રણ વ્યવસ્થાપન:-

- વાવણી પહેલા બીજને અડધા કલાક ગરમ પાણીમાં ડુબાડી રાખવાથી કૂગનો નાશ થશે અને રોગીષ્ટ દાણા ઉપર તરવા લાગશે જેને દુર કરવા.
- એકમ વિસ્તાર દીઠ છોડની સંખ્યા બળવવી.
- પરિપક્વ અવસ્થાએ પાકની કાપણી કરવી.
- મેનકોટેબ ૦.૨ અને કેપ્ટાન ૦.૨ અથવા થાયરમ ૦.૨ અને કાર્બોન્ડીઝમ ૦.૦૫ ટકા મિશ્રણના બે છંટકાવ, પ્રથમ ફુલ અવસ્થાની શરૂઆત થયે અને બીજે છંટકાવ પ્રથમ છંટકાવના ૧૦ દિવસ બાદ કરવો જરૂરી છે.

૩. પ્રકાંડનો (કાજલ) સડો

ઓળખ: -

રોગનો ફેલાવો કૂગ વડે જમીન મારફત થાય છે. રોગ ગ્રાહ્ય જાત અને અનુકુળ વાતાવરણ મળતાં કૂગ પરોપણવી તરીકે રોગ ઉત્પન્ન કરે છે. જમીનમાં ઓછો ભેજ, ગરમ વાતાવરણ, સારા નિતારવાળી જમીન, ફુલ આવતાં પહેલાં વધુ ભેજ, ફુલ આવ્યા પછી ઓછો ભેજ વગેરે રોગોને અનુકુળ છે. પાકની શરૂઆતની અવસ્થામાં છોડ મરી જાય છે. જ્યારે મોટી અવસ્થામાં કોઈ લક્ષણો જણાતા નથી. પરંતુ વહેલી પરિપક્વતા લાવે છે. કણસલા નબળા રહે છે. અસરવાળા છોડનું પ્રકાંડ નબળું અને અંદરથી પોલું હોય છે અને સહેલાઈથી છુટું પડે છે. જેના ઉપર પુષ્કળ પ્રમાણમાં કાળા નાના જલાશ્મો ઉત્પન્ન થયેલ જણાય છે. મુખ્યત્વે શીયાળામાં બેવા મળે છે.



નુકશાનકર્તા અવસ્થા:-

પાકની શરૂઆતની અવસ્થામાં છોડ મરી જાય છે.

નિયંત્રણ વ્યવસ્થાપન:-

- રોગ પ્રતિકારક જાતોનું વાવેતર કરવું
- પાકની ફેર બદલી કરવી.
- આંતરખેડ કરી ભેજ જાળવી રાખવો.
- નાઈટ્રોજન ખાતરનો ભલામણ પ્રમાણે ઉપયોગ કરવો.
- જુવારમાં કાજલ સડાનો ઉપદ્રવ થતો હોય તેવા વિસ્તારોમાં ઓગસ્ટનાં પ્રથમ અઠવાડિયામાં વાવણી કરવી અથવા જુવારની વાવણી વખતે ચાસમાં ૨૦ કિ.ગ્રા. છાણીયા ખાતરમાં ૧ કિ.ગ્રા. ટ્રાઇકોડર્મા પાવડર ભેળવી છંટકાવ કરવો.
- ફૂગનાશક દવાઓથી રોગને કાબુમાં લેવો ઘણો મુશ્કેલ છે, તેમ છતાં વાવણી વખતે ચાસમાં ૪.૫ થી ૫.૦ કિ.ગ્રા./હેક્ટર ટી.એમ.ટી.ડી (થાયરમ) નાખવાથી રોગનું પ્રમાણ ઘટાડી શકાય છે.

૪ . પર્ણનો રોગ

ઓળખ:-

જુવારમાં પાનનો ઝાળ, કાલવણ, પાનના ચતુષ્કોણીય કાળા ટપકાં, કેન્દ્રભૂત પાનનાં ઘાંબા, મેસ પટીનો રોગ, પાનનાં ખરબચડાં ઘાંબા, ગેરૂ વગેરે રોગો થાય છે.



નુકશાનકર્તા અવસ્થા:-

પાન ઉપર નાના ગોળ કે અનિયમિત આકારના ટપકાં થાય છે. ટપકાંના રોગ, પાકની અવસ્થા, જાત પ્રમાણે બદલાતો રહે છે. જેવો કે રાતો, બદામી, અંબુડીયો કે ભુખરો હોય છે. સમય જતા ટપકાની મધ્યમાં કાળા ક્ષૂણના પ્રગુરુછાકો થાય છે. પાકની દરેક અવસ્થામાં છોડના પાન પર આ રોગ જોવા મળે છે.

નિયંત્રણ વ્યવસ્થાપન:-

- પર્ણનો રોગ અસરકારક નિયંત્રણ માટે કાપણી પછી અવશેષોનો નાશ કરવો.
- ઊંડી ખેડ અને પાકની ફેર બદલી કરવી.
- રોગ મુક્ત અને રોગ પ્રતિકારક જાતો વાવવી.
- રોગનો ઉપદ્રવ જણાય ત્યારે મેન્કોઝેબ ૭૫% અથવા ઝીનેબ ૭૫% દવાનો ૧૫ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લિ. પાણીમાં નાખી છંટકાવ કરવો.

સંકલિત નિયંત્રણ:-

સંકલિત નિયંત્રણ:

- અગાઉના પાકનાં અવશેષોનાં જડીયા સ્થાને નાશ કરવો. ઉનાળામાં ઊંડી ખેડ કરવી.
- અવારનવાર પાકની ફેરબદલી કરતા રહેવું.
- રોગમુક્ત બિયારણની પસંદગી કરવી.
- સમયસર વાવણી કરવી.
- મધિયાનો જલરમો બીજમાંથી દુર કરવા બીજને મીઠાના દ્રાવણમાં બોળી ઉપર તરતા જલરમો દુર કરી ચોખ્ખા પાણીએ ઘોઈ સૂકવીને વાવણીમાં ઉપયોગ કરવો.
- બીજને વાવતા પહેલા ગંધક અથવા પારાયુક્ત દવાનો પટ આપવો. (૧ કિગ્રા બીજ માટે ૪ થી ૫ ગ્રામ દવા).
- રોગીષ્ઠ છોડને ઉપાડીને નાશ કરવો.
- થડના કાજળ સડાના નિયંત્રણ માટે વાવણી વખતે જમીનમાં હેક્ટરે ૫ કિગ્રા થાયરમ નાંખવું.
- વાવણીનાં બે માસ પછી ટપકાનાં તથા ઝાળ રોગનાં નિયંત્રણ માટે મેન્કોઝેબ દવાનો છંટકાવ અવારનવાર ૨૦-૨૫ દિવસનાં અંતરે ત્રણેક વાર કરવો.