

હવામાન	ગરમ અને ભેજવાળુ				
જમીન	સારા નિતારવાળી, ગોરાડુ, મધ્યમ કાળી કે કાંપવાળી				
જાતો	પુસાડૂબી, પુસાઅર્લી ડવાઈ, પુસા-૧૨૦, અવિનાશ-૨, રૂપાલી વગેરે				
રોપણી	ચોમાસુ : મે-જુન, શિયાળુ : સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર, ઉનાળુ : ફેબ્રુઆરી-માર્ચ				
રોપણી અંતર	જોડીયા હાર : ૫૦ × ૫૦ × ૧૫૦ સે.મી.				
ટપક પદ્ધતિ ગોઠવણ	લેટરલ અંતર : ૨.૦૦ મી., ટપકણીયા વચ્ચેનું અંતર : ૧.૦૦ મી., ટપકણીયાની ક્ષમતા : ૮ લી. / કલાક				
પિયત સમયપત્રક	શિયાળો : ૪૫ થી ૬૦ મીનીટ, ઉનાળો : ૯૦ થી ૧૨૦ મીનીટ (એકાંતરા દિવસે)				
ખાતર	૧૫ થી ૨૦ ટન છાણીયુ ખાતર/હે. પૂર્તિ ખાતર :				
	પદ્ધતિ	રોપણી બાદ (દિવસ)	યુરીયા (કિ.ગ્રા./હે.)	સીંગલ સુપર ફોસ્ફેટ (કિ.ગ્રા./હે.)	મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ (કિ.ગ્રા./હે.)
	પાયામાં	---	---	૭૮૦	૨૦૮
	ટપક પદ્ધતિ દ્વારા (૨૦ દિવસના અંતરે ૬ સરખા હપ્તામાં)	૨૦	દરેક હપ્તે : ૪૫	---	---
આંતર ખેડ	સમયાંતરે જરૂરીયાત મુજબ				
આવરણ	૪૦% વિસ્તારમાં ૫૦ માઈક્રોન જાડાઈનું કાળુ પ્લાસ્ટીક				
પાક સંરક્ષણ	ફૂંચિ યુનિવર્સિટીની વખતોવખતની ભલામણ મુજબ				
વીણી	દૂરનાં બજાર માટે ગુલાબી અવસ્થાએ, નજીકનાં બજાર માટે લાલ અવસ્થાએ				
આશરે ઉત્પાદન	૪૦ થી ૬૦ ટન/હે.				

