

PRO-ACTIVE DISCLOSURE

સહ સંશોધન વૈજ્ઞાનિક(ફળ)
ફળ સંશોધન કેન્દ્ર
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી
ગણદેવી – ૩૮૬ ૩૬૦



સ્વયંભુ જાહેર કરાયેલ માહિતી
(પ્રો- એક્ટીવ ડીસ્ક્લોઝર) – ૨૦૨૩ પરીચય ગ્રંથ
માહિતી અધિકાર અધિનિયમ, ૨૦૦૫
પ્રકરણ-૨, કલમ ૪ (૧) ખ

મુદ્દા નં ૩

માહિતી અધિકાર અને જાહેર સત્તા મંડળોની જવાબદારીઓ કલમ ૪ (૧) ખ (પ્રો- એક્ટીવ ડીસ્ક્લોઝર)

મુદ્દા નં ૧. પોતાનાં વ્યવસ્થાતંત્ર, કાર્યો અને ફરજોની વિગતો :

વ્યવસ્થાતંત્ર	હોદ્દો	કાર્ય અને ફરજની વિગતો
કચેરીના વડા	સહ સંશોધન વૈજ્ઞાનિક	- કેન્દ્રના વડા તરીકે કેન્દ્ર ખાતે કાર્યરત તમામ યોજનાઓની વહીવટી, હિસાબી તથા તાંત્રિક કામગીરી અંગેનો સંપૂર્ણ હવાલો અને દેખરેખ. - ઉપાડ ચુકવણા અધિકારી તરીકેની ફરજ બજાવવી. - ICAR ટ્રાયબલ સબ પ્લાન યોજના બ.સ. ૨૦૭૫ (TSP) અંતર્ગત ખેડૂતોના ખેતર પર કેળ પાક ઉપરના નિર્દેશનોનું આયોજન અને નિયંત્રણ. - કેન્દ્રના જાહેર માહિતી અધિકારી તરીકેની ફરજ નીભાવવી. - ICAR-AICRP On Fruits બ.સ. ૨૦૧૪-૫ , બ.સ. ૨૦૭૫ (TSP) યોજનાના પ્રીન્સીપલ ઈન્વેસ્ટીગેટર તરીકેની સંપૂર્ણ કામગીરી. - મેક્રોપ્રોપેગેશન પદ્ધતિ દ્વારા ઓછા ખર્ચે કેળના રોપા તૈયાર કરવા માટેની પ્લાન યોજના બ.સ. ૧૨૦૮૪ ના પ્રીન્સીપલ ઈન્વેસ્ટીગેટર તરીકેની સંપૂર્ણ કામગીરી. - બનાના બાયો ફોર્ટીફિકેશન યોજના બ.સ. ૧૮૨૨૫ ના પ્રીન્સીપલ ઈન્વેસ્ટીગેટર તરીકેની કામગીરી. - ફાર્મની વિગતો નકશા વિ. જમીન રેકૉર્ડ. - અખતરાઓની કામગીરી.

મુદ્દા નં ૨. પોતાનાં અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તાઓ અને ફરજો :

૧) ડૉ. અર્પિતાબેન એમ. પટેલ, મદદનીશ સંશોધન વૈજ્ઞાનિક (બાગાયત)

- કેન્દ્રના ફાર્મ મેનેજર તરીકેની કામગીરી અંગેના સંપૂર્ણ હવાલો અને દેખરેખ.
- કેળ, પપૈયા અને ચીકુ ફળ પાક ઉપરના યોજનાના બાગાયત વિભાગના તાંત્રિક કાર્યક્રમ મુજબ કેન્દ્રને ફાળવેલ અખતરાઓની સંપૂર્ણ કામગીરી કરવી. જે માટે સિનીયર ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ શ્રી. કાર્તિકુમાર એસ. જોટંગીયા, ખેતી મદદનીશ શ્રી એન.પી.નાયક ની મદદ લેવી.
- યોજનાના બાગાયત વિભાગના ત્રિમાસિક, છમાસિક, વાર્ષિક તથા એગ્રસ્કો રીપોર્ટ તૈયાર કરવો.
- યોજનાના વિવિધ અખતરાઓની પાક યોજના તૈયાર કરી મંજૂરી પ્રમાણે બજેટની મર્યાદામાં ખર્ચ કરવો.
- કેન્દ્ર ખાતે ચાલતી યોજનાઓની પાક યોજના તૈયાર કરવી.
- ફાર્મ ઉત્પાદન (કેળા, પપૈયા, ચીકુ) ના વેચાણની કામગીરીનું નિયમિત આયોજન કરવું.
- મુલાકાતીઓ/ તાલીમાર્થીઓ/ વિદ્યાર્થીઓ વિગેરે ની ફાર્મ મુલાકાત સમયે કેન્દ્રની પ્રવૃત્તિઓ તેમજ સિધ્ધિઓવિષે માહિતી આપવી.
- ટ્રાયબલ સબ પ્લાન યોજના અંતર્ગત વલસાડ અને ડાંગ જિલ્લામાં ખેડૂતોના ખેતર પર કેળ પાક ઉપરના નિર્દેશનોનું આયોજન અને નિયંત્રણ.
- લેબોરેટરીના સાધનો, ફાર્મને લગતા સાધનો તેમજ IT સંલગન સાધનોની ખરીદી ટી-૨બી સાથે રહી કરવી.
- ઈન્ફુલઝન ઈન એક્સેલડી ઓફ આઈસીએઆર-એઆઈસીઆરપી ટેકનોલોજી ઈન કેવીકે એક્શન પ્લાન ફોર ૨૦૨૪-૨૫ અંતર્ગત કેળ અને ચીકુ પાકના અખતરાનું આયોજન અને નિયંત્રણ ખેડૂતના ખેતર પર શ્રી કે.એસ.જોટંગીયા, ખેતી.અધિકારી ને સાથે રાખી કરવું.
- કેન્દ્રના ટી-૧ અને ટી-૨ અધિકારીશ્રીની ગેરહાજરી/પ્રવાસમાં હોય ત્યારે કચેરીના વડા તરીકે ફરજ બજાવવી.
- ઉપરી અધિકારી તરફથી સોંપવામાં આવતી અન્ય કામગીરી.

૨) ડૉ. શિવાંગી એસ. કંસારા, મદદ સંશોધન વૈજ્ઞાનિક (રોગશાસ્ત્ર)

- કેળ, પપૈયા અને ચીકુના રોગો અંગેની સર્વેની કામગીરી કરવી.
- કેળ, પપૈયા અને ચીકુના રોગોના નિયંત્રણ માટેના વિવિધ અખતરાઓની કામગીરી કરવી.

- યોજનાનો રોગશાસ્ત્ર વિભાગનો ત્રિમાસિક, છમાસિક, વાર્ષિક તથા એગ્રસ્કો રીપોર્ટ તૈયાર કરવો.
- યોજનાને લગતા પત્ર વ્યવહાર કરવો.
- મદદનીશ જાહેર માહિતી અધિકારી તરીકેની ફરજ નીભાવવી.
- આરટીઆઈ ના રીપોર્ટની કામગીરી.
- કેન્દ્રના વડાની ગેરહાજરી/ પ્રવાસમાં હોય ત્યારે કચેરાના વડા તરીકે ફરજ બજાવવી.
- ઉપરી અધિકારી તરફથી સોંપવામાં આવતી અન્ય કામગીરી નિયત સમયમાં કરવી.

૩) ડૉ. કે. ડી. બિસને, સહ સંશોધન વૈજ્ઞાનિક (કિટકશાસ્ત્ર)

- યોજનાના તાંત્રિક કાર્યક્રમ મુજબ કેળ, પપૈયા અને ચીકુના જીવાતના સર્વે તથા નિયંત્રણ માટેના વિવિધ અખતરાઓની કામગીરી કરવી.
- મોજણી-નિગાહ આધારીત પાક પૂર્વાનુમાન પદ્ધતિના અવલોકનો લઈ રજીસ્ટર નિભાવવું.
- લેબોરેટરી સાધનોની ખરીદી તેમજ IT સંલગ્ન સાધનોની ખરીદી તથા મરામતની કામગીરી ટી-૨એ સાથે મળીને કરવી.
- ઈ મેઈલ તથા દરેક રિપોર્ટ તૈયાર કરી મોકલવાની કામગીરી.
- યોજનાના કીટકશાસ્ત્ર વિભાગના ત્રિમાસિક, છમાસિક, વાર્ષિક તથા એગ્રસ્કો નો રીપોર્ટ તૈયાર કરવો.
- યોજનાની લેબોરેટરી તેમજ કચેરી અને ફર્મને લગતા તમામ અન્ય સાધનોની ખરીદી GeM દ્વારા કરવી
- ઉપરી અધિકારી તરફથી સોંપવામાં આવતી અન્ય કામગીરી.

૪) શ્રી. કાર્તિકકુમાર એસ. જોટગીયા, સી.ની. ટેક. આસીસ્ટન્ટ

- કેળની વિવિધ જાતો ભેગી કરી તેનું પાત્ર લેખન, જાળવણી, મુલ્યાકન અને ઉપયોગીતાના અભ્યાસનો અખતરો.
- કેળ, ચીકુ અને પપૈયા પાકોના વિવિધ અખતરાઓની કામગીરીમાં ટી-૨, ટી-૨એ અને ટી-૨બી ને મદદ કરવી.
- કેળ, ચીકુ અને પપૈયા પાકોમાં ખેતી મદદનીશોને સોંપેલ અખતરાઓની તેમની કામગીરી ઉપર દેખરેખ રાખવી.
- અખતરાના પરિણામોના આંકડાકીય પૃથ્થકરણ માટે અવલોકનોની સરેરાશના ટેબલ બનાવવા તથા કોમ્પ્યુટરમાં ફીટ કરવા.
- ICAR યોજનાના ડેડસ્ટોકની સંપૂર્ણ દેખરેખ તથા રજીસ્ટરની જાળવણી. લેબોરેટરીમાં પૃથ્થકરણની કામગીરી તથા લેબોરેટરી સાધનોની મરામત અને તેની લોગબુક નિભાવવી.
- તાલીમાર્થીઓના પ્રાયોગિક કાર્ય અંગેની કામગીરી
- મુલાકાતીઓ/ વિદ્યાર્થીઓ વિગેરેને ફાર્મ મુલાકાત સમયે કેન્દ્રની પ્રવૃત્તિઓ તેમજ સિધ્ધિઓ વિષે માહિતી આપવી.
- કેમીકલ, ગ્લાસવેર અને પ્લાસ્ટીક વેર રજીસ્ટર નિભાવવું.
- ચીકુની વિવિધ જાતો ભેગી કરી તેનું પાત્ર લેખન, જાળવણી, મુલ્યાકન અને ઉપયોગીતાના અભ્યાસનો અખતરો.
- ICAR યોજના અંતર્ગત લેબોરેટરી તેમજ ફાર્મ તેમજ કચેરીને લગતા સાધનોની ખરીદી તથા મરામતની કામગીરી કરવી તે માટે જે તે સ્ટોરના ખેતી મદદનીશની મદદ લેવી.
- કેન્દ્રના મદદનીશ ફાર્મ મેનેજર તરીકેની કામગીરી ટી- ૧ ના માર્ગદર્શન હેઠળ કરવી.
- બ.સ. ૨૦૧૪-૫ માં આવતા તમામ અખતરાની કામગીરી ઓબ્ઝર્વેશન ડેટા એન્ટ્રી અને આંકડા પૃથ્થકરણ કરવું.
- બ.સ. ૨૦૧૪-૫ માં આવતા રોગ-જીવાતના તમામ અખતરાની કામગીરી ઓબ્ઝર્વેશન, ડેટા એન્ટ્રી અને પૃથ્થકરણ કરવું.
- P.G Student તરીકેનું તમારું સમયપત્રક દર વખતે જમા કરાવવું.
- ઉપરી અધિકારી તરફથી સોંપવામાં આવતી અન્ય કામગીરી.

૫) શ્રી ડી. આઈ. ચોધરી, ખેતી અધિકારી

- ફાર્મ વ્યવસ્થા તથા દેખરેખ.
- નર્સરી પ્રવૃત્તિની સંપૂર્ણ દેખરેખ.
- બ. સ. ૫૦૧૪ યોજનાની પાક યોજના બનાવવી.
- વેલીડેશન ઓફ પ્રોટોકોલ ફોર એન્ટેન્ડીંગ પપૈયા સીડ વાયેબીબીટી ઈન સ્ટોરેજ અખતરાની સંપૂર્ણ કામગીરી ડો પી.કે.મોદી સાથે કરવી.
- ચીકુમાં જમીનમાં રહી જતા અને આપવામાં આવતા પોષક તત્વોની વધતી અસરના અખતરાની કામગીરી.
- ચીકુમાં ધનિષ્ટ વાવેતર અંતર્ગત ઝાડના વૃદ્ધિ નિયંત્રણના અખતરાની કામગીરી.
- બ. સ. ૫૦૧૪ યોજનાના ડેડસ્ટોક રજીસ્ટરની જાળવણી.
- ઈલેક્ટ્રીક બીલ રજીસ્ટર અને ઝાડ રજીસ્ટર નિભાવવું.
- એમઆઈડીએચ યોજના (બ.સ. ૧૮૯૩૦-૭) હેઠળ હળદર જર્મપ્લાઝમ ની જાળવણી અને હળદર બીયારણ ઉત્પાદનમાં

શ્રી એન. પી. નાયક ખેતી મદદનીશને માર્ગદર્શન આપવું.

- વેધશાળાના અવલોકન કોમ્પ્યુટરમાં ફીટ કરવા તથા અહેવાલ તૈયાર કરી આંકડા શાસ્ત્ર વિભાગ નવસારીને ઈમેઈલ કરવા.
- બ. સ. ૫૦૧૪ યોજનાની લેબોરેટરી તેમજ અન્ય સાધનોની ખરીદી તથા મરામતની કામગીરી ટી-૩ સાથે મળીને કરવી જે તે સ્ટોરના ખેતી મદદનીશની મદદ લેવી.
- રીવોલ્વીંગ ફંડ યોજનાની પાક યોજના બનાવવા શ્રી એચ.આર.પટેલ ને માર્ગદર્શન આપવું.
- પિયાવા રજીસ્ટર અને જાહેરાત રજીસ્ટર તેમજ બ.સ. ૫૦૧૪ ના સાધનોની હિસ્ટી સીટ તેમજ રીપેરીંગ રજીસ્ટર નિભાવવું.
- કેન્દ્રની લાયબ્રેરીની કામગીરી.
- મરી તથા કોફી પાકની જાળવણી તથા ઉત્પાદનની નોંધ રાખવી.
- ઝાડ રજીસ્ટર નિભાવવાની કામગીરી.
- TSP યોજનાના નિર્દેશન અને તેને લગતી જરૂરી ખરીદીની કાર્યવાહી કરવી.
- ઉપરી અધિકારી તરફથી સોંપવામાં આવતી અન્ય કામગીરી.

૬) શ્રી એચ. આર. પટેલ, ખેતી મદદનીશ (ઈચા. ખેતી મદદનીશ-ગણદેવી) (પગાર-નવસારી)

- ચીકુમાં જમીનમાં રહી જતા અને આપવામાં આવતા પોષક તત્વોની વધતી અસરના અખતરાની કામગીરીમાં ટી-૪ ને મદદ કરવી.
- ચીકુમાં ધનિષ્ટ વાવેતર અંતર્ગત ઝાડના વૃદ્ધિ નિયંત્રણના અખતરાની કામગીરીમાં ટી-૪ ને મદદ કરવી.
- ચીકુમાં મુખ્ય જીવાત નિયંત્રણના અખતરાની કામગીરીમાં ટી-૨બી ને મદદ કરવી.
- પપૈયામાં સુક્ષ્મજીવાણુ (અરકા માઈક્રોબીયલ કોનસોડીયમ)ના અખતરાની કામગીરી.
- જીવાત નિયંત્રિત નેટ હાઉસમાં પપૈયાની ખેતીના અભ્યાસના અખતરાની કામગીરીમાં ટી-૨બી ને મદદ કરવી.
- રીવોલ્વીંગ ફંડ યોજના હેઠળ નર્સરીમાં આંબા-ચીકુ કલમો, તથા મરી રોપ તેમજ અન્ય ફળઝાડ રોપ ઉછેરની કામગીરી તેમજ વેચાણ કરવું.
- રીવોલ્વીંગ ફંડ યોજના હેઠળ સ્ટોરને લગતા તમામ રજીસ્ટરો નીભાવવા.
- કલમો તથા રોપાની જરૂરિયાત માટે ખેડૂતો તેમજ અન્ય સંસ્થાની અરજીઓનું રજીસ્ટર બનાવવું તથા આદેશો કરવા.
- રીવોલ્વીંગ ફંડ યોજનાના ડેડસ્ટોક રજીસ્ટર, હિસ્ટ્રીશીટ રજીસ્ટર અને ખરીદ તથા વેચાણની કામગીરી.
- બ. સ. ૧૨૦૮૪ યોજનાની કામગીરી તથા રજીસ્ટરો નિભાવવા.
- ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી સોંપવામાં આવતી અન્ય કામગીરી નિયત સમયમાં પૂર્ણ કરવી.

૭) શ્રી એન. પી. નાયક, ખેતી મદદનીશ

- બ. સ. ૨૦૧૪-૫ ની યોજનાની ખરીદ વેચાણ સહીત સ્ટોરની સંપૂર્ણ કામગીરી અને સ્ટોરને લગતા તમામ રજીસ્ટરો નીભાવવા.
- યોજનાના પાવર પ્લાન્ટ રજીસ્ટર તેમજ ટ્રેક્ટર, પાવર ટ્રીલર અને બ્રશ કટરની લોગબુક નીભાવવી.
- બ. સ. ૨૦૧૪-૫ ની યોજનાનું સ્થાનિક મંજૂરી રજીસ્ટર નિભાવવું.
- બ. સ. ૨૦૧૪-૫ નું મજૂર મસ્ટર બનાવવું, દૈનિક લેબરશીટ અને પગાર ચિટ્ટી લખવી તથા મજૂર ઉપર દેખરેખ.
- બ. સ. ૨૦૭૫ (ટી.એસ.પી.), બ.હે. ૧૮૯૩૦-૭ યોજનાને લગતા રજીસ્ટરો તથા તમામ તાંત્રીક કામગીરી.
- કેન્દ્રની જીપની લોગબુક લખવી.
- બ. સ. ૨૦૧૪-૫ ઓઆર-૧ હેઠળ ફાળવેલ અનુદાનમાંથી જરૂરી ચીજવસ્તુઓની ખરીદી કરવી અને તમામ જરૂરી રજીસ્ટરો નીભાવવા.
- કેળમાં કલોનલ સીલેક્શનના અખતરાની કામગીરી.
- કેળમાં વૃદ્ધિ વિકાસના વિવિધ તબક્કે જમીનના ભેજની ઘટના અસરકારકતા તપાસવાના અખતરાની કામગીરીમાં મદત કરવી.
- પપૈયામાં વિસાણુ જન્ય રોગ (રીંગ વાયરસ) ફેલાવવાના કારણો અને તેના સંકલીત નિયંત્રણના અખતરાની કામગીરીમાં મદદ કરવી.
- પપૈયાના રોગોનું સંકલીત નિયંત્રણના અભ્યાસના અખતરાની કામગીરીમાં મદદ કરવી.
- ચીકુમાં જનીનીય બંધારણના વિસ્તાર માટેના અખતરાની કામગીરીમાં મદત કરવી.
- ચીકુમાં તબક્કા વાર પોષક તત્વોની જરૂરિયાત નક્કી કરવાના અખતરાની કામગીરીમાં મદત કરવી.
- બ. સ. ૨૦૧૪-૫ મા આવતા તમામ અખતરાની રોપણી કાપણી અને ઉત્પાદન, વેચાણની વ્યવસ્થાની કામગીરી.
- એમઆઈડીએચ યોજના (બ. સ. ૧૮૯૩૦-૭) હેઠળ મરી રોપ ઉછેર તથા હળદર બીજ ઉત્પાદનની લગતી સંપૂર્ણ કામગીરી તથા જરૂરી રજીસ્ટરો નિભાવવા.
- કેળમાં દ્રાયબલ સબ પ્લાન યોજના હેઠળ કેળ પાકમાં ડાંગ અને વલસાડ જીલ્લાઓમાં નિર્દેશનો લેવામાં મદદ, ખરીદી

- તથા સંબંધિત રજીસ્ટરો નિભાવવા.
- ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી સોંપવામાં આવતી અન્ય કામગીરી નિયત સમયમાં પૂર્ણ કરવી.
- ૮) **શ્રીમતી કૃતિજા બી. પટેલ, ખેતી મદદનીશ**
- બ. સ. ૫૦૧૪ ના સ્ટોરની સંપૂર્ણ કામગીરી.
 - મજૂર મસ્ટર બનાવવું, દૈનિક લેબરશીટ અને પગાર ચિટ્ટી લખવી તથા સ્ટોરને લગતા તમામ રજીસ્ટરો નિભાવવા અને મજૂર ઉપર દેખરેખ.
 - હવામાનના અવલોકનો લઈ તેનો રેકર્ડ રાખવો તથા હવામાનશાસ્ત્ર વિભાગ નવસારી ને મોકલવા ટે-૪ ને આપવા.
 - સ્થાનિક મંજૂરી રજીસ્ટર નિભાવવું.
 - ટ્રેકટર, પાવર ટ્રીલર અને બ્રશકટરની લોગબુક લખવી.
 - યોજનાના વાહનોની મરામત અંગેની સંપૂર્ણ કામગીરી કરવી જરૂર પડયે ટે-૨ એ ની મદદ લેવી.
 - બ.સ. ૫૦૧૪ ની નર્સરીની દેખરેખ તેમજ રોપા, કલમો તૈયાર કરી વેચાણની વ્યવસ્થા કરવી.
 - કચેરી સામેનો બગીચો તથા મુખ્ય દરવાજા સુધીના બગીચાની દેખરેખ.
 - ચીકુમાં ફર્ટીગેશનના અખતરાની કામગીરીમાં મદદકરવી.
 - ચીકુમાં જાતોના અખતરાની કામગીરીમાં મદદકરવી.
 - બ.સ. ૧૨૬૦૦, બ.હે. ૧૫૩૪ ની તમામ કામગીરી. રજી. નિભાવવા.
 - બ.સ. ૫૦૧૪ મા ચાલતા અખતરાની કામગીરી કરવી.
 - કચેરીની તેમજ પ્રસાન બ્લોકની સાફ સફાઈ કરાવવી.
 - ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી સોંપવામાં આવતી અન્ય કામગીરી નિયત સમયમાં પૂર્ણ કરવી.
- ૯) **શ્રી ડી. એન. પટેલ, હેડ કલાર્ક (ઈચા. સી. કલાર્ક ફરજ- ગણદેવી) (પગાર- વઘઈ)**
- બેંકની કામગીરી.
 - બજેટની કામગીરી.
 - કેશને લગતા રજીસ્ટરો નિભાવવા.
 - સેવાપોથી નિભાવવી/રજા મંજૂર કરવી/ અન્ય તમામ વહીવટી કામગીરી.
 - પગારબીલ બનાવવું તથા તેને લગતા તમામ રજીસ્ટરો નિભાવવા.
 - પી. એફ. પાસબુક નિભાવવી.
 - આ સિવાય કચેરીના જુ. કલાર્કને જરૂરી માર્ગદર્શન આપવું.
 - કચેરીના અધિકારી કર્મચારીઓની સેવાપોથી નિભાવવી. રજાઓ મંજૂર કરવી તથા અન્ય તમામ વહીવટી કામગીરી કરવી.
 - કર્મચારીના ગુપ્ત અહેવાલ તથા ખાનગી ટેબલને લગતો પત્ર વ્યવહાર કરવો.
 - ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી સોંપવામાં આવતી અન્ય કામગીરી નિયત સમયમાં પૂર્ણ કરવી.
- ૧૦) **શ્રી અશોક રાજપુત, જુનીયર કલાર્ક**
- કચેરીના આઉટ વર્ડ, ઈન વર્ડની કામગીરી તેમજ પોસ્ટેજ સ્ટેમ્પનો હિસાબ રાખવો.
 - તમામ પ્રકારના કન્ટ્રીજન્સી બીલો બનાવવા જેવા કે, પેએબલ તથા નોટપેએબલ ડી.સી બીલો બનાવવા ઉચ્ચક બીલો બનાવવા, પગાર બીલ તથા એરીયર્સ બીલો બનાવવા મુસાફરી ભથ્થા બીલો તથા પી. એફ એડવાન્સ તેમજ અન્ય પેશગી બીલો બનાવવા.
 - માસિક આવક- ખર્ચના રજીસ્ટરો નિભાવવા.
 - ઓડિટ પેરાને લગતા જવાબો તૈયાર કરવા તેમજ રેકૉર્ડ નિભાવવો.
 - સ્ટેશનરી રજીસ્ટર નિભાવવું.
 - કચેરીની તમામ અંગ્રેજી, ગુજરાતી ટાઈપીંગ અને કોમ્પ્યુટર ઉપર કચેરીના અહેવાલ તૈયાર કરવાની કામગીરી કરવી.
 - જી.એસ.ટી. તથા ઈન્કમેટેક્સ ને લગતી કામગીરી અંગેની માહિતી ચાર્ટડ એકાઉન્ટન્ટને મોકલાવાની કામગીરી
 - કચેરીમા આવતા ઈમેલ તથા સરકયુલર ચેક કરવાની કામગીરી.
 - વહીવટી-વ- હિસાબી અધિકારીની કચેરી તરફથી પાસ થયેલ બીલોને URP સોફ્ટવેરમાંથી ટ્રેઝરી સ્લીપ કાઢી, ચેક લખવાની કામગીરી.
 - તમામ પ્રકારના કન્ટ્રીજન્સી બીલો બનાવવા જેવા કે, પેએબલ તથા નોટપેએબલ ડી.સી બીલો બનાવવા ઉચ્ચક બીલો બનાવવા, મુસાફરી ભથ્થા બીલો તથા પી. એફ એડવાન્સ તેમજ અન્ય પેશગી બીલો બનાવવા.
 - કેશબુક નિભાવવી.
 - ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી સોંપવામાં આવતી અન્ય કામગીરી નિયત સમયમાં પૂર્ણ કરવી.

મુદદા નં ૩. દેખરેખ અને જવાબદારીના માધ્યમ સહિત નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં અનુસરવાની કાર્યરીતિ :

- યુનિટ ખાતે ફરજ બજાવતા અધિકારીઓ તથા કર્મચારીઓની તમામ સંશોધનને લગતી કામગીરી તેમજ વહીવટી તથા હિસાબી કામગીરી સહ સંશોધન વૈજ્ઞાનિકશ્રી(ફળ) ના માર્ગદર્શન હેઠળ કરવામાં આવે છે.

મુદદા નં ૪. પોતાના કાર્યો બજાવવા માટે નક્કી કરેલા ધોરણો :

- યુનિવર્સિટીના નિયમો મુજબ સંશોધનને લગતી સઘળી કામગીરી તથા વહીવટી કર્મચારીઓ દ્વારા કચેરીને લગતી તમામ પ્રકારની વહીવટી તથા હિસાબી કામગીરી યુનિવર્સિટીના નીતિ-નિયમો મુજબ કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત અનુસ્નાતક વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન અને શિક્ષણ આપવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે. તેમજ સરકારશ્રીના ઠરાવો મુજબ કામગીરી કરવામાં આવે છે.

મુદદા નં ૫. પોતાના કાર્યો બજાવવા માટે પોતાની પાસેના અથવા પોતાના નિયંત્રણ હેઠળના અથવા પોતાના કર્મચારીઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા નિયમો, વિનિયમો, સૂચનાઓ, નિયમસંગ્રહો અને રેકર્ડ :

- કૃષિ યુનિવર્સિટીની સ્ટેચ્યુટરી જોગવાઈઓ મુજબ નિયમો, વિનિયમો અને સૂચનાઓને અનુસરવામાં આવે છે તેમજ માન. રાજ્ય સરકારશ્રીના કૃષિ અને સહકાર વિભાગના આદેશો અનુસાર કામગીરી કરવામાં આવે છે. હિસાબી કામગીરીનું લોકલ ફંડ ઓડીટરશ્રી દ્વારા ઓડીટ કરાવવામાં આવે છે તેમજ અત્રેના એકમ દ્વારા જરૂરી રજીસ્ટરો નિભાવવામાં આવે છે જેવા કે ડેડસ્ટોક, સ્ટોર રોજમેન, ચીજવસ્તુ વપરાશ, મંજૂરી, લેબરશીટ, હાજરી પત્રક, રીપેરીંગ, સાધનોની લોગબુક, વાહનની લોગબુક અને હિસ્ટ્રીશીટ, નમુના રજીસ્ટર, પરચુરણ રજા, ટપાલ, આવક જાવક તથા હિસાબી રજીસ્ટરો જેવા કે કેશબુક, રસીદ બુક, માસિક ખર્ચ પત્રકરજીસ્ટર વિગેરે રેકર્ડની નિભાવણી કરવામાં આવે છે.

મુદદા નં ૬. પોતાની પાસે અથવા પોતાના નિયંત્રણ હેઠળ હોય તેવા દસ્તાવેજોની કક્ષા અને વર્ગીકરણનું પત્રક :

૧) ડૉ. અર્પિતાબેન એમ. પટેલ, મદદનીશ સંશોધન વૈજ્ઞાનિક (બાગાયત)

- કેળ, ચીકુ અને પપૈયા પાકના બાગાયત વિભાગના અખતરાની ફાઈલો.
- યોજનાના બાગાયત વિભાગના ત્રિમાસિક, છમાસિક, વાર્ષિક તથા એગ્રસ્કો રીપોર્ટ ની ફાઈલો.
- દરેક પાકની GAP (ગુડ એગ્રીકલ્ચરલ પ્રેક્ટાઈસીસ) રેકોર્ડ.
- ફાર્મના પાકનું પૂથ્યકરણ રેકોર્ડ.

૨) ડૉ. શિવાંગી એસ. કંસારા, મદદ સંશોધન વૈજ્ઞાનિક (રોગશાસ્ત્ર)

- કેળ, ચીકુ અને પપૈયાના પાકના રોગશાસ્ત્ર વિભાગના અખતરાની ફાઈલો.
- યોજનાનો રોગશાસ્ત્ર વિભાગનો ત્રિમાસિક, છમાસિક, વાર્ષિક તથા એગ્રસ્કો રીપોર્ટ ની ફાઈલો.
- યોજનાને લગતા પત્ર વ્યવહાર ની ફાઈલો.
- યોજનાના લેબોરેટરી તેમજ અન્ય સાધનોની ખરીદી તથા મરામતની ફાઈલો.
- આરટીઆઈ ના રીપોર્ટની ફાઈલો.

૩) ડૉ. કે. ડી. બિસને, સહ સંશોધન વૈજ્ઞાનિક (કિટકશાસ્ત્ર)

- કેળ, ચીકુ અને પપૈયાના પાકના કિટકશાસ્ત્ર વિભાગના અખતરાની ફાઈલો.
- મોજણી-નિગાહ આધારીત પાક પૂર્વાનુમાન પદ્ધતિના અવલોકનો નું રજીસ્ટર.
- લેબોરેટરી સાધનોની ખરીદી તથા મરામતની ફાઈલો.
- યોજનાનો ત્રિમાસિક, છમાસિક, વાર્ષિક તથા એગ્રસ્કો નો રીપોર્ટ ની ફાઈલો.
- રીસર્ચ પેપર રજીસ્ટર, ભલામણ કરેલ તેનું રજીસ્ટર, સેમીનાર / સીમ્પોઝીયમ / કોન્ફરન્સ / વર્કશોપ / શોર્ટ ટર્મ ટ્રેનીંગ / સમર એન્ડ વિન્ટર સ્કુલ ટ્રેનીંગ / ઓરીએન્ટેશન ટ્રેનીંગ / રીફ્રેસર કોર્સ / અન્ય કોર્સ માટેનું રજીસ્ટર/ઓથ. રીક્રીકેશન રજીસ્ટર.

૪) શ્રી. કાર્તિકકુમાર એસ. જોટગીયા, સી.ની. ટેક. આસીસ્ટન્ટ

- કેળ, ચીકુ અને પપૈયાના પાકના બાગાયત વિભાગના અખતરાની ફાઈલો (બ. સ. ૨૦૧૪-૫).

- લેબોરેટરીમાં પૃથ્થકરણની કામગીરી તથા લેબોરેટરી સાધનોની લોગબુક.
- કેમીકલ, ગ્લાસવેર અને પ્લાસ્ટીક વેર રજીસ્ટર.
- વેધશાળાના અવલોકન ની ફાઈલો તથા રજીસ્ટર.

પ) શ્રી ડી. આઈ. ચોધરી, ખેતી અધિકારી

- કેળ, ચીકુ અને પપૈયાના પાકના અખતરાની ફાઈલો (બ. સ. ૫૦૧૪).
- સ્ટોરની ખરીદીની ફાઈલો તથા રજીસ્ટરો.
- યોજનાના વાહનોની મરામત અંગેની ફાઈલ.
- હવામાનના અવલોકન રજીસ્ટર નિભાવવું.

ફ) શ્રી એચ. આર. પટેલ, ખેતી મદદનીશ (ઈયા. ખેતી મદદનીશ, ફરજ-ગણદેવી) (પગાર-નવસારી)

- બ. સ. ૨૦૧૪-૫ ના સ્ટોર રજીસ્ટરો.
- જીપ જીજે-૨૧-એએ-૫૩૮૬ ની લોગબુક.
- બ. સ. ઓઆર-૧ ના રજીસ્ટરો.

ગ) શ્રી એન. પી. નાયક, ખેતી મદદનીશ

- રીવોલ્વીંગ ફંડ યોજનાના ખરીદ વેચાણ અંગેનો તમામ રજીસ્ટરો.
- રીવોલ્વીંગ ફંડ યોજનાના ડેડસ્ટોક રજીસ્ટર, હિસ્ટ્રીટ રજીસ્ટર અને ખરીદ તથા વેચાણની કામગીરીનાં રજીસ્ટર.
- કેળ માં ટ્રાયબલ સબ પ્લાન હેઠળ ના અખતરાઓ (ડાંગ અને વલસાડ જીલ્લાઓ) તથા સંબંધિત રજીસ્ટરો.
- નર્સરી પ્રવૃત્તિ જેવી કે આંબા-ચીકુ કલમ અને જુદા જુદા ફળોની કલમો તથા રોપા ની નોંધ પોથી.
- એમઆઈડીએચ યોજના (બ. સ. ૧૮૯૩૦-૭) હેઠળ મરી રોપ તથા હળદર બીજ ઉત્પાદનની ખરીદી તથા જરૂરી રજીસ્ટરો.

ઠ) શ્રીમતી કૃતિજા બી. પટેલ, ખેતી મદદનીશ

- બ. સ. ૫૦૧૪ ના સ્ટોરની રજીસ્ટર.
- મરી તથા કોફી પાકની જાળવણી તથા ઉત્પાદનનોંધ રજીસ્ટર.
- ટ્રેક્ટર જીજે૨૧-૮૦૮૫ ની લોગબુક.
- કલમો તથા રોપાની જરૂરિયાત માટે ખેડૂતો તેમજ અન્ય સંસ્થાની અરજીઓનું રજીસ્ટર.
- જેઆરએફ / એસઆરએફ / આરએ / રોજમદારનાં કોન્ટ્રાક્ટ્યુલ રજીસ્ટર.

ડ) શ્રી ડી. એન. પટેલ, હેડ કલાર્ક (ઈયા. સી. કલાર્ક, ફરજ- ગણદેવી) (પગાર- વઘઈ)

- બજેટ અંગેની ફાઈલો.
- કેશને લગતા રજીસ્ટરો.
- પી. એફ. પાસબુક.
- કચેરીના અધિકારી કર્મચારીઓની સેવાપોથી.
- ઓડિટ પેરાને લગતા રેકૉર્ડ અંગેની ફાઈલો.
- કર્મચારીના ગુપ્ત અહેવાલ ની ફાઈલો.

૧૦) શ્રી અશોક રાજપુત, જુનીયર કલાર્ક

- માસિક આવક- ખર્ચના રજીસ્ટરો.
- કેશબુક.
- પગારબીલ તથા તેને લગતા તમામ રજીસ્ટરો.
- કચેરીના આઉટ વર્ડ, ઈન વર્ડ તેમજ પોસ્ટેજ સ્ટેમ્પના રજીસ્ટરો.
- સ્ટેશનરી રજીસ્ટર.
- મુસાફરી ભથ્થા બીલો તથા પી.એફ. એડવાન્સ, અન્ય પેશગી બીલો તૈયાર કરવા.
- કચેરીને લગતું તમામ ગુજરાતી અને અંગ્રેજી ટાઈપીંગ.
- તમામ પ્રકારના કન્ટ્રીજન્સી બીલો બનાવવા.

મુદ્દા નં ૭. વિભાગ કે સત્તામંડળે અનુસરવાની નીતિ અથવા તેના અમલીકરણ સંબંધમાં નાગરિકો સાથે વિનિમય માટે અથવા તેમના ધ્વારા રજુઆત માટેની વિદ્યમાન ગોઠવણની વિગતો :



- અત્રેની કચેરીમાં માત્ર સંશોધનની કામગીરી ચાલતી હોય જનતા ના સભ્યો સાથે સીધો સંપર્ક રહેતો નથી જેથી લાગુ પડતું નથી.

મુદ્દા નં ૮. તેના ભાગ તરીકે અથવા તેની સલાહના હેતુ માટે બે અથવા તેથી વધુ વ્યક્તિઓના બનેલા બોર્ડ, કાઉન્સિલ, સમિતિ અને બીજા મંડળોની બેઠકો લોકોમાટે ખુલ્લી છે કે કેમ અથવા તેવી બેઠકોની કાર્યનોંધો લોકોને મળવાપાત્ર છે કે કેમ? :

- કેન્દ્રના વૈજ્ઞાનિકો સંશોધનને લગતી કમિટીના સભ્યો છે પરંતુ તેમાં સામાન્ય નાગરીક માટે પ્રવેશ ન હોવાથી ફક્ત યુનિવર્સિટીમાં અમલીકરણ પુરતીજ મર્યાદિત છે.

મુદ્દા નં ૯. તેના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની માહિતી પુસ્તિકા :

- યુનિવર્સિટી દ્વારા "સંપર્ક સેતુ" નામની માહિતી પુસ્તિકા અલગથી બહાર પાડવામાં આવેલ છે. તેમજ તેની માહિતી યુનિવર્સિટીની વેબસાઈટ પર (nau.in) પણ ઉપલબ્ધ છે.

મુદ્દા નં ૧૦. તેના વિનિમયોમાં જોગવાઈ કર્યા પ્રમાણે વળતરની પદ્ધતિ સહિત તેના દરેક અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને મળતા માસિક મળતરની વિગતો:

અ.નં	અધિકારીશ્રીનું નામ/હોદ્દો	પગાર ધોરણ	ગ્રોસ પે
૧.	ડો. એ. પી. પટેલ, સહ સંશોધન વૈજ્ઞાનિક(ફળ)	રૂ. ૧૪૪૨૦૦-૨૧૮૨૦૦	રૂ. ૨,૪૦,૩૭૨/-
૨.	ડૉ. અર્પિતાબેન એમ. પટેલ, મદદ સંશો. વૈજ્ઞાનિક (બાગાયત)	રૂ. ૫૭૭૦૦-૧૮૨૪૦૦	રૂ. ૯૬,૭૮૨/-
૩.	ડો. કે. ડી. બિસને, સહ સંશો. વૈજ્ઞાનિક (કિટકશાસ્ત્ર)	રૂ. ૧૩૧૪૦૦-૨૧૭૧૦૦	રૂ. ૨,૩૨,૭૯૮/-
૪.	ડૉ. શિવાંગી એસ. કંસારા, મદદ સંશો. વૈજ્ઞાનિક (રોગશાસ્ત્ર)	રૂ. ૭૯૮૦૦-૨૧૧૫૦૦	રૂ. ૧,૪૭,૪૯૬/-
૫.	શ્રી. કાર્તિકકુમાર એસ. જોટગીયા, સીની. ટેક. આસીસ્ટન્ટ	રૂ. ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦	રૂ. ૬૭,૮૩૪/-
૬.	શ્રી. ડી. આઈ. ચોધરી, ખેતી અધિકારી	રૂ. ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦	રૂ. ૭૧,૨૧૮/-
૭.	શ્રી. એચ. આર. પટેલ, ઈયા. ખેતી મદદનીશ, ફરજ-ગણદેવી (પગાર- નવસારી)	રૂ. ૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦	રૂ. ૫૮,૯૩૪/-
૮.	શ્રી. એન. પી. નાયક, ખેતી મદદનીશ	રૂ. ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦	રૂ. ૫૦,૧૩૬/-
૯.	શ્રીમતી કૃતિજ્ઞા બી. પટેલ, ખેતી મદદનીશ	રૂ. ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦	રૂ. ૫૦,૧૩૬/-
૧૦.	શ્રી. સી. બી. મકવાણા, સી. કલાર્ક (ફરજ- નવસારી)	રૂ. ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦	રૂ. ૪૫,૩૪૬/-
૧૧.	શ્રી. ડી. એન. પટેલ, ઈયા. સી. કલાર્ક, ફરજ- ગણદેવી (પગાર- વધઈ)	રૂ. ૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦	રૂ. ૮૭,૨૫૪/-
૧૨.	શ્રી. અશોક રાજપુત, જુનીયર કલાર્ક	રૂ. ૧૯૯૦૦- ૬૩૨૦૦	રૂ. ૩૮,૧૮૪/-
૧૩.	શ્રી. એ. એમ. હલપતી, લેબ. એટેન્ડન્ટ (ફરજ- નવસારી)	રૂ. ૧૪૮૦૦- ૪૭૧૦૦	રૂ. ૪૦,૨૧૦/-
૧૪.	શ્રી. બી. એન. પટેલ, માલી (ફરજ- નવસારી)	રૂ. ૧૮૦૦૦-૫૬૯૦૦	રૂ. ૬૭,૪૭૪/-
૧૫.	શ્રી. આશીષ ઠાકોર, માલી (ફરજ- નવસારી)	રૂ. ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦	રૂ. ૩૭,૮૮૬/-
૧૬.	શ્રી. એ. ડી. પટેલ, માલી (ફરજ-સુરત)	રૂ. ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦	રૂ. ૩૮,૭૨૦/-
૧૭.	શ્રી. આર. કે. પટેલ, માલી (ફરજ- નવસારી)	રૂ. ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦	રૂ. ૬૨,૯૫૨/-

મુદ્દા નં ૧૧. તમામ યોજનાઓ, સૂચિત ખર્ચ અને ચુકવેલા નાણાં પરના અહેવાલોની વિગતોદર્શાવતુ, તથા તેની દરેક એજન્સી ને ફાળવેલ અંદાજપત્ર :

- સરકારશ્રી કૃષિ અને સહકાર વિભાગ દ્વારા વિવિધ પ્લાન, નોન પ્લાન યોજનાઓનું બજેટ મંજૂર કરી યુનિવર્સિટી દ્વારા વિવિધ યોજનાઓ પ્રમાણે આયોજન અધિકારીશ્રી તથા હિસાબી અધિકારી-વ હિસાબ નિયામકશ્રી મારફત ફાળવવામાં આવે છે. આ ફાળવેલ ગ્રાંટ મુજબ નાણાંકીય વર્ષ દરમિયાન ખર્ચ કરવામાં આવે છે અને વર્ષના અંતે યુનિવર્સિટી દ્વારા સંયુક્ત અહેવાલ તૈયાર કરવામાં આવે છે. હિસાબી અહેવાલ અત્રેની યુનિવર્સિટીના હિસાબી અધિકારી-વ-હિસાબ નિયામકશ્રી દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે. જેને સરકારશ્રીમાં રજૂ કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત આઈસીઆર યોજનાઓને પ્રોજેક્ટ કોઓર્ડિનેટર દ્વારા ગ્રાંટ

મંજૂર કરી અત્રેના કેન્દ્રને ફાળવવામાં આવે છે. આ ફાળવેલ ગ્રાંટ મુજબ નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન ખર્ચ કરવામાં આવે છે અને વર્ષના અંતે ગ્રાંટ વપરાશ પ્રમાણપત્ર હિસાબી અધિકારી-વ-હિસાબ નિયામકશ્રી દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે અને પ્રોજેક્ટ કોઓર્ડિનેટર મારફત આઈસીએઆરમાં રજૂ કરવામાં આવે છે.

અ.નં	યોજનાનું નામ	બજેટ સદર	ફાળવેલ રકમ (રૂ. લાખમાં)
આઈ. સી. એ.આર. યોજના			
૧.	એ.આઈ.સી.આર.પી. ઓન ફૂટ (કેળ, પપૈયા અને ચીકુ)	૨૦૧૪-૫	---
૨.	ટ્રાયબલ સબ પ્લાન યોજના	૨૦૭૫	---
નોન પ્લાન યોજના			
૩.	રીસર્ચ ઈન ફૂટ ક્રોપ્સ	૫૦૧૪	---
અધર એજન્સી			
૪.	રીવોલ્વીંગ ફંડ	૯૫૧૦-એન-૧૨	---
૫.	એમઆઈડીએચ યોજના	૧૮૯૩૦-૭	---
૬.	ઓછા ખર્ચે કેળાના રોપા બનાવવાની મેક્રો પ્રોપાગેશનપદ્ધતિ	૧૨૦૮૪	---

મુદદા નં ૧૨. ફાળવેલ રકમો અને તેવા કાર્યક્રમોના લાભાર્થીઓની વિગતો સહિત આર્થિક સહાય કાર્યક્રમોની અમલ બજવણીની રીત :

➤ ઉપરોક્ત મુદદો અત્રેના કેન્દ્રને લાગુ પડતો નથી.

મુદદા નં ૧૩. છુટછાટો, પરવાનગીઓ અથવા અધિકૃતિઓ મેળવનારાની વિગતો :

➤ ઉપરોક્ત મુદદો અત્રેના કેન્દ્રને લાગુ પડતો નથી.

મુદદા નં ૧૪. ઈલેક્ટ્રોનિક સ્વરૂપમાં ઉપલબ્ધ અથવા ધરાવેલી માહિતીને લગતી વિગતો :

➤ નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી ની વેબ સાઈટ www.nau.in પર અત્રેના કેન્દ્ર ને લગતી જરૂરી તમામ માહિતી ઉપલબ્ધ છે.

મુદદા નં ૧૫. જાહેર ઉપયોગ માટે નિભાવવામાં આવતા હોય તેવા ગ્રંથાલય અથવા તેવા વાંચનાલયના કામકાજ ના કલાકો સહિતની માહિતી તથા તે મેળવવા માટેનાગરિકોને ઉપલબ્ધ સુવિધાઓની વિગત :

➤ લાગુ પડતું નથી.

મુદદા નં ૧૬ જાહેર માહિતી અધિકારીઓના નામો, હોદ્દાઓ અને બીજી વિગતો :

જાહેર માહિતી અધિકારી

૧) ડૉ. એ. પી. પટેલ,

સહ સંશોધન વૈજ્ઞાનિક(ફળ)

ફળ સંશોધન કેન્દ્ર, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, ગણદેવી

મો. નં ૯૪૨૭૧૧૨૮૪૭ E-mail: frsgandevi@nau.in

મદદનીસ જાહેર માહિતી અધિકારી

૧) ડૉ. શિવાંગી એસ. કંસારા,

મદદનીસ સંશોધન વૈજ્ઞાનિક (રોગ)

ફળ સંશોધન કેન્દ્ર, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, ગણદેવી

મો. નં ૯૬૮૭૫૪૫૯૫૨ E-mail: shivangi.kansara@nau.in

મુદદા નં ૧૭. ઠરાવવામાં આવે તેવી બીજી માહિતી પ્રસિધ્ધ કરવી જોઈએ અને ત્યાર પછી દર વર્ષે આ પ્રકાશનોને અદ્યતન કરવા જોઈએ :

➤ હા, આ માહિતી મે-૨૦૨૫ માં અદ્યતન કરેલ છે.

મુદદા નં ૧૮. ચાલુ વર્ષના વૈજ્ઞાનિક પ્રમાણે અખતરાઓની યાદી :

Dr. A. P. Patel (Horticulture Trials)

Sr. No.	Trial	B.H.
1.	Collection, characterization, conservation, evaluation and utilization of banana germplasm	2014-5 (ICAR)
2.	MLT (VI) of Banana selections/Introduced hybrid (b) Anand Vaaman	2014-5 (ICAR)
3.	Assessment of phenology, productivity and incidence of insect pests and diseases in banana grown under varying climatic conditions	2014-5 (ICAR)
4.	Multi-location testing of new papaya hybrids (MLT-II)	2014-5 (ICAR)
5.	NPK transforming biofertilizer formulation for banana	2014-5 (ICAR)
6.	Spacing and canopy management in sapota	2014-5 (ICAR)
7.	Studies on residual and cumulative effect of nutrients in sapota	2014-5 (ICAR)
8.	Multilocation testing of sapota varieties (MLT)	2014-5 (ICAR)
9.	Multilocation testing of Kamalam (Dragon fruit) variety (MLT-1)	2014-5 (ICAR)
10.	Optimization of irrigation scheduling and fertilizer doses (N:P:K) in Kamalam (dragon fruit)	2014-5 (ICAR)
11.	Fertigation studies in sapota cv. Kalipatti	5014
12.	Feasibility of banana germplasm for processing	5014
13.	Canopy architecture of sapota orchard	5014

Dr. Arpitaben M. Patel (Horticulture Trials)

Sr. No.	Trial	B.H.
1.	Clonal selection in banana	2014-5 (ICAR)
2.	Evaluation of new introduction of banana (MLT-5) (b) NRCB selection 14	2014-5 (ICAR)
3.	MLT (VI) of Banana selections/Introduced hybrid (a) NRCB Selection 16	2014-5 (ICAR)
4.	Multi-location testing of new papaya selection (MLT-I)	2014-5 (ICAR)
5.	Grafting in papaya	2014-5 (ICAR)
6.	Widening the genetic base in sapota	2014-5 (ICAR)
7.	Evaluation of new hybrids of sapota	2014-5 (ICAR)
8.	Testing the Efficacy of micro-nutrient mixtures for better yield and quality of banana under different Agro-climatic conditions (Observational Trial)	2014-5 (ICAR)
9.	Sunburn mitigation in Kamalam (dragon fruit) through kaolin-based bio-stimulant spray technology	2014-5 (ICAR)

Dr. K. D. Bisane (Entomology Trials)

Sr. No.	Trial	B.H.
1.	Survey on new and emerging insect pests and plant parasitic nematodes with their natural enemies in banana	2014-5 (ICAR)
2.	Management of banana weevils with Novel insecticides	2014-5 (ICAR)
3.	Banana weevil killer (<i>Beauveria bassiana</i> NRCB EPF22) for management of banana weevils	2014-5 (ICAR)
4.	Arka mealy-melt technology for management of mealy bugs in	2014-5 (ICAR)

	papaya	
5.	Survey and surveillance of emerging insect pests of sapota and their natural enemies	2014-5 (ICAR)
6.	Slow-release pheromone formulation for the management of fruit fly in sapota	5014
7.	Studies of population dynamics and natural enemies of sapota midrib folder, <i>Banisia myrsusalis eleoralis</i> (Walker)	5014
8.	Evaluation of different modules against of major insect pests of sapota	5014

Dr. Shivangi S. Kansara (Plant Pathology Trials)

Sr. No.	Trial	B.H.
1.	Survey on disease dynamics in banana	2014-5 (ICAR)
2.	Diagnosis of banana viruses in germplasm and planting material used in experiments	2014-5 (ICAR)
3.	Artificial Intelligence (AI) powered decision support system development for leaf spot disease management in banana.	2014-5 (ICAR)
4.	Bio intensive management of Fusarium wilt disease in Banana	2014-5 (ICAR)
5.	Bio control management of Eumusae leaf spot in banana	2014-5 (ICAR)
6.	Evaluation of Banana selections for disease resistance (a) NRCB Selection 20 (Observational trial)	2014-5 (ICAR)
7.	Evaluation of Banana selections for disease resistance (b) Gujarat	2014-5 (ICAR)
8.	Survey on disease dynamics in papaya	2014-5 (ICAR)
9.	Screening of germplasm against rhizome rot	5014
10.	New and emerging diseases in sapota	5014

મુદદા ૧૯. જેઆરએફ / એસઆરએફ / આરએ / રોજમદારનાં કોન્ટ્રાક્ટ્યુલ કર્મચારીઓનું વિગતો :

અ.નં	કર્મચારીનું નામ	હોદ્દો	યોજના	બજેટ સદર
	આઈ. સી. એ.આર. યોજના			
૧.	શિરીષ સી. પટેલ	જીપ ડ્રાઈવર	ટી.એસ.પી.	૨૦૭૫
	નોન પ્લાન યોજના			
૨.	ભીખુ કે. નાયક	ટ્રેક્ટર ડ્રાઈવર	રીસર્ચ ઈન ફ્રૂટ ક્રોપ્સ	૫૦૧૪
૩.	કુ. વૃત્તી કે. પટેલ	એસઆરએફ	ઓછા ખર્ચે કેળાના રોપા બનાવવાની મેક્રો પ્રોપાગેશનપદ્ધતિ	૧૨૦૮૪

મુદદા ૨૦. પ્રકાશિત થયેલ વર્ષ વાર સંશોધન પેપરો :

- Patel, C. B.; D. B. Patel and A. N. Patel (1995). High density plantation in relation to export quality of banana (*Musa spp. cv. Basrai*). *J. Applied Hort.*, 1(1&2): 73-77.
- Patel, C. B.; B. N. Patel and A. N. Patel (1996). A note on seed germination technique for *Khirnee (Manilkara hexandra (Roxb.) Dub.)*. *J. Applied Hort.*, 2(1&2): 149-150.
- Patel, Z. P. (2001). Record of seed borer of sapota (*Manilkara achra* (mill.) Foresberg). *Insect Environment*, 6(4): 149.
- Patel, C. B.; A. N. Patel and A. D. Patel (2001). High density plantation in relation to increasing of production in sapota (*Manilkara achra* (mill.) Foresberg) cv. Kalipatti. *South Indian Hort.*, 4: 4923.
- Patel, Z. P. and V. S. Jagdale (2003). Two curculionids on banana in Gujarat. *Insect Environment*, 9(3): 120-121.
- Patel, C. B.; A. N. Patel and A. D. Patel (2004). Effect of different spacing on growth, yield and quality of banana cv. Gandevi Selection in South Gujarat condition. In: Proceedings of National Seminar on "Banana Industry- Present Scenario and Future Strategies" organized by BCKV, Kalyani (West Bengal) during 11th to 13th June, 2004, pp: 64-67.

7. Patel, C. B.; A. N. Patel and A. D. Patel (2004). Evaluation of different banana varieties with high and low inputs of manures and fertilizers application. *In: Proceedings of National Seminar on "Banana Industry- Present Scenario and Future Strategies"* organized by BCKV, Kalyani (West Bengal) during 11th to 13th June, 2004, pp: 125-129.
8. Patel, A. N.; C. B. Patel; A. D. Patel and D. B. Patel (2004). Effect of planting time on growth, yield and quality of banana cv. Basrai. Paper presented in National Seminar on "Banana Industry- Present Scenario and Future Strategies." Organized by BCKV, Kalyani (West Bengal) during 11th to 13th June, 2004.
9. Patel, A. N.; C. B. Patel; A. D. Patel and D. B. Patel (2004). Fertigation studies in banana cv. Basrai under high density plantation. Paper presented in National Seminar on "Banana Industry- Present Scenario and Future Strategies." Organized by BCKV, Kalyani (West bangal) during 11th to 13th June, 2004.
10. Jhala R. C.; D. B. Sisodiya; H. R. Saradana; A. Tyagi; Z. P. Patel; V. S. Jagadale; J. M. Stonehouse; J. D. Mumford and A. Verghes (2005). Laboratory and field effectiveness of Tephritid fruit fly in Gujarat and elsewhere in India. *Pest Mngt. Hortl. Ecosys.*, 11(2): 91-98.
11. Patel Z. P.; R. C. Jhala; V. S. Jagadale; D. B. Sisodiya; J. M. Stonehouse; A. Verghes and J. D. Mumford (2005). Effectiveness of wood for soaked-block annihilation of male fruit flies in Gujarat. *Pest Mngt. Hortl. Ecosys.*, 11(2): 117-120.
12. Patel Z. P.; R. C. Jhala; V. S. Jagadale; D. B. Sisodiya; J. M. Stonehouse; A. Verghes and J. D. Mumford (2005) Methyl eugenol and *Ocimum sanctum* in fruit fly traps in Gujarat . *Pest Mngt. Hortl. Ecosys.*, 11(2): 126-128.
13. Patel Z. P.; J. M. Stonehouse; A. Verghes and J.D. Mumford (2005) Roles of lure and insecticide in male fruit fly annihilation. *Pest Mngt. Hortl. Ecosys.*, 11(2): 131-132.
14. Stonehouse J. M.; A. Verghes; J. D. Mumford; J. Thomos , T. Jiji; R. Faleiro; Z. P. Patel; R. C. Jhala; R. K. Patel; R. P. Shukla; S. Satpathy; H. S. Singh; Amerika Singh and H. R. Sardana (2005). Research conclusion and recommendations for the On- Farm IPM of Tephritid fruit flies in India. *Pest Mngt. Hortl. Ecosys.*, 11(2): 172-180.
15. Stonehouse J. M.; J. D. Mumford and Z. P. Patel (2007). Village level area-wide fruit fly suppression in India: Bait application and male annihilation at village level and farm level. *Crop Protection*, 26(2): 788-793.
16. Patel P. R. (2009). Chemical control of sigatoka leaf spot (*Mycosphaerella musical*) disease of banana. *International J. Pl. Prot.*, 2(1): 98-10.
17. Patel A. R.; S. N. Saravaiya; A. N. Patel; K. D. Desai; N. M. Patel and J. B. Patel (2010). Effect of micronutrients on yield and fruit quality of banana (*Musa paradisica* L.) cv. Basrai (AAA) under pair row planting method. *Asian J. Hort.* 1: 245-248.
18. Patel P. R. and Abhishek Shukla (2010). Studies on host pathogen interaction of Banana Bunchy Top. *International J. Pl. Prot.*, 2(2): 176-177.
19. Abhishek Shukla and P. R. Patel (2010). Comparative biology of banana aphid, *Pentalonia nigronervosa* (Hemiptera : Aphididae) on banana cultivars. *Indian J. Appl. Ent.*, 24(1): 32-35.
20. Abhishek Shukla (2010). Insect pest of banana with special reference to weevil and borers. *International J. Pl. Prot.*, 3(3): 387-393.
21. Patel A. N. and Patel A. R. (2011). Effect of bio-fertilizer and vermicompost on growth, yield and quality of banana cv. Basrai (AAA) under high density planting. *Res. J. Agril. Sci.*, 2(3):497-501.
22. Waghunde, R. R.; Sabalpara, A. N.; Naik, B. M. and Patel, P. P. (2013). Biological control of finger millet (*Elusine coracana* L.) leaf blast by *Magnaporthe grisea* (Cke) Sacc. *J. Mycopathol Res.*, 51(1): 125-130.
23. Waghunde, R.R.; Jadhav, P.B.; Padhiyar, B.V.; Mehta, B.P.; Patel, A.N. and Sabalpara, A.N. (2014). Machro - phomina and steam end rot-new post Harvest diseases of papaya in Gujarat. *J. Pl. Dis. Sci.*, 9(1): 98-99.
24. Khopade, R.Y.; Patel, A.N.; Hiray, S.A. and Chadage, N.J. (2015). Effect of Biofertilizers, GA3 and micronutrients on yield and economics of sapota cv. Kalipatti. *Trends in Biosciences*, 8(18):5019-5021.
25. Khambhu C.V. and Bisane K.D.(2015). Population dynamics and management of sapota seed borer, *Trymalitis margarias* Meyrick. *Pest Mngt. Hort. Ecosys.*, 21 (2): 125-130.

26. Khambhu, C.V. and Bisane, K.D. (2016). Seasonal abundance of midrib folder and leaf miner on different of varieties of sapota. *International J. Tropical Agri.*,34(4):935-941.
27. Bisane, K.D. and Naik, B.M. (2016). Varietal performance of sapota against bud and seed boring insect pests under South Gujarat condition. *International J. Tropical Agri.*,34(5):1207-1210.
28. Bisane K.D. (2016). Seasonal cyclicity and behavior of sapota seed borer, *Trymalitis margarias* Meyrick. *Pest Mngt. Hort. Ecosys.*, 22 (2): 129-133.
29. Bisane, K.D.; Saxena, S. P. and Naik, B.M. (2017). Management of red rust thrips, *Chaetanophothrips signipennis* (Bagnall) in banana. *J. Appl. Nat. Sci.*,9 (1): 181 – 185.
30. Khambhu C.V. and Bisane K.D. 2017. Seasonal occurrence of chiku moth [*Nephoteryx eugraphella*] (Ragonot) and bud borer [*Anarsia achrasella*] Bradley on sapota. *Entomon*,42(3): 207-214.
31. Bisane, K.D., Saxena, S.P. and Naik, B.M. (2017). Bio-efficacy of newer insecticides against sapota seed borer, *Trymalitis margarias* Meyrick. *J. Ent. Zoo. Stud.*,5 (3): 1853-1856.
32. Bisane, K.D. (2017). Population diversity and cyclicity of fruit Fly (*Bactrocera* spp.) in sapota orchard under south Gujarat condition. *Indian J. Eco.*, 44(2): 369-374.
33. Bisane, K.D. (2017). Cyclic occurrence of midrib folder, *Banisia myrsusalis Eleoralis* (walker) and leaf miner, *Acrocercops gemoniella* Stainton in sapota. *J. Insect Sci.*, 30(1): 79-83.
34. Bisane K.D., N.M. Patil, B. Padmanaban, S.P. Saxena and Prakash Patil(2018). Technique for management of banana red rust thrips, *Chaetanophothrips signipennis* (Bagnall). *J. Ent. Zoo. Stud.*, 6(5): 1964-1967.
35. Bisane K.D. (2018). Bud borer complex and yield loss in sapota. *Indian J. Ent.*, 80(3): 942-947.
36. Bisane K.D., B.D. Shinde, S.P. Saxena and Prakash Patil. 2019. Management of sapota seed borer (*Trymalitis margarias* Meyrick) with some newer pesticides. *Pesticide Res.J.*, 31(1): 48-53.
37. Bisane K.D. 2019. Seasonal variability of chiku moth, *Nephoteryx eugraphella* (Ragonot) in relation to ecological parameters and crop phenology of sapota. *Pest Mgt. Hortl. Ecosys.*, 25(1): 37-43.
38. Bisane, K.D. and B.M. Naik. 2019. Consequences of ecological factors and crop phonological stages on seasonal incidence of bud borer, *Anarsia achrasella* Bradley on sapota. *J. Entomol. Res.*, 43 (3): 295-300.
39. Bisane, K.D. and B.M. Naik. 2019. Population Dynamics of Midrib Folder, *Banisia myrsusales eleoralis* (Walker) in sapota and its Rootstock, Khirnee. *Indian J. Eco.*, 46 (4):733-739.
40. Modi, P.K., P.D. Verma and S.M. Chavan 2019. Marketing Behaviour of Okra (*Abelmoschus esculentus* L.) Growers in Tapi District, *J Krishi Vigyan*,8(1): 212-216.
41. Modi, P.K., S. M. Chavan, S.N. Sarvaiyya and Kirti Bardhan 2019. Effect of IBA and its combinations with NAA on propagation of little gourd (*Coccinia grandis* L. Voigt) in plug trays. *Int. J. of Chemical Studies*, 7 (6): 1023-2127.
42. Patel, Parth K. and Bisane KD. 2020. Assessment of avoidable losses due to seed borer, *Trymalitis margarias* Meyrick in different varieties of sapota under high density plantation. *Pest Mgt. Hortl. Ecosys.*, 26(1): 29-34.
43. Patel P.K., K.D. Bisane and B.M. Naik. 2020. Estimation of fruit damage deviation due to seed borer, *Trymalitis margarias* Meyrick in different varieties and spacing of sapota. *J. Entomol. Res.*, 44(4): 505-510.
44. Bisane K.D. 2020. Screening sapota varieties against bud borer (*Anarsia achrasella* Bradley) under south Gujarat condition. *Indian J. Pl. Genet. Resour.* 33(3): 347-51.
45. Bisane, K. D. and B. M. Naik (2021). Impact and reliability of weather factors on occurrence of sapota seed borer, *Trymalitis margarias* Meyrick. *Internat. J. Tropical Insect Sci.*, January, 2021 (Online). DOI: 10.1007/s42690-020-00378-3.
46. Bisane, K. D. (2021). Varietal screening of sapota against chiku moth, *Nephoteryx eugraphella* (Ragonot) under South Gujarat condition. *J. Exptl. Zoo. India*, 24(2): 1819-1827.
47. Modi, P.K., S.M. Chavan and P.D. Verma 2021. Extent of Novel Organic Liquid Nutrients in Fruits and Vegetables crops. *Agril. Sci. Digest*, 41(1): 93-95.

48. Modi, P. K.; A. P. Patel; A. R. Patel; A. N. Patel; T. R. Ahir; K. D. Bisane and B. M. Naik (2021). Synergistic influence of bio-fertilizers, growth regulator and micronutrients on yield and economics of sapota cv. Kalipatti. *Internat. J. Pl. & Soil Sci.*, **33**(21): 107-116.
49. Solanki, K. R. and K. D. Bisane (2021). Sapota varietal performance under different spacing against bud borer, *Anarsia achrasella* Bradley and their management. *Pest Mngt. Hortl. Ecosys.*, **27**(1): 4-10.
50. Bisane, K. D. and B. M. Naik (2021). Evaluation of sapota varieties against seed borer, *Trymalitis margarias* Meyrick. *Indian J. Ento.*, **83**(4): 606-609.
51. Solanki, K. R.; Bisane, K. D. and Modi, P. K. (2022): Evaluation of varieties and spacing against chiku moth *Nephopteryx eugraphella* (Ragonot) in sapota and their eco-friendly management. *J. Eco-friendly Agri.*, **17**(2): 309-314.
52. Bagwan, I. R.; Patel, K. G.; Singh, S.; Ghetiya, L. V.; Bisane, K. D.; Saini, L. K.; Solanki, V. H., Gandhi, K. D.; Kansara, R. V. and Garde, Y. A. (2022). Dissipation kinetics, dietary risk assessment of indoxacarb residue in/on sapota using LC-MS/MS under South Gujarat condition. *The Pharma Innov. J.*, **11**(5): 1921-1926.
53. Bagwan, I. R.; Patel, K. G.; Ghetiya, L. V.; Singh, S.; Bisane, K. D.; Saini, L. K.; Solanki, V. H., Gandhi, K. D.; Kansara, R. V. and Garde, Y. A. (2022). Dissipation behaviour, health risk assessment of deltamethrin in/on sapota under South Gujarat condition. *The Pharma Innov. J.*, **11**(5): 1927-1928.
54. Bisane, K. D.; Naik, B. M.; Modi, P. K. and Patel, A. P. (2022): Evaluation of insecticide schedules against seed borer, *Trymalitis margarias* Meyrick in sapota. *Pesticide Res. J.*, **34**(2): 209-214.
55. Bisane, K. D.; Irulandi, S.; Patil, Prakash and Gutam, Sridhar (2023). Management schedule against seed borer, *Trymalitis margarias* (Lepidoptera: Tortricidae) in sapota. *J. Entomol. Res.*, **47**(4): 660-665.
56. Korat, Ravi V.; Bisane, K. D. And Modi, P. K. (2024). Evaluation of field susceptibility of banana germplasm against pseudostem weevil [*Odoiporus longicollis* (Oliver)]. *J. Exptl. Zoo., India*, **27**(1): 1027-1035.
57. Korat, Ravi V.; Bisane, K. D. and Modi, P. K. (2025). Eco-friendly management of pseudostem weevil, *Odoiporus longicollis* (Oliver) in banana. *J. Eco-friendly Agri.*, **20**(1): 175-181.
58. Kothuri, Sushma Laxmi; Bisane, K. D.; Siddhapara, M. R. and Patel, Aditi D. (2025). Morphometrics and Predation Performance of Green Lacewing, *Chrysoperla zastrowi sillemi* (Esben-Peterson) on Cowpea Aphid, *Aphis craccivora* Koch. *J. Biological control*, **39**(1): 32-38.
59. Sushma Laxmi Kothuri, K. D. Bisane, M. R. Siddhapara and Aditi D. Patel (2025). Residual toxicity of insecticides against *Chrysoperla zastrowi sillemi* (Esben-Petersen). *Pesticide Res. J.*, **37**(1): 91-95
60. Waghunde, R. R.; Bisane, K. D.; Mahatma, Lalit; Patil, G. B. and Pathak, D. M. (2025). Biological management of banana wilt. *J. Mycopathol. Research*. **63**(4): 847-852.
61. Jekishan K. Gadhavana, K. D. Bisane, Susheel Singh, L. K. Saini, V. H. Solanki and T. R. Ahlawat (2025). Persistence, dissipation and health risk assessment of spinosad and acephate in/on sapota fruits. *Acta Chromatographica*, **38**(1): 13-24
62. Bhamini Parekh, T.R. Ahlawat, A.P. Patel, A.R. Jalandra & P.V. limbachiya (2025). Comparative Biochemical Profiling of Fruits from Thirty Banana (*Mussa* spp.) Genotypes. *International J. Biochem. Res. Review*, **34**(4) : 325-331
63. Saloni Naik, A.P. Patel, & P. K. Modi (2025). Effect of age of scion and age of rootstock on saddle grafting in mango (*Mangifera indica* L.). *International J. Hort. Food Sci.*, **7**(8):160-163.

મુદદા નં ૨૧. બહાર પાડવામાં આવેલ વર્ષ વાર ભલામણોની વિગત :

ખેડૂત ઉપયોગી ભલામણો

બાગાયત		
ક્રેન		
૧.	૧૯૯૨	દક્ષિણ ગુજરાતના વધુ વરસાદવાળા વિસ્તારની માટીયાળ ગોરાડું જમીનમાં બસરાઈ કેળ ઉગાડનાર ખેડૂતોને પાયાના ખાતર તરીકે છોડ દીઠ પાંચ કીલો છાણિયું ખાતર અને ૮૦ ગ્રામ ફોસ્ફરસ રોપણી સમયે ખાડામાં આપવાની ભલામણ છે. આ ઉપરાંત છોડ દીઠ ૨૦૦ ગ્રામ પોટાશ પણ આપવું. ઉપરોક્ત પોટાશ અને ૨૦૦ ગ્રામ નાઈટ્રોજન ત્રણ સરખા હપ્તામાં રોપણી પછી ૮૦, ૧૨૦ અને ૧૫૦ દિવસે આપવા. આ માવજતથી ૬૩.૮૪ ટન ફળ પ્રતિ હેક્ટર મળે છે. તેમજ ફળની ગુણવત્તા સારી રહે છે. (ખર્ચ/આવક ૧:૨૨.૬૦)
૨.	૧૯૯૨	દક્ષિણ ગુજરાતના વધુ વરસાદવાળા વિસ્તારની માટીયાળ ગોરાડું જમીનમાં બસરાઈ કેળ ઉગાડનાર ખેડૂતોને કેળના પાકને છોડ દીઠ ૨૦૦ ગ્રામ નાઈટ્રોજન આપવાની ભલામણ છે. ઉપરોક્ત નાઈટ્રોજન અને ૨૦૦ ગ્રામ પોટાશ ત્રણ સરખા હપ્તામાં રોપણી પછી ૮૦, ૧૨૦ અને ૧૫૦ દિવસે આપવા. પાયાના ખાતર તરીકે છોડ દીઠ પાંચ કીલો છાણિયું ખાતર અને ૮૦ ગ્રામ ફોસ્ફરસ રોપણી સમયે ખાડામાં આપવા. આ માવજતથી સૌથી વધુ કેળાનું ઉત્પાદન ૬૨.૮૫ ટન પ્રતિ હેક્ટર મળે છે. (ખર્ચ/આવક ૧:૬.૮૧)
૩.	૧૯૯૪	દક્ષિણ ગુજરાતના ભારે વરસાદવાળા વિસ્તારની માટીયાળ ગોરાડું જમીનમાં હેક્ટરે વધુ ઉત્પાદન મેળવવા માટે કેળની બસરાઈ જાતની રોપણી ૧ × ૧.૨ × ૨ મીટરના અંતરે (જોડીયા પદ્ધતિથી) કરવી.
૪.	૧૯૯૭	દક્ષિણ ગુજરાતના ભારે વરસાદવાળા વિસ્તારની માટીયાળ ગોરાડું જમીનમાં કેળની બસરાઈ જાતનું હેક્ટર દીઠ વધુ ઉત્પાદન અને નફો મેળવવા માટે છોડ દીઠ ૨૦૦ ગ્રામ નાઈટ્રોજન પૈકી ૨૫% (૫૦ ગ્રામ) નાઈટ્રોજન છાણિયું ખાતરના રૂપમાં છોડના થડમાં ભલામણ મુજબ છોડ દીઠ ૫ કિ. ગ્રા. છાણિયું ખાતર અને ૮૦ ગ્રામ ફોસ્ફરસ પાયાના રોપણી વખતે આપવો. ૧૫૦ ગ્રામ નાઈટ્રોજન અને ૨૦૦ ગ્રામ પોટાશ ત્રણ સરખા હપ્તામાં ૮૦, ૧૨૦ અને ૧૫૦ દિવસે આપવા.
૫.	૧૯૯૭	દક્ષિણ ગુજરાતના ભારે વરસાદવાળા વિસ્તારની કેળની બસરાઈ જાતના પાકનું નફાકારક ઉત્પાદન મેળવવા રોપણી બાદ નવ માસ સુધી ખેતરને નિંદ્રણ મુક્ત રાખવું.
૬.	૨૦૦૦	દક્ષિણ ગુજરાતના ભારે વરસાદવાળા વિસ્તારની માટીયાળ ગોરાડું જમીનમાં કેળની બસરાઈ જાતની ખેતી કરતા ખેડૂતોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે ૮૫ક સિંચાઈ સાથે ૧૫૦ ગ્રામ નાઈટ્રોજન પ્રતિ છોડ રોપણી બાદ ત્રણ સરખા હપ્તામાં ૮૦, ૧૨૦ અને ૧૫૦ દિવસે આપવો. આમ કરવાથી વધુ ઉત્પાદન મળે છે અને ૨૫ ટકા નાઈટ્રોજનયુક્ત ખાતરનો બચાવ થાય છે.
૭.	૨૦૦૧	દક્ષિણ ગુજરાતના ભારે વરસાદવાળા વિસ્તારની કેળની બસરાઈ જાતનું વાવેતર જૂન મધ્યથી ૧૫ ઓગષ્ટ સુધી કરવામાં આવે તો તેના ઉત્પાદનમાં અસરકારક ઘટાડો થતો નથી.
૮.	૨૦૦૨	દક્ષિણ ગુજરાતના ભારે વરસાદવાળા વિસ્તારની કેળની બસરાઈ જાત ઉગાડનારા ખેડૂતોને વધુ તેમજ સારી ગુણવત્તા વાળા ફળનું ઉત્પાદન કરવા માટે કેળની લૂમ નીકળ્યા પછી ભૂરા રંગના પ્લાસ્ટીક (૨૦૦ ગેજ) થી નીચેનો છોડો ખુલ્લો રહે તેમ આવરણ કરવાથી કેળોને ઠંડીથી તેમજ ડાઘથી બચાવી વધુ ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે.
૯.	૨૦૦૨	દક્ષિણ ગુજરાતના વધુ વરસાદવાળા વિસ્તારમાં કેળની બસરાઈ જાત ઉગાડનારા ખેડૂતોને કેળના પાકને છોડ દીઠ ૧૫૦ ગ્રામ નાઈટ્રોજન ૮૫ક પદ્ધતિ દ્વારા યુરિયાના રૂપમાં રોપણી પછી ૮૦, ૧૨૦ અને ૧૫૦ દિવસે આપવાની ભલામણ છે. પાયાના ખાતર તરીકે ફોસ્ફરસ ૬૭.૫ ગ્રામ છોડ તથા ૧૫૦ ગ્રામ પોટાશ ત્રણ સરખા હપ્તામાં રોપણી પછી ૮૦, ૧૨૦ અને ૧૫૦ દિવસે જમીનમાં આપવાથી ૬૪.૪૭ ટન/હે ઉત્પાદન મળે છે. (ખર્ચ/આવક ૧:૧૩.૧૭)
૧૦.	૨૦૦૩	દક્ષિણ ગુજરાતના ભારે વરસાદવાળા વિસ્તારની માટીયાળ ગોરાડું જમીનમાં કેળની ખેતી કરતા ખેડૂતોને કેળની ગણદેવી સિલેક્શન જાતનું જોડિયા હાર પદ્ધતિમાં ૧.૨ × ૧.૫ × ૨.૪ મીટર અંતરે વાવેતર કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિમાં હેક્ટરે ૪૬૦૦ જેટલા છોડોનો સમાવેશ થતાં વધુ ઉત્પાદન મળે છે અને વધુ ચોખ્ખો નફો રહે છે.
૧૧.	૨૦૦૩	દક્ષિણ ગુજરાતના કેળની ખેતી કરતા ખેડૂતોને કેળની ગણદેવી સિલેક્શન જાતનું વાવેતર કરવાની ભલામણ છે.
૧૨.	૨૦૦૪	દક્ષિણ ગુજરાતના ભારે વરસાદવાળા વિસ્તારની માટીયાળ ગોરાડું જમીનમાં કેળની બસરાઈ જાતની જોડિયા હાર પદ્ધતિથી મહત્તમ છોડની સંખ્યા વાવેતર કરી ખેતી કરતા ખેડૂતોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે છોડ દીઠ ૧૫૦ ગ્રામ નાઈટ્રોજન અને પોટાશ અનુક્રમે યુરિયા અને મ્યુરેટ ઓફ પોટાશના રૂપમાં પાણીમાં ઓગાળી ૮૫ક પદ્ધતિ દ્વારા રોપણી પછીના ત્રણ માસ બાદ છ સરખા હપ્તામાં પંદર દિવસના અંતરે આપવો. આથી હેક્ટરે ૧૦૬.૦૧ ટન જેટલું કેળાનું ઉત્પાદન મળે છે. અને આવકનો ગુણોત્તર ૧:૨.૮૮ રહે છે. છોડ દીઠ ૮૦ ગ્રામ ફોસ્ફરસ રોપણી વખતે ખાડામાં આપવો જોઈએ.
૧૩.	૨૦૦૭	દક્ષિણ ગુજરાતના ભારે વરસાદવાળા વિસ્તારની ગોરાડું જમીનમાં કેળની ખેતી કરતા ખેડૂતોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે કેળની ગ્રાન્ડ નૈન જાતનું વાવેતર પેશી સંવર્ધન પદ્ધતિથી તૈયાર કરેલા રોપા દ્વારા ૧.૮ × ૧.૮ મીટરના અંતરે વાવણી

		કરવાથી હેકટરે વધુમાં વધુ ઉત્પાદન ૫૪.૪૭ ટન મળે છે. અને હેકટરે રૂ. ૧,૧૯,૦૨૦ ના ચોખ્ખા નફા સાથે આવક અને ખર્ચના ગુણોત્તર ૧:૨.૨૦ રહે છે.																																
૧૪.	૨૦૦૭	દક્ષિણ ગુજરાતના ભારે વરસાદવાળા વિસ્તારની ગોરાડુ જમીનમાં કેળની ખેતી કરતા ખેડૂતોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે કેળની ગ્રાન્ડ નૈન જાતનું વાવેતર જોડિયા હાર પદ્ધતિથી ૧.૦×૧.૨×૨.૦ મીટરના અંતરે વાવણી કરતા એક હેકટર વિસ્તારમાં ૬૨૫૦ જેટલા છોડના સમાવેશ થાય છે. જેમાં હેકટરે વધુમાં વધુ ૧૧૩.૬૬ ટન જેટલું ઉત્પાદન મળે છે.																																
૧૫.	૨૦૦૯	દક્ષિણ ગુજરાતના ભારે વરસાદવાળા વિસ્તાર-૧ ખેત આબોહવાકિય પરિસ્થિતિ-૩ ની ગોરાડુ જમીનમાં કેળની ગ્રાન્ડ નૈન જાતનું વાવેતર કરતા ખેડૂતોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે પ્રતિ છોડ ૫૦ ગ્રામ જૈવિક ખાતર એગ્રોસ્પીરીલમ ૨૦ દિવસ રોપણી બાદ સહિત ભલામણ કરેલ રાસાયણિક ખાતર (૧૦ કિ. ગ્રામ છાણીયું ખાતર + ૨૦૦ ગ્રામ નાઈટ્રોજન + ૯૦ ગ્રામ ફોસ્ફરસ + ૨૦૦ ગ્રામ પોટાશ) આપવાથી ૧૬.૮૬% વધુ ઉત્પાદન મળે છે.																																
૧૬.	૨૦૦૯	દક્ષિણ ગુજરાતના ભારે વરસાદવાળા વિસ્તાર-૧ ખેત આબોહવાકિય પરિસ્થિતિ-૩ ની ગોરાડુ જમીનમાં કેળની ગ્રાન્ડ નૈન જાતનું વાવેતર કરતા ખેડૂતોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે કેળની રોપણી ૧.૮× ૧.૮ મી અંતરે ચોમાસાના અંતમાં કરી આંતરપાક તરીકે ૪૫×૩૦ સે. મી. અંતરે કોબીજની ગોલ્ડન હેકર જાતનો પાક લેવાથી આર્થિક રીતે વધુ આવક મળે છે.																																
૧૭.	૨૦૧૧	દક્ષિણ ગુજરાતના વધુ વરસાદવાળા વિસ્તારમાં કેળની ગ્રાન્ડ નૈન જાતની ખેતી કરતા ખેડૂતોને વધારે ઉત્પાદન સહિત વધુ નફો મેળવવા માટે પાકના નીચે મુજબના જુદા જુદા વૃદ્ધિ વિકાસના તબક્કાઓ દરમિયાન ટપક પદ્ધતિ દ્વારા પિયત આપવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. <table><tr><th>વિકાસનો તબક્કો</th><th>બાષ્પીભવન ગુણાંક</th><th>માસ</th><th>ચલાવવો સમય (મિનિટમાં)</th></tr><tr><td>રોપણીથી પુષ્પકળી ભેદીકરણ</td><td>૦.૮</td><td>જુલાઈ-નવેમ્બર</td><td>૧૪૦-૧૫૦ (વરસાદવાળા દિવસો સિવાય)</td></tr><tr><td>પુષ્પકળી ભેદીકરણથી ફૂલદોડો નીકળવા સુધી</td><td>૦.૬</td><td>ડિસેમ્બર-એપ્રિલ</td><td>૧૪૦-૧૫૦</td></tr><tr><td>ફૂલદોડો નીકળ્યાથી છેલ્લો કાતરો ખુલ્લા થવા સુધી</td><td>૦.૭</td><td>મે</td><td>૧૮૦-૧૯૦</td></tr><tr><td>છેલ્લો કાતરો ખુલ્લાથી કાપણીના એક માસ પહેલા સુધી</td><td>૦.૮</td><td>જૂન</td><td>૨૩૫-૨૪૫ (વરસાદવાળા દિવસો સિવાય)</td></tr></table> <table><tr><th colspan="2">ટપક પદ્ધતિનું વિગતવાર વર્ણન</th></tr><tr><td>નળીઓ વચ્ચેનું અંતર</td><td>: ૧.૮ મીટર</td></tr><tr><td>ટપકણિયા વચ્ચેનું અંતર</td><td>: છોડના થડથી બંને બાજુએ ૩૦ સે. મી (બે ટપકણિયા)</td></tr><tr><td>ટપકણિયાનો નિષ્કાસ દર</td><td>: ૪ લીટર પ્રતિ કલાક</td></tr><tr><td>પદ્ધતિ ચલાવવા માટે દબાણ</td><td>: ૧.૨ કિલો પ્રતિ ચો. સે. મી</td></tr><tr><td>પદ્ધતિ ચલાવવાનું પુનરાવર્તન</td><td>: એકાંતરે દિવસે</td></tr></table>	વિકાસનો તબક્કો	બાષ્પીભવન ગુણાંક	માસ	ચલાવવો સમય (મિનિટમાં)	રોપણીથી પુષ્પકળી ભેદીકરણ	૦.૮	જુલાઈ-નવેમ્બર	૧૪૦-૧૫૦ (વરસાદવાળા દિવસો સિવાય)	પુષ્પકળી ભેદીકરણથી ફૂલદોડો નીકળવા સુધી	૦.૬	ડિસેમ્બર-એપ્રિલ	૧૪૦-૧૫૦	ફૂલદોડો નીકળ્યાથી છેલ્લો કાતરો ખુલ્લા થવા સુધી	૦.૭	મે	૧૮૦-૧૯૦	છેલ્લો કાતરો ખુલ્લાથી કાપણીના એક માસ પહેલા સુધી	૦.૮	જૂન	૨૩૫-૨૪૫ (વરસાદવાળા દિવસો સિવાય)	ટપક પદ્ધતિનું વિગતવાર વર્ણન		નળીઓ વચ્ચેનું અંતર	: ૧.૮ મીટર	ટપકણિયા વચ્ચેનું અંતર	: છોડના થડથી બંને બાજુએ ૩૦ સે. મી (બે ટપકણિયા)	ટપકણિયાનો નિષ્કાસ દર	: ૪ લીટર પ્રતિ કલાક	પદ્ધતિ ચલાવવા માટે દબાણ	: ૧.૨ કિલો પ્રતિ ચો. સે. મી	પદ્ધતિ ચલાવવાનું પુનરાવર્તન	: એકાંતરે દિવસે
વિકાસનો તબક્કો	બાષ્પીભવન ગુણાંક	માસ	ચલાવવો સમય (મિનિટમાં)																															
રોપણીથી પુષ્પકળી ભેદીકરણ	૦.૮	જુલાઈ-નવેમ્બર	૧૪૦-૧૫૦ (વરસાદવાળા દિવસો સિવાય)																															
પુષ્પકળી ભેદીકરણથી ફૂલદોડો નીકળવા સુધી	૦.૬	ડિસેમ્બર-એપ્રિલ	૧૪૦-૧૫૦																															
ફૂલદોડો નીકળ્યાથી છેલ્લો કાતરો ખુલ્લા થવા સુધી	૦.૭	મે	૧૮૦-૧૯૦																															
છેલ્લો કાતરો ખુલ્લાથી કાપણીના એક માસ પહેલા સુધી	૦.૮	જૂન	૨૩૫-૨૪૫ (વરસાદવાળા દિવસો સિવાય)																															
ટપક પદ્ધતિનું વિગતવાર વર્ણન																																		
નળીઓ વચ્ચેનું અંતર	: ૧.૮ મીટર																																	
ટપકણિયા વચ્ચેનું અંતર	: છોડના થડથી બંને બાજુએ ૩૦ સે. મી (બે ટપકણિયા)																																	
ટપકણિયાનો નિષ્કાસ દર	: ૪ લીટર પ્રતિ કલાક																																	
પદ્ધતિ ચલાવવા માટે દબાણ	: ૧.૨ કિલો પ્રતિ ચો. સે. મી																																	
પદ્ધતિ ચલાવવાનું પુનરાવર્તન	: એકાંતરે દિવસે																																	
૧૮.	૨૦૧૧	દક્ષિણ ગુજરાતના વધુ વરસાદવાળા વિસ્તારમાં કેળની ગ્રાન્ડ નૈન જાતની ખેતી કરતા ખેડૂતોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે, કેળાનું વધુ ઉત્પાદન સહિત વધારે નફો મેળવવા માટે ટપક પદ્ધતિ ૦.૭૦ બાષ્પીભવન ગુણાંકે ચલાવી સાથે ભલામણ કરેલ નાઈટ્રોજન ૭૫ ટકા અને ફોસ્ફરસ તેમજ પોટાશ ૧૦૦ ટકા મુજબ રસાયણિક ખાતર આપવું. <table><tr><th colspan="2">ટપક પદ્ધતિનું વિગતવાર વર્ણન</th></tr><tr><td>નળીઓ વચ્ચેનું અંતર</td><td>: ૧.૮ મીટર</td></tr><tr><td>ટપકણિયા વચ્ચેનું અંતર</td><td>: છોડના થડથી બંને બાજુએ ૩૦ સે. મી (બે ટપકણિયા)</td></tr><tr><td>ટપકણિયાનો નિષ્કાસ દર</td><td>: ૪ લીટર પ્રતિ કલાક</td></tr><tr><td>પદ્ધતિ ચલાવવા માટે દબાણ</td><td>: ૧.૨ કિલોગ્રામ પ્રતિ ચો. સે.મી.</td></tr><tr><td>પદ્ધતિ ચલાવવાનો સમય</td><td>: શિયાળામાં ૧૨૦ - ૧૩૦ મિનિટ અને ઉનાળામાં ૧૭૦-૧૮૦ મિનિટ</td></tr><tr><td>પદ્ધતિ ચલાવવાનું પુનરાવર્તન</td><td>: એકાંતરે દિવસે</td></tr></table>	ટપક પદ્ધતિનું વિગતવાર વર્ણન		નળીઓ વચ્ચેનું અંતર	: ૧.૮ મીટર	ટપકણિયા વચ્ચેનું અંતર	: છોડના થડથી બંને બાજુએ ૩૦ સે. મી (બે ટપકણિયા)	ટપકણિયાનો નિષ્કાસ દર	: ૪ લીટર પ્રતિ કલાક	પદ્ધતિ ચલાવવા માટે દબાણ	: ૧.૨ કિલોગ્રામ પ્રતિ ચો. સે.મી.	પદ્ધતિ ચલાવવાનો સમય	: શિયાળામાં ૧૨૦ - ૧૩૦ મિનિટ અને ઉનાળામાં ૧૭૦-૧૮૦ મિનિટ	પદ્ધતિ ચલાવવાનું પુનરાવર્તન	: એકાંતરે દિવસે																		
ટપક પદ્ધતિનું વિગતવાર વર્ણન																																		
નળીઓ વચ્ચેનું અંતર	: ૧.૮ મીટર																																	
ટપકણિયા વચ્ચેનું અંતર	: છોડના થડથી બંને બાજુએ ૩૦ સે. મી (બે ટપકણિયા)																																	
ટપકણિયાનો નિષ્કાસ દર	: ૪ લીટર પ્રતિ કલાક																																	
પદ્ધતિ ચલાવવા માટે દબાણ	: ૧.૨ કિલોગ્રામ પ્રતિ ચો. સે.મી.																																	
પદ્ધતિ ચલાવવાનો સમય	: શિયાળામાં ૧૨૦ - ૧૩૦ મિનિટ અને ઉનાળામાં ૧૭૦-૧૮૦ મિનિટ																																	
પદ્ધતિ ચલાવવાનું પુનરાવર્તન	: એકાંતરે દિવસે																																	
૧૯.	૨૦૧૩	દક્ષિણ ગુજરાતના ભારે વરસાદવાળા વિસ્તારની માટિયાળ ગોરાડુ જમીન અને સમાન આબોહવાકીય પરિસ્થિતિમાં કેળની ગ્રાન્ડ નૈન જાતની ખેતી કરતા ખેડૂતોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે ભલામણ કરેલ રાસાયણિક ખાતર નાઈટ્રોજન અને પોટાશના ૮૦ ટકા એટલે કે ૨૪૦ ગ્રામ ના. અને ૧૬૦ ગ્રામ પો./છોડ જેમાંથી પ્રથમ હપ્તે ૯૬ ગ્રામ ના. અને ૪૦ ગ્રામ પો. ત્રીજા માસે , બીજા હપ્તે ૭૨ ગ્રામ ના. અને ૫૬ ગ્રામ પો. પાંચમા માસે, ત્રીજા હપ્તે ૭૨ ગ્રામ ના. - ૪૦ ગ્રામ પો. સાતમા માસે અને ચોથા હપ્તે ૦ ગ્રામ ના. - ૨૪ ગ્રામ પો. નવમા માસે આપવો. છાણિયું ખાતર ૧૦ કિલોગ્રામ અને ફોસ્ફરસનો સંપૂર્ણ જથ્થો ૯૦ ગ્રામ પ્રતિ છોડ મુજબ રોપણી સમયે આપવો. આમ કરવાથી વધુ ઉત્પાદન મળવા સહિત નફો અને ખર્ચનો ગુણોત્તર ૪.૯૭ રહે છે.																																

૨૦.	૨૦૧૫	દક્ષિણ ગુજરાતના ભારે વરસાદવાળા વિસ્તારમાં કેળની ગ્રાન્ડ નૈન જાતની ખેતી કરતા ખેડૂતોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે કેળની રોપણી ખામણા દીઠ ત્રણ(૩) છોડ ૨×૩ મીટર (૭×૧૦ ફુટ) ના અંતરે કરવાથી અને સાથે ભલામણ કરેલ રાસાયણિક ખાતરના ૭૫ ટકા ખાતર એટલે કે ૨૨૫.૬૭.૫.૧૫૦ ગ્રામ ના.ફો.પો. આપવાથી વધુ ઉત્પાદન સહિત વધુ નફો મળે છે. છોડ દીઠ છાણિયું ખાતર ૧૦ કિ. ગ્રા. અને ૬૭.૫ ગ્રામ ફોસ્ફરસ રોપતી વખતે ખાડામાં આપવો જ્યારે છોડ દીઠ ૨૨૫ ગ્રામ નાઈટ્રોજન અને ૧૫૦ ગ્રામ પોટાશ રોપણી બાદ ૮૦.૧૨૦ અને ૧૫૦ દિવસે ત્રણ સરખા હપ્તામાં આપવો.																											
૨૧.	૨૦૧૫	દક્ષિણ ગુજરાતના ભારે વરસાદવાળા વિસ્તારમાં ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિથી કેળની ગ્રાન્ડ નૈન જાતની ખેતી કરતા ખેડૂતોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે, કેળ પાકમાં ભલામણ કરેલ રાસાયણિક ખાતર નાઈટ્રોજન અને પોટાશના ૭૫ ટકા એટલે કે ૨૨૫ ગ્રામ નાઈટ્રોજન અને ૧૫૦ ગ્રામ પોટાશ પ્રતિ છોડ ટપક પદ્ધતિ સાથે નીચે મુજબના તબક્કા દરમ્યાન ૧૫ દિવસના આંતરે ટપક પદ્ધતિ સાથે આપવાથી આવક અને ગુણોત્તર વધુ રહેવા સહિત ૨૫ ટકા નાઈટ્રોજન અને પોટાશ યુક્ત ખાતરનો બચાવ અને ૨૨ ટકા પાણીનો પણ બચાવ થાય છે. <table><tr><th rowspan="2">અ.નં.</th><th rowspan="2">વૃદ્ધિ વિકાસના તબક્કા</th><th colspan="2">નાઈટ્રોજન અને પોટાશ ગ્રામ પ્રતિ છોડ</th><th rowspan="2">હપ્તા</th></tr><tr><th>નાઈટ્રોજન</th><th>પોટાશ</th></tr><tr><td>૧</td><td>૩.૪ માસ</td><td>૬૭.૫</td><td>૩૦</td><td>૪</td></tr><tr><td>૨</td><td>૫.૬ માસ</td><td>૧૧૨.૫</td><td>૬૦</td><td>૪</td></tr><tr><td>૩</td><td>૭ માસથી લુમનો ડોડો નીકળે ત્યાં સુધી</td><td>૪૫</td><td>૪૮</td><td>૨</td></tr><tr><td>૪</td><td>લુમ નીકળ્યા બાદ</td><td>૦૦</td><td>૧૨</td><td>૧</td></tr></table> છોડ દીઠ છાણિયું ખાતર ૧૦ કિ. ગ્રા અને ૮૦ ગ્રામ ફોસ્ફરસ રોપતી વખતે ખાડામાં આપવો. ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિમાં કલાકે ૪ લીટરની ક્ષમતાવાળા બે ડ્રીપર છોડના થડની બંને બાજુ ૩૦ સે. મી. દુર મુકી પદ્ધતિ શિયાળામાં ૮૦ મિનિટ અને ઉનાળામાં ૧૫૦ મિનિટ સુધી દરરોજ ચલાવવી.	અ.નં.	વૃદ્ધિ વિકાસના તબક્કા	નાઈટ્રોજન અને પોટાશ ગ્રામ પ્રતિ છોડ		હપ્તા	નાઈટ્રોજન	પોટાશ	૧	૩.૪ માસ	૬૭.૫	૩૦	૪	૨	૫.૬ માસ	૧૧૨.૫	૬૦	૪	૩	૭ માસથી લુમનો ડોડો નીકળે ત્યાં સુધી	૪૫	૪૮	૨	૪	લુમ નીકળ્યા બાદ	૦૦	૧૨	૧
અ.નં.	વૃદ્ધિ વિકાસના તબક્કા	નાઈટ્રોજન અને પોટાશ ગ્રામ પ્રતિ છોડ			હપ્તા																								
		નાઈટ્રોજન	પોટાશ																										
૧	૩.૪ માસ	૬૭.૫	૩૦	૪																									
૨	૫.૬ માસ	૧૧૨.૫	૬૦	૪																									
૩	૭ માસથી લુમનો ડોડો નીકળે ત્યાં સુધી	૪૫	૪૮	૨																									
૪	લુમ નીકળ્યા બાદ	૦૦	૧૨	૧																									
૨૨.	૨૦૧૬	દક્ષિણ ગુજરાતના ભારે વરસાદવાળા વિસ્તાર ઝોન-૧ અને ખેત આબોહવાકીય પરિસ્થિતિ-૩ માં કેળની ગ્રાન્ડ નૈન જાતની સેન્ડિય ખેતી કરતા ખેડૂતોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે છોડ દીઠ રોપણી વખતે ૧૦ કિ. ગ્રા. છાણિયું ખાતર અને ૧.૨૫ કિ. ગ્રા. લિંબોળી ખોળ આપવો. એક માસ બાદ જૈવિક ખાતર છોડ દીઠ ૫૦ મીલી દરેક એઝોસ્પીરીલમ અને પીએસબી, ૫૦ ગ્રામ ટ્રાયકોડર્મા હારઝીનીયમ અને ૨૫ ગ્રામ વામ આપવું. ત્યારબાદ ત્રીજા માસે છોડ દીઠ ૫ કિ. ગ્રા. વર્મીકમ્પોસ્ટ અને પાંચમા માસે છોડ દીઠ ૧.૭૫ કિ. ગ્રા. લાકડાની રાખ આપવી. આ માવજતથી વધુ ઉત્પાદન સહિત વધુ નફો મળે છે.																											
૨૩.	૨૦૧૬	કેળની ખેતી કરતા ખેડૂતો અને નર્સરીધારકોને કેળની રોપણી માટે ઓછા ખર્ચે ગુણવત્તા સભર રોપા તૈયાર કરવા માટે મેક્રોપ્રોપોગેશન પદ્ધતિ અપનાવવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિથી રોપણી સામગ્રી પાછળ થતો ખર્ચ ઘટાડી શકાય છે. આ પદ્ધતિમાં પ્રતિ ગાંઠ વામ અને ટ્રાયકોડર્મા વિરીડી બંને ૩૦ ગ્રામ મુજબ આપવાથી પાંચથી છ માસમાં એક ગાંઠમાંથી વધુમાં વધુ ૨૦(વીસ) જેટલા રોપવા લાયક છોડ મળી શકે છે. રોપ તૈયાર કરવાની પદ્ધતિ - સારી ગુણવત્તાવાળી ૫૦૦ થી ૧૦૦૦ ગ્રામ વજનની ગાંઠો પસંદ કરવી. - ગાંઠનો ઉપરનો ભાગ થડની શરૂઆત થાય ત્યાંથી કાપી નાંખવો. - ગાંઠની વચ્ચેથી ૪ સે. મી. ઉંડાઈ અને ૨ સે. મી. પહોળાઈ જેટલો ભાગ ખોતરીને મુખ્ય આંખ દુર કરવી. - ગાંઠના ઉપરના ભાગે છ કે આઠ ભાગ થાય તે પ્રમાણે આડા કાપા મુકવા. - આ રીતે તૈયાર થયેલ ગાંઠોને નેટ હાઉસમાં ૧×૧ ફુટના અંતરે ગોઠવી લાકડાના વ્હેરથી ઢાંકી દેવી. - ગાંઠ દીઠ વામ અને ટ્રાયકોડર્મા વિરીડી બંને ૩૦ ગ્રામ મુજબ ગાંઠની ફરતે આપવું. - ગાંઠમાંથી નીકળતી પ્રાથમિક અને દ્વિતીય કળીઓને ખોતરીને દુર કરવી. - ત્યારબાદ નીકળતી તૃતીય કળીઓનો વિકાસ થવા દેવો અને જ્યારે ચાર થી પાંચ પાન ધારણ કરે ત્યારે છોડને છૂટા પાડી માટી, રેતી અને છાણિયા ખાતરના સમ પ્રમાણમાં તૈયાર કરેલ ઉછેર માધ્યમને પ્લાસ્ટીક બેગમાં ભરી તેમાં રોપવા. - તૈયાર થયેલ રોપાને સખ્તાઈ માટે નેટહાઉસમાં રાખવા. - સમગ્ર પદ્ધતિ દરમ્યાન જરૂરિયાત મુજબ ઝારાથી નિયમિત પિયત આપવું.																											
૨૪.	૨૦૧૮	દક્ષિણ ગુજરાતના ભારે વરસાદવાળા વિસ્તાર ઝોન-૧ અને ખેત આબોહવાકીય પરિસ્થિતિ-૩ માં ટપક સિંચાઈ દ્વારા કેળની ગ્રાન્ડ નૈન જાતની ખેતી કરતા ખેડૂતોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે જમીન પ્રુથ્થકરણ આધારિત રાસાયણિક ખાતરની ભલામણ નીચેના કોથામાં અને મોડયુલમાં દર્શાવ્યા મુજબ કરવાથી લક્ષ્યાંક મુજબનું કેળાનું ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે. - કેળની રોપણીના ખાડા દીઠ ૧૦ કિ.ગ્રા. છાણિયું ખાતર આપવું. - ટપક સિંચાઈ (પુનઃ પ્રાપ્ય બાષ્પીભવનના ૮૦% બધા તબક્કે) પદ્ધતિમાં કલાકે ૪ લિટરની ક્ષમતાવાળી બે ડ્રીપર																											

		છોડના થડના બંને બાજુ ૩૦ સે.મી. દુર મુકી શિયાળામાં ૮૦ મીનીટ અને ઉનાળામાં ૧૩૦ મીનીટ સુધી એકાંતરે દિવસે ટપક ચલાવવી. ■ ૧૦૦ માઈક્રોન જાડાઈવાળું કાળા પ્લાસ્ટીકનું ૫૦% વિસ્તારનું આવરણ કરવું. ■ ૨% બનાના શક્તી સુક્ષ્મ પોષક તત્વોના છંટકાવ રોપની પછી ૩, ૪ અને ૫ માં મહિને પાન પર કરવો (એન.આર.સી.બી. આતે વિકસીત). ■ લૂમપર ૨% સલ્ફેટ ઓફ પોટાશનો છંટકાવ (પ્રથમ છંટકાવ ફુલનો ડોડો (નર ફુલ) તોડ્યા બાદ અને બીજો છંટકાવ પ્રથમ છંટકાવના ૩૦ દિવસ પછી કરવો. ■ રોપની પછી ત્રીજા, ચોથા અને પાંચમા મહિને ફર્ટિગેશન દ્વારા નાયટ્રોજન (યુરીયા) અને મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ ખાતરના ત્રણ સરખા ભાગમાં આપવું અને ફોસ્ફરસ (સીંગલ સુપર ફોસ્ફેટ) ખાતર રોપણીના ૧ મહિના પછી જમીનમાં આપવું.
૨૫.	૨૦૨૧	ગુજરાતમાં કેળાની ખેતી કરતા ખેડૂતોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે કેળાના મેકોપ્રોપેગેશન પદ્ધતિથી ઉછેરેલા રોપાની રોપણી કરવાથી કેળના પીલા કરતાં લૂમ વહેલી તૈયાર થાય છે તેમજ વધારે ઉત્પાદન અને ચોખ્ખો નફો મેળવી શકાય છે.
૨૬.	૨૦૨૩	દક્ષિણ ગુજરાતનાં ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારમાં કેળાની ખેતી કરતા ખેડૂતોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે કેળાના છોડમાં પુષ્પ બંધાવવાની શરૂઆત (રોપણીના ૫ મહિના પછીના) ના સમયે એક મહિના સુધી પાણીની અછત (ખેંચ) ઉદભવવાની પરિસ્થિતિને નિવારવા માટે એસીટાઈલ સેલિસીલિક એસિડ (૧૮ મી.ગ્રામ/લીટર) નો છંટકાવકરવાથી કેળાના છોડને પાણીની અછત (ખેંચ) ની ઓછી અસર થવાથી સંતોષકારક વિકાસ, ઉત્પાદન અને વધુ ચોખ્ખો નફો મેળવી શકાય છે.
૨૭.	૨૦૨૬	ગુજરાતમાં ગ્રાન્ડ નૈન કેળની ખેતી કરતાં ખેડૂતોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે ૭.૫ કિલો છાણિયું ખાતર સાથે પ્રતિ છોડ ૨૨૫ ગ્રામ નાઈટ્રોજન, ૬૭.૫ ગ્રામ ફોસ્ફરસ અને ૧૫૦ ગ્રામ પોટાશ જમીનમાં આપવું (ભલામણના ૭૫%) અને ૨% નોવેલ ઓર્ગેનિક લિક્વિડ ન્યુટ્રીયન્ટસનાં ત્રણ છંટકાવ (છોડ પર રોપણીના ત્રીજા અને પાંચમાં મહિના પછી અને લૂમ ઉપર ડોડો તોડ્યા બાદ) કરવાથી વધુ ઉત્પાદન અને વણતરસાથે ૨૫% ખાતરની બચત થાય છે.
	ચીકુ	
૨૮.	૧૯૮૯	દક્ષિણ ગુજરાતના ભારે વરસાદવાળા વિસ્તારમાં ચીકુ કાલીપત્તીના પુખ્તવયના ઝાડમાં ખાતરનો કાર્યક્ષમ વપરાશ થાય તે માટે થડથી ૨.૦ મીટરના અંતરે નીક ખોદી ભલામણ પ્રમાણે ખાતર જમીનમાં મિશ્ર કરી આપવું.
૨૯.	૧૯૯૩	દક્ષિણ ગુજરાતના ભારે વરસાદવાળા વિસ્તારમાં શરૂઆતના નવ વર્ષ સુધી એકમ વિસ્તારમાંથી ચીકુ ફળનું વધુ ઉત્પાદન મેળવવા ચીકુ કાલીપત્તી જાતની કલમોની રોપણી ૫ x ૫ મીટરના અંતરે કરવી.
૩૦.	૧૯૯૩	ગુજરાત રાજ્યમાં રાયણ બીજોનો વધુમાં વધુ ઉગાવો મેળવવા માટે એક માસ જૂના રાયણ બીજોને વાવતાં પહેલા છાણની ૨બડીમાં ૨૪ કલાક અથવા ૧ % (૧ લીટર પાણીમાં ૧૦ ગ્રામ થાયયુરિયા) થાયયુરિયાના દ્રાવણમાં ૬ કલાક બોળી રાખવા ત્યારબાદ ચોખ્ખા પાણીથી ઘોઈ છાંયડામાં સુકવી વાવણી કરવી.
૩૧.	૧૯૯૭	દક્ષિણ ગુજરાતના ભારે વરસાદવાળા વિસ્તારમાં રોપણી બાદ તેર વર્ષ સુધી ચીકુ કાલીપત્તી જાતના ફળનું એકમ વિસ્તારમાં વધુ ઉત્પાદન મેળવવા માટે ચીકુ કલમની રોપણી ૫ x ૫ મીટરના અંતરે કરવી.
૩૨.	૨૦૧૩	દક્ષિણ ગુજરાતના ભારે વરસાદવાળા વિસ્તારની માટિયાળ ગોરાડુ જમીનમાં ચીકુની કાલીપત્તી જાતની વાડી ધરાવતા ખેડૂતોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે ચીકુના પુખ્ત વયના ઝાડો માટે પ્રતિ વર્ષ ભલામણ કરેલ રાસાયણિક ખાતર એટલે કે ૧૦૦૦-૫૦૦-૫૦૦ ગ્રામ ના.ફો.પો./ઝાડ/વર્ષ હાલની ભલામણ મુજબ બે સરખા હપ્તામાં જૂન અને ઓક્ટોબરમાં આપવાને બદલે નાઈટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટાશ ત્રણ હપ્તામાં એટલે કે ૨૫૦-૫૦૦-૧૨૫ ગ્રામ ના.ફો.પો./ઝાડ જૂન માસમાં, ૫૦૦-૦૦-૨૫૦ ગ્રામ ના.ફો.પો./ઝાડ ઓગસ્ટ માસમાં અને ૨૫૦-૦૦-૧૨૫ ગ્રામ ના.ફો.પો./ઝાડ ઓક્ટોબર માસમાં આપવું. છાણિયું ખાતર છોડ દીઠ ૧૦૦ કિલોગ્રામ પ્રમાણે જૂન માસમાં આપવું. આમ કરવાથી વધુ ઉત્પાદન નફો અને મળે છે.
૩૩.	૨૦૧૮	દક્ષિણ ગુજરાતના ભારે વરસાદવાળા વિસ્તારની ચીકુની ખેતી કરતા ખેડૂતોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે ચીકુની કાલીપત્તી જાતના પુખ્ત વયના ઝાડોવાડી ધરાવતા ખેડૂતોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે ચીકુના ઝાડને રાસાયણિક ખાતર હાલની ભલામણ મુજબ ૧૦૦૦-૫૦૦-૫૦૦ ગ્રામ ના.ફો.પો. પ્રતી ઝાડ બે સરખા હપ્તામાં જૂન અને ઓક્ટોબર માસમાં આપવાને બદલે ત્રણ હપ્તામાં ૨૫ ટકા (૨૫૦-૧૨૫-૧૨૫ ગ્રામ ના.ફો.પો./ઝાડ) સાથે ૧૦૦ કિ.લો.પ્રતી ઝાડ દીઠ છાણિયું ખાતર જૂન માસમાં, ફરીથી ૨૫ ટકા (૨૫૦-૧૨૫-૧૨૫ ગ્રામ ના.ફો.પો./ઝાડ) ઓક્ટોબર માસમાં અને ૫૦ ટકા (૫૦૦-૨૫૦-૨૫૦ ગ્રામ ના.ફો.પો./ઝાડ) ફેબ્રુઆરી માસમાં મુજબ આપવાથી શિયાળાની ઋતુમાં ઉનાળાની ઋતુની સરખામણીમાં વધુ ઉત્પાદન સહીત વધ નફો મળે છે.
૩૪.	૨૦૧૮	દક્ષિણ ગુજરાતના ભારે વરસાદવાળા વિસ્તારમાં ચીકુની ૩૦ વર્ષથી વધુ ઉંમરના કાલીપત્તી જાતના વાડી ધરાવતા ખેડૂતોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે ઝાડના ટોચના ૧ મીટર ભાગને એક વખત ડિસેબર મહિના દરમિયાન કાપીને દૂર કરવામાં આવે તો ક્રમશઃ ઉત્પાદન અને ચોખ્ખી આવકમાં વધારો થાય છે.
૩૫.	૨૦૨૦	દક્ષિણ ગુજરાતના ભારે વરસાદ વાળા વિસ્તાર ઝોન-૧ અને ખેત આબોહવાકીય પરિસ્થિતિ ત્રણમાં ચીકુની કાલીપત્તી

		જાતની વાડી ધરાવતા ખેડૂતોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે ચીકુના પુખ્તવયના ઝાડને ઝાડ દીઠ ૭૫ કિલો છાણિયું ખાતર અને ૭૫૦ ગ્રામ નાઈટ્રોજન, ૩૭૫ ગ્રામ ફોસ્ફોરસ અને ૩૭૫ ગ્રામ પોટાશ જુન અને ઓક્ટોબર માસમાં (બે સરખા હપ્તામાં), જૈવિક ખાતર એજોસ્પાઈરિલમ અને પી.એસ.બી. ૪૦ મિ.લી./ઝાડ આપવું, જુલાઈ માસમાં, જીબ્રેલિક એસિડ ૫૦ પીપીએમનો છંટકાવ નવેમ્બર માસમાં અને ગ્રેડ-૪ સૂક્ષ્મ પોષકતત્વોનું ૦.૫ ટકા નો છંટકાવ ડીસેમ્બર માસમાં કરવાથી ચીકુના ઉત્પાદન અને આવકમાં વધારો થાય છે.																																			
૩૬.	૨૦૨૧	દક્ષિણ ગુજરાતમાં ચીકુની કાલીપત્તી જાતના પુખ્તવયના ઝાડ ધરાવતા ખેડૂતોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે રાસાયણિક ખાતરની ભલામણના ૮૦ ટકા (૮૦૦:૪૦૦:૪૦૦ ગ્રામ એન.પી.કે. પ્રવત ઝાડ) ચાર હપ્તામાં જુલાઈ, સપ્ટેમ્બર, નવેમ્બર અને ફેબ્રુઆરી માસમાંનીચેની ટેબલ મુજબ અને ૧૫ કિલો વર્મી કાંપોસ્ટ સાથે જૈવિક ખાતર એજોટોબેક્ટર અને પી.એસ.બી. ૧૦૦ મિ.લી./ઝાડ જુલાઈ માસમાં અને ગ્રેડ-૪ મલ્ટીસૂક્ષ્મપોષક તત્વોનો ૦.૫ ટકાનો છંટકાવ ઓક્ટોબર માસમાં કરવાથી શિયાળુ ઋતુમાં ઉત્પાદન અને આવકમાં વધારો થાય છે. <table><tr><th colspan="5">રાસાયણિક ખાતરની ભલામણનો ૮૦% જથ્થો</th></tr><tr><th>ખાતર આપવાનો સમય અને અવસ્થા</th><th>નવી કુપણ નિકળે ત્યારે (જુલાઈ)</th><th>ફળ બેસે ત્યારે (સપ્ટેમ્બર)</th><th>ફળનો વિકાસ થાય ત્યારે (નવેમ્બર)</th><th>નવા ફૂલ આવે અને ફળનો વિકાસ થાય ત્યારે (ફેબ્રુઆરી)</th></tr><tr><td>એન.પી.કે.</td><td>૩૨-૪૦-૨૦ %</td><td>૧૬-૦૦-૨૦ %</td><td>૧૬-૪૦-૨૦ %</td><td>૧૬-૦૦-૨૦ %</td></tr><tr><td>એન.પી.કે. (ગ્રામ/ઝાડ)</td><td>૩૨૦-૨૦૦-૧૦૦</td><td>૧૬૦-૦૦-૧૦૦</td><td>૧૬૦-૨૦૦-૧૦૦</td><td>૧૬૦-૦૦-૧૦૦</td></tr><tr><td>યુરીયા (ગ્રામ/ઝાડ)</td><td>૭૦૦</td><td>૩૫૦</td><td>૩૫૦</td><td>૩૫૦</td></tr><tr><td>સિંગલ સુપરફોસ્ફેટ (ગ્રામ/ઝાડ)</td><td>૧૨૫૦</td><td>૦૦</td><td>૧૨૫૦</td><td>૦૦</td></tr><tr><td>મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ (ગ્રામ/ઝાડ)</td><td>૧૭૦</td><td>૧૭૦</td><td>૧૭૦</td><td>૧૭૦</td></tr></table>	રાસાયણિક ખાતરની ભલામણનો ૮૦% જથ્થો					ખાતર આપવાનો સમય અને અવસ્થા	નવી કુપણ નિકળે ત્યારે (જુલાઈ)	ફળ બેસે ત્યારે (સપ્ટેમ્બર)	ફળનો વિકાસ થાય ત્યારે (નવેમ્બર)	નવા ફૂલ આવે અને ફળનો વિકાસ થાય ત્યારે (ફેબ્રુઆરી)	એન.પી.કે.	૩૨-૪૦-૨૦ %	૧૬-૦૦-૨૦ %	૧૬-૪૦-૨૦ %	૧૬-૦૦-૨૦ %	એન.પી.કે. (ગ્રામ/ઝાડ)	૩૨૦-૨૦૦-૧૦૦	૧૬૦-૦૦-૧૦૦	૧૬૦-૨૦૦-૧૦૦	૧૬૦-૦૦-૧૦૦	યુરીયા (ગ્રામ/ઝાડ)	૭૦૦	૩૫૦	૩૫૦	૩૫૦	સિંગલ સુપરફોસ્ફેટ (ગ્રામ/ઝાડ)	૧૨૫૦	૦૦	૧૨૫૦	૦૦	મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ (ગ્રામ/ઝાડ)	૧૭૦	૧૭૦	૧૭૦	૧૭૦
રાસાયણિક ખાતરની ભલામણનો ૮૦% જથ્થો																																					
ખાતર આપવાનો સમય અને અવસ્થા	નવી કુપણ નિકળે ત્યારે (જુલાઈ)	ફળ બેસે ત્યારે (સપ્ટેમ્બર)	ફળનો વિકાસ થાય ત્યારે (નવેમ્બર)	નવા ફૂલ આવે અને ફળનો વિકાસ થાય ત્યારે (ફેબ્રુઆરી)																																	
એન.પી.કે.	૩૨-૪૦-૨૦ %	૧૬-૦૦-૨૦ %	૧૬-૪૦-૨૦ %	૧૬-૦૦-૨૦ %																																	
એન.પી.કે. (ગ્રામ/ઝાડ)	૩૨૦-૨૦૦-૧૦૦	૧૬૦-૦૦-૧૦૦	૧૬૦-૨૦૦-૧૦૦	૧૬૦-૦૦-૧૦૦																																	
યુરીયા (ગ્રામ/ઝાડ)	૭૦૦	૩૫૦	૩૫૦	૩૫૦																																	
સિંગલ સુપરફોસ્ફેટ (ગ્રામ/ઝાડ)	૧૨૫૦	૦૦	૧૨૫૦	૦૦																																	
મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ (ગ્રામ/ઝાડ)	૧૭૦	૧૭૦	૧૭૦	૧૭૦																																	
૩૭.	૨૦૨૫	ગુજરાતના ચીકુની ખેતી કરતા ખેડૂતોને ગુજરાત ચીકુ ૧ (ગણદેવી મુરબ્બા) જાતનું વાવેતર કરવા ભલામણ કરવામાં આવે છે. ગુજરાતમાં આ જાતનું સરેરાશ ફળ ઉત્પાદન ૧૩.૦૦ ટન/હે જોવા મળેલ છે જે અંકુશ જાત કરતાં ૧૦.૧૭ ટકા વધુ છે. ચીકુની ફેલાતી આ જાતમાં ફળોની સાંખ્યા (૧૭૮૩) અને ફળનું વજન (૭૫.૩૪ ગ્રામ) વધારે જોવા મળેલ છે. ફળો ગોળ, મધ્યમ થી વધુ કદના, કથ્થઈ રાંગના અને કીમ કલરનો સુવાળો માવો ધરાવે છે. આ જાતના ફળોમાં અંકુશ જાત કરતા વધુ સંગ્રહશક્તિ (૬.૫૦ દિવસ), કુલ ઘનદ્રવ્ય (૨૨.૨૦ પ્રિક્સ), કુલ શર્કરા (૧૮.૧૦%), નોન રિડ્યુસિંગ શર્કરા (૧૨.૮૮%), કૂડ પ્રોટીન (૦.૪૮%), કુલ કાર્બોહાયડ્રેટ (૨૨.૫૦%) અને કેલ્સીયમ (૩૦.૭૫ મીલી/૧૦૦ ગ્રામ) છે. જ્યારે રેસા (૩.૫૭%), અમ્લતા (૦.૧૬૮%) અને ફિનોલ (૦.૮૧%) અંકુશ જાત સાથે તુલનાત્મક છે. આ જાતમાં અંકુશ જાતની સરખામણીમાં ચીકુની કળી ખાનારી ઈયળ, ચીકુ મોથ અને બીજ કોરી ખાનારી ઈયળનું નુકસાન ઓછું જોવા મળેલ છે.																																			
	પપૈયા																																				
૩૮.	૨૦૨૨	દક્ષિણ ગુજરાતના ખેડૂતોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે ઉભયલિંગી જાતના પપૈયાની ખેતી ઈન્સેક્ટપ્રૂફ નેટહાઉસ (૪૦ મેશ) માં કરવાથી વધુ ઉત્પાદન, નફો અને સારી ગુણવત્તાવાળા ફળ મેળવી શકાય છે. વધુમાં પપૈયા રીંગ સ્પોટ વાયરસ (પી.આર.એસ.વી.) નો ઉપદ્રવ અટકાવી શકાય છે.																																			
૩૯.	૨૦૨૬	દક્ષિણ ગુજરાતના પપૈયાની ખેતી કરતાં ખેડૂત મિત્રોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે પપૈયામાં ભલામણ કરેલ રસાયણિક ખાતરોનું ૭૫ ટકા જથ્થો (૧૦ કિલો છાણિયા ખાતર સાથે ૧૫૦:૧૫૦:૧૮૭.૫ ગ્રામ/છોડ નાઈટ્રોજન, ફોસ્ફોરસ અને પોટાશ) ૨, ૪, ૬, અને ૮ માં મહિનામાં અને અર્કા માઈકોબિઅલ કોન્સોર્ટિયમ (૧૧ ગ્રામ/છોડ) છાણિયા ખાતર (૧ કિલો/છોડ) સાથે બે સરખા ભાગ કરીને રોપણી વખતે અને રોપણીના ૬ મહિના પછી આપવાથી વધારે ઉત્પાદન અને ચોખ્ખો નફો મેળવી શકાય. આ સાથે જમીનમાં સૂક્ષ્મ જીવાણુઓ અને પોષક તત્વોનું પ્રમાણ પણ જળવાઈ રહે છે. વધુમાં ૨૫ ટકા જેટલા રસાયણિક ખાતરોની બચત કરી શકાય.																																			
	કેરી																																				
૪૦.	૨૦૨૬	દક્ષિણ ગુજરાતના આંબા કલમ બનાવતા નર્સરીધારકોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે સેડલ ભેટ કલમ બનાવવા માટે ૪ મહિનાની ઉંમર ધરાવતો મુલકાંડ વાપરી ઓક્ટોબર મહિનામાં જો કલમ બનાવવાથી વધુ કલમો સાથે વળતર મેળવી શકાય છે.																																			

વૈજ્ઞાનિક ઉપયોગી ભલામણો

S. N.	Year	Recommendations	Technology provider
HORTICULTURE			
Banana			
1.	2013	Banana cultivar Gandevi Selection has proved higher productivity (97.20 t/ha) than Grand Naine (73.70 t/ha) under South Gujarat agro-climatic condition, however both these varieties are at par with each other on the basis of per day production <i>i.e.</i> 192.60 kg (Gandevi selection) and 189.87 kg (Grand Naine), which proves that inspite of longer crop period, Gandevi selection provides almost the same per day production and higher benefit in comparison to cultivar Grand Naine. As price of banana fluctuates on day to day basis, Gandevi Selection is same economically remunerative as Grand Naine.	ICAR-AICRP (Fruits)
2.	2015	Banana cv. Grand Naine using drip irrigation are advised to apply 250:90:250 g N:P ₂ O ₅ :K ₂ O/plant and one spray of 10 ppm 2,4-D five days after complete opening of bunch for getting higher yield with standard size of fruits for export quality. 10 kg FYM and 90 g P ₂ O ₅ should be apply at planting, while N and K ₂ O should be applied each @ 250 g per plant in three equal splits at 90, 120 and 150 days after planting.	ICAR-AICRP (Fruits)
Sapota			
3.	2013	The pruning treatments imposed in 20 years old sapota cv. Kalipatti planted at 10x5 m spacing under South Gujarat heavy rainfall zone could not show significant improvement in yield in comparison to conventional spacing (10x10 m). But these pruning treatments in terms of physicochemical properties resulted in significantly higher fruit diameter and pulp skin ratio in treatment heading back of scaffold branches 60 cm away from the point of inter locking. Significantly higher TSS recorded in treatment topping the tree height above 4 th tier. The increase in fruit weight also recorded in treatment combination heading back of scaffold branches and topping. Thus pruning treatment has resulted in higher physico-chemical properties.	ICAR-AICRP (Fruits)
PLANT PATHOLOGY			
Banana			
4.	2002	The farmers of South Gujarat are recommended to apply four sprays of either carbendazim @ 1.0 g/lit or tridemorph @ 0.7 ml/lit or propiconazole @ 1.0 ml/lit or thiophanate methyl @ 2.0 g/lit at one month interval after initiation of disease for effective and economic management of sigatoka leaf spot disease in banana.	ICAR-AICRP (Fruits)
5.	2002	The recommendation proposed for farming community as farmers of South Gujarat heavy rainfall Zone growing banana cv. Basrai are advised to follow any one of the management practices either paring and 0.15 % Acephate dip + 1 % B.M. or paring + 0.15 % Acephate dip for 10 min or suckers dip in COC (Blitox @ 5.0 g/lit) for effective and economic management of rhizome rot of banana.	ICAR-AICRP (Fruits)
6.	2014	Farmers of South Gujarat Heavy Rainfall Zone-I growing banana cv. Grand Naine are advised to plant healthy sucker of banana followed by drenching of Tetracyclin hydroxide 1%-SP @ 500 ppm (0.5 g/litre) 1 litre (0.005%; 150 g a.i./ha) solution per plant at 15 days, 2 month and 4 months after planting with green manuring of sunhemp (three times) in the interspaces till 6 months of planting for effective management of bacterial rhizome rot disease. The PHI for this combination product is 180 days.	ICAR-AICRP (Fruits)

Sapota			
7.	2000	The sapota variety PKM-1 is found less susceptible to the brown leaf spot disease and also give higher yield.	ICAR-AICRP (Fruits)
8.	2000	Sapota cv. Kalipatti planted at wider and closer spacing are as equally infested by brown leaf spot disease.	ICAR-AICRP (Fruits)
9.	2006	Farmers of South Gujarat heavy rainfall Zone, Agro ecological situation III growing sapota cv. Kalipatti are advised to give two sprays of either carbendazim 0.1% or mancozeb 0.2% at one month interval after initiation of diseases for effective and economical control of pestalotiopsis leaf spot disease in sapota.	ICAR-AICRP (Fruits)
Papaya			
10.	2014	The farmers of South Gujarat Heavy Rainfall Zone-I, growing papaya are advised to raise the papaya seedlings under Nylon net (40-60 mesh) and spraying of acephate 75 SP 1.5 g/litre of water at 3 days before planting as well as use of two rows of border crop of maize sown 15 days before planting. Apply 1% Neem oil @ 2 ml/lit with acephate 75 SP 1.5 g/litre of water (0.11%; 675 g a.i./ha) at 15 days interval up to 5 month for effective management of papaya ring spot virus disease. PHI for Acephate is 240 days.	ICAR-AICRP (Fruits)
11.	2020	The higher papaya fruits yield and marketable fruits along with minimum infestation of diseases can be obtained in Module I comprising sequential application of different fungicide and micronutrients over Module II comprising standard package of practices and Module III (control).	ICAR-AICRP (Fruits)
ENTOMOLOGY			
Banana			
12.	2015	For effective management of rust thrips in banana, inject the bud with one ml solution of imidacloprid 17.8 SL (0.6 ml/lit water) or 2 ml solution of azadirachtin 10000 ppm (5 ml/lit water) at the time of emergence of flower (30° angle when bud at upright position).	ICAR-AICRP (Fruits)
Sapota			
13.	1998	Farmers of south Gujarat growing sapota (Kalipatti) are advised to apply three sprays either of monocrotophos 0.05 % at 15 days interval during peak flowering starting from second fortnight of March for the control of bud boring insects (<i>Anarsia achrasella</i> and <i>Nephopteryx eugraphella</i>).	ICAR-AICRP (Fruits)
14.	1998	Farmers of south Gujarat growing sapota are advised to install six methyl eugenol traps (0.056 ml or 4 drops each of methyl eugenol and dichlorvos to be recharged at weekly interval) per hectare at a height of four feet placed at equal distance in sapota orchard to trap the male fruit flies.	ICAR-AICRP (Fruits)
15.	2006	Farmers of South Gujarat heavy rainfall Zone growing sapota cv. kalipatti are advised to give two sprays of any one of the following insecticides during peak flowering at 20 days interval for effective control of bud boring insects (<i>A. achrasella</i> and <i>N. eugraphella</i>). 1. Lambda-cyhalothrin 0.005% (10 ml in 10 lit of water) 2. A mixture of Profenophos (40%) + Cypermethrin (4%) 0.044 % (10 ml in 10 lit of water) 3. Mixture of Chlorpyrifos (50%) + Cypermethrin (5%) 0.055% (10 ml in 10 lit of water).	ICAR-AICRP (Fruits)
16.	2015	Sapota growers are advised to apply three sprays of profenophos 50 EC, 15 ml or novaluron 10 EC, 5 ml per 10 litre water at 20 days interval from October onwards for effective management of seed borer.	ICAR-AICRP (Fruits)

17.	2021	Sequential application of deltamethrin 2.8 EC @ 10 ml/ 10 lit water and <i>Bt</i> powder (<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> - 1 x 10 ⁹ CFU/g) @ 10 g/ 10 lit water at 15 days interval at marble stage of fruit (October onwards) to minimize fruit damage of seed borer (<i>Trymalitis margaritas</i> Meyrick) in sapota	ICAR-AICRP (Fruits)																																						
18.	2022	The sapota varieties/hybrids viz., Kalipatti, Kirthibarthi, DHS-2, CO-2 and Cricket ball were found more susceptible to seed borer, <i>Trymalitis margarias</i> Meyrick; while Chala collection-1, Chala collection-2, Chala collection-3, Zumakhiya, CO-1 and CO-3 were showed less susceptible to seed borer. The fruit infestation was found higher from December to February.	ICAR-AICRP (Fruits)																																						
19.	2024	Sapota varieties/hybrids viz., Kalipatti, CO-2, Kirthibharti, CO-1 and DHS-1 were more damaged (11.70-15.20%), while Chala Collection 3, PKM-1, Chala Collection 1, Pilipatti and Chala Collection 2 were less infested (7.63-9.19%) by bud borer. May is the critical month of infestation. Sapota varieties/hybrids viz., Paria Collection, Kirthibharti, CO-2 and CO-1 were more damaged (12.99-15.62%), while Chala Collection 2, Chala Collection 3, PKM-1, Mohangootee and Chala Collection 1 were less infested (7.05-8.46%) by chiku moth. May and December are the critical months of infestation. Escape type resistance was found in less infested sapota varieties due to late flowering initiation in both pests.	Research on Fruits																																						
20.	2026	The following varieties/hybrids were found resistant or susceptible to the major pests of sapota in critical month of infestation with morphological and biochemical contents under high-density plantation (5 × 5 m). <table><tr><th rowspan="2">Insect pest name</th><th rowspan="2">Resistant</th><th rowspan="2">Susceptible</th><th rowspan="2">Month of peak infestation</th><th colspan="2">Factor responsible for resistant /susceptibility</th></tr><tr><th>Morphology</th><th>Biochemical / nutritional</th></tr><tr><td>Bud borer, <i>Anarsia achrasella</i> Bradley</td><td>PKM-1, CO-3</td><td>Kalipatti</td><td>May-June</td><td>Low bud diameter</td><td>High Carbohydrate in bud</td></tr><tr><td>Chiku moth, <i>Nephopteryx eugraphella</i> (Ragonot)</td><td>PKM-1, CO-3</td><td>Kalipatti</td><td>May-June and December-January</td><td>Low bud diameter</td><td>High Carbohydrate and Non-Reducing Sugar in bud</td></tr><tr><td>Seed borer, <i>Trymalitis margarias</i> Meyrick</td><td>PKM-1, CO-3</td><td>Kalipatti and DHS-2</td><td>February-March</td><td>Low seed length</td><td>--</td></tr><tr><td>Fruit fly, <i>Bactrocera</i> spp.</td><td>CO-3</td><td>DHS-1</td><td>May-June</td><td>--</td><td>Low TSS</td></tr><tr><td>Midrib folder, <i>Banisia myrsusales eleoralis</i> (Walker)</td><td>PKM-1 and Cricket ball</td><td>Kalipatti and DHS-1</td><td>May and December</td><td>--</td><td>High Potassium (K₂O) in leaf</td></tr></table>	Insect pest name	Resistant	Susceptible	Month of peak infestation	Factor responsible for resistant /susceptibility		Morphology	Biochemical / nutritional	Bud borer, <i>Anarsia achrasella</i> Bradley	PKM-1, CO-3	Kalipatti	May-June	Low bud diameter	High Carbohydrate in bud	Chiku moth, <i>Nephopteryx eugraphella</i> (Ragonot)	PKM-1, CO-3	Kalipatti	May-June and December-January	Low bud diameter	High Carbohydrate and Non-Reducing Sugar in bud	Seed borer, <i>Trymalitis margarias</i> Meyrick	PKM-1, CO-3	Kalipatti and DHS-2	February-March	Low seed length	--	Fruit fly, <i>Bactrocera</i> spp.	CO-3	DHS-1	May-June	--	Low TSS	Midrib folder, <i>Banisia myrsusales eleoralis</i> (Walker)	PKM-1 and Cricket ball	Kalipatti and DHS-1	May and December	--	High Potassium (K ₂ O) in leaf	Research on Fruits
Insect pest name	Resistant	Susceptible					Month of peak infestation	Factor responsible for resistant /susceptibility																																	
			Morphology	Biochemical / nutritional																																					
Bud borer, <i>Anarsia achrasella</i> Bradley	PKM-1, CO-3	Kalipatti	May-June	Low bud diameter	High Carbohydrate in bud																																				
Chiku moth, <i>Nephopteryx eugraphella</i> (Ragonot)	PKM-1, CO-3	Kalipatti	May-June and December-January	Low bud diameter	High Carbohydrate and Non-Reducing Sugar in bud																																				
Seed borer, <i>Trymalitis margarias</i> Meyrick	PKM-1, CO-3	Kalipatti and DHS-2	February-March	Low seed length	--																																				
Fruit fly, <i>Bactrocera</i> spp.	CO-3	DHS-1	May-June	--	Low TSS																																				
Midrib folder, <i>Banisia myrsusales eleoralis</i> (Walker)	PKM-1 and Cricket ball	Kalipatti and DHS-1	May and December	--	High Potassium (K ₂ O) in leaf																																				

મુદ્દા નં ૨૨. સેમીનાર / સીમ્પોઝીયમ / કોન્ફરન્સ / વર્કશોપ / શોર્ટ ટર્મ ટ્રેનીંગ / સમર એન્ડ વિન્ટર સ્કુલ ટ્રેનીંગ / ઓરીએન્ટેશન ટ્રેનીંગ / રીફ્રેસર કોર્સ / અન્ય કોર્સનું વિગત :

1. Dr. K. D. Bisane participated in 21 days CAFT Training 'Ecologically Based Pest Management for Quality Food Production' organized by Department of Entomology, CCS Haryana Agril. University, Hisar from 15th October to 4th November, 2015.
2. Dr. K. D. Bisane participated in State Level Seminar on "Plant Protection in Organic Farming" organized by Plant Protection Association of Gujarat (PPAG) held at Navsari Agricultural University, Navsari on 11th June, 2016.
3. Dr. K. D. Bisane participated and delivered two oral presentation in IJTA 3rd International Conference on "Agriculture, Horticulture and Plant Sciences" organized New Delhi during 25th and 26th June, 2016.
4. Dr. A. N. Patel participated in National conference on Horticulture education at ICAR-IIHR, Bengaluru on 27th September, 2016.
5. Dr. K. D. Bisane participated and presented poster in 3rd National Meet of Entomologists-2016 organized by ICAR-Indian Institute of Horticultural Research, Bengaluru during 7th & 8th Oct., 2016.
6. Dr. A. N. Patel, Mr. A. R. Patel, Dr. K. D. Bisane and Mr. B.M. Naik participated and presented poster in National Symposium on "Enhancing Productivity of Fruit Crops – Mitigating Major Challenges" held at ICAR-IIHR, Bengaluru on 8th January, 2017.
7. Dr. A. N. Patel participated in brain storming session on Mango malformation at NAU, Navsari on 17th January, 2017.
8. Dr. K. D. Bisane attended 21 days Training on "Plant Health Management for Plant Health Doctors" organized by National Institute of Plant Health Management, Hyderabad from 8th to 28th Feb., 2017.
9. Mr. B.M. Naik participated in 21 days summer school training programme on "Employment Generation through Skill Oriented Agricultural Entrepreneurship Development among Rural Youth" at MPUAT, Udaipur (Rajasthan) from 31st July to 20th August, 2017.
10. Dr. K. D. Bisane attended sensitization meeting of banana Fusarium wilt TR4 at UHS campus, GKVK, Bengaluru on 5th Aug., 2017.
11. Mr. A. R. Patel participated in 21 days Summer school training on "Production of Bio-CNG and Organic Manure through Anaerobic Agro-waste Decomposition Techniques" at Dry Land Farming Research Station, Arjia, Bhilwara, MPUAT, Udaipur, Rajasthan from 10th to 30th August 2017.
12. Dr. A. N. Patel delivered lecture in training programme on "Regional crops and mango grafting techniques" at Lachhakadi (Dharampur) on 7th September, 2017.
13. Dr. K. D. Bisane attended Pre-QRT meeting of ICAR-AICRP (Fruits) at ICAR-IIHR, Bengaluru during 30th & 31st Sept., 2017.
14. Dr. A. N. Patel attended QRT meeting of ICAR-AICRP (Fruits) for presentation of work done on banana (2011 to 2017) at ICAR-NRCB, Tiruchirappalli, Tamil Nadu held on 19th and 20th December, 2017.
15. Dr. K. D. Bisane participated in 21 days winter school training on "Insect Resistance to Bt toxins and Insecticides in Cotton" at ICAR-CICR, Nagpur (M.S.) from 18th Jan. to 7th Feb., 2018.
16. Dr. K. D. Bisane attended QRT Meeting of ICAR-AICRP (Fruits) for presentation of work done on banana (2011 to 2017) at HCRI, Periyakulam (T.N.) held on 14th June, 2018.
17. Dr. K. D. Bisane and A. R. Patel attended ISPP West Zonal Seminar on "Emerging Trends in Plant Physiology for Crop Production under Climate Change Scenario" at MPKV, Rahuri (M.S.) held on 4th August, 2018.
18. Mr. B.M. Naik and Dr. K. D. Bisane attended meeting on 'Doubling Farmers' Income and Follow-Up Action on Proceedings under ICAR-AICRP on Fruits' at ICAR-IIHR, Bengaluru during 17th to 19th Sept., 2018.
19. Dr. K. D. Bisane participated in National Workshop on Digital Field Book at NAU, Navsari on 29th October, 2018.

20. Dr. K. D. Bisane participated in National Symposium on 'Sustainable Management of Pests and Diseases in Augmenting Food and Nutritional Security' at NAU, Navsari during 22nd to 24th January, 2019.
21. Dr. K.D. Bisane participated in International Conference on "Plant Protection in Horticulture (ICPPH-2019) - Advances and Challenges" held at ICAR-IIHR, Bengaluru- 560089 (Karnataka) during 24th to 27th July, 2019.
22. Dr. K. D. Bisane attended in Training cum Interface Meeting on Project Appraisal and Research Data Management of ICAR-AICRP on Fruits at ICAR-IIHR, Bengaluru- 560089 (Karnataka) during 19th to 21st August, 2019.
23. Dr. K. D. Bisane participated in State Level Seminar on "Krushi ane Bagayati pakoma pravartman pak sanrakshan na prashno ane nirakaran" organized by Plant Protection Association of Gujarat (PPAG) held at Anand Agricultural University, Anand on 8th November, 2019.
24. Dr. K. D. Bisane participated in International Conference on "Agriskills for Convergence in Research, Industry & Livelihood (ACRIL)" at Farmers' Academy & Convention Centre (FACC), BCKV, Kalyani, Nadia, West Bengal from 28th November to 1st December, 2019.
25. Dr. PK Modi participated in National Web Conference on "Vegetable Farmers Forum-2020" organized by Division of Entomology, IARI, New Dehli- 110012 during 25th and 26th June, 2020.
26. Dr. P. K. Modi participated in National webinar on "Quality production of pomegranate in arid region during Covid 19" organized by AICRP on Arid zone fruits, Agril. Res. Station, SKRAU, Bikaner (Rajasthan) during 2nd and 3rd July, 2020.
27. Dr. A. P. Patel, Shri. B. M. Naik and Dr. K. D. Bisane participated in National Webinar on "Advances in Disease and Pest Management for Sustainable Banana Industry" organized by AAU, Jorhat (Assam) and ICAR-AICRP, ICAR-IIHR, Bengaluru (Karnataka) on 4th July, 2020.
28. Dr. A. P. Patel and Dr. P. K. Modi participated in ICAR-NRCB Webinar Series-2020 on "Value addition and entrepreneurs development in Banana" organized by ICAR-National Research Centre for Banana, Tiruchirapalli (T.N.) on 22nd July, 2020.
29. Dr. A. P. Patel, Dr. P. K. Modi and Dr. K. D. Bisane participated in ICAR-NRCB Webinar Series-2020 on "Precision farming in banana" organized by ICAR-National Research Centre for Banana, Tiruchirapalli (T.N.) on 25th July, 2020.
30. Dr. A. P. Patel, Dr. P. K. Modi, Dr. K. D. Bisane and Shri. B. M. Naik participated in ICAR-NRCB Webinar Series-2020 on "Integrated Disease Management in Banana" organized by ICAR-National Research Centre for Banana, Tiruchirapalli (T.N.) on 29th July, 2020.
31. Dr. A. P. Patel, Dr. P. K. Modi and Dr. K. D. Bisane participated in ICAR-NRCB Webinar Series-2020 on "Integrated Insect Pests and Nematodes Management in Banana" organized by ICAR-National Research Centre for Banana, Tiruchirapalli (T.N.) on 4th August, 2020.
32. Dr. A. P. Patel and Dr. P. K. Modi participated in ICAR-NRCB Webinar Series-2020 on "Planting Material in Banana: Present and Next Generation Technologies" organized by ICAR-National Research Centre for Banana, Tiruchirapalli (T.N.) on 7th August, 2020.
33. Dr. K. D. Bisane participated in Webinar on "Biopesticide: Green Technology in Sustainable Agriculture" organized by College of Agriculture, NAU, Bharuch (Gujarat) on 18th August, 2020.
34. Dr. A. P. Patel, Dr. P. K. Modi, Dr. K. D. Bisane and Shri. B. M. Naik participated in ICAR-NRCB Webinar Series-2020 on "ICAR NRCB Foundation Day Celebrations and Webinar on Approaches and Strategies for Augmenting Export of Bananas from India" organized by ICAR-National Research Centre for Banana, Tiruchirapalli (T.N.) on 21st August, 2020.
35. Dr. K. D. Bisane participated in National E-Workshop on "Microbial Intervention in Plant Health and Nutrition" organized by College of Agriculture, NAU, Bharuch (Gujarat) on 26th August, 2020.
36. Dr. K. D. Bisane participated in National Webinar on "Beekeeping Techniques" organized by Anand Niketan College of Agriculture, Warora (Maharashtra) on 20th September, 2020.
37. Dr. K. D. Bisane participated in Online lecture on "Regulatory environment for safe use of Agro-chemicals in India" organized by NAHEP-CAAST, NAU, Navsari (Gujarat) on 7th October, 2020.

38. Dr. P. K. Modi and Shri. B. M. Naik participated in National Webinar on "Management of Root rot Disease of Horticultural crops" organized by Dr. RPCAU, Pusa (Bihar) on 24th Nov., 2020.
39. Dr. K. D. Bisane participated in International Training Programme on "Organic Farming: Field to Fashion" organized Dr. PDKV, Akola (Maharashtra) on 14th to 19th December, 2020.
40. Dr. K. D. Bisane participated in online Seminar on "Protected cultivation for enhancing resource use efficiency and productivity of horticultural crops" organized by NAHEP-CAAST, AAU, Anand (Gujarat) on 22nd December, 2020.
41. Dr. A. P. Patel participated in National webinar on "Recent Advances in mango production" organized by College of Horticulture, University of Horticulture Sciences, Bidar (KA) on 15th & 16th January, 2021.
42. Dr. A. P. Patel, Dr. P. K. Modi and Dr. K. D. Bisane participated in virtual Training course on "Management of Fruit Genetic Resources" organized ICAR-NBPGR, New Delhi, ICAR-AICRP (Fruits), Bengaluru & ICAR-IIHR, Bengaluru on 1st and 2nd February, 2021.
43. Dr. K. D. Bisane participated in online training on 'Vertebrate Pest Management – Wild Boar, Monkey and Birds' organized by National Institute of Plant Health Management (NIPHM), Hyderabad from 3rd to 5th February, 2021.
44. Dr. K. D. Bisane participated in online training on 'Fruit Fly Surveillance and Management' organized by National Institute of Plant Health Management (NIPHM), Hyderabad from 19th to 23rd April, 2021.
45. Dr. K. D. Bisane participated in National Webinar on "Promise of Biological Control for Sustainable Pest Management" organized by Department of Entomology, Rajasthan College of Agriculture, MPUAT, Udaipur, Rajasthan on 17th May, 2021.
46. Dr. K. D. Bisane participated in online training on 'Rodent Pest Management' organized by National Institute of Plant Health Management (NIPHM), Hyderabad from 17th to 21st May, 2021.
47. Dr. K. D. Bisane participated in National Webinar on "Microbial Pesticide: Next Generation Preparedness" organized by DBT-ECAB and Department of Plant Pathology, AAU, Jorhat on 2nd July, 2021.
48. Dr. P. K. Modi participated in National Webinar on "Role of Micro organism in Resilient Agriculture" organized by Swami Keshwanand Rajasthan Agricultural University, Bikaner on 5th July, 2021.
49. Dr. K. D. Bisane participated in online training on 'Production Protocol for Predators and Parasitoids' organized by National Institute of Plant Health Management (NIPHM), Hyderabad from 12th to 16th July, 2021.
50. Shri. B. M. Naik participated in online training on 'Vegetable grafting: Concept and Applications' organized by ASPEE College of Hort. & Forestry, NAU, Navsari from 16th to 24th July, 2021.
51. Dr. K. D. Bisane participated in National webinar on "Invasive Pests and Diseases Problem in Indian Agriculture" organized by Department of Entomology and Plant Pathology, N. M. C. A., NAU, Navsari on 7th August, 2021.
52. Dr. A. P. Patel, Dr. P. K. Modi, Dr. K. D. Bisane and Shri. B. M. Naik participated in National webinar on "Recent Advances in Production Technology and Value Addition of Coconut" organized by ICAR-AICRP (Palms), RHRS, ASPEE College of Hort. & Fore., NAU, Navsari on 9th August, 2021.
53. Dr. K. D. Bisane participated in National Webinar on "Banana Value Chain and Marketing New Business Horizons" organized by ICAR-National Research Centre for Banana, Tiruchirappalli (T.N.) on 21st August, 2021.
54. Dr. K. D. Bisane participated in online training on 'Management of honeybees' organized by Department of Entomology, College of Agriculture, NAU, Waghai and Department of Entomology, N.M. C. A., NAU, Navsari from 24th to 26th August, 2021.
55. Dr. P. K. Modi participated in National webinar on "Scope, Potential and Current Status of Dragon Fruit in India" organized by Horticulture Training Institute Uchani Karnal (Haryana) on 1st October, 2021.

56. Dr. A. P. Patel and Dr. P. K. Modi participated in National Online Training on “Conservation, Management & Utilization of Horticultural Genetic Resources for Livelihood and Nutritional Security” organized by ICAR-IIHR, Bengaluru from 22nd to 26th November, 2021.
57. Dr. A. P. Patel and Dr. P. K. Modi participated in National webinar on “Mango Producing is not enough! Wakeup Call on Postharvest Handling, Processing Technology, and Value Chain Management” organized by Department of Agriculture and Environmental Sciences, NIFTEM, Kundli, Sonapat (Haryana) on 7th December, 2021.
58. Dr. K. D. Bisane participated in virtual 5th National Symposium on Plant Protection in Horticulture (NSPPH-2021): Challenges and Roadmap Ahead (Oral presentation) organized by AAPMHE at ICAR-IIHR, Bengaluru- 560089 (Karnataka) on 27th to 29th December, 2021.
59. Dr. K. D. Bisane participated in Seminar on “Maintenance of Quality and Safety of Horticultural and Food Crops through Biological Control of Pests and Diseases” organized by NAHEP-CAAST Sub-project (Unit-4), N.M.C.A., NAU, Navsari, & Plant Protection Association of Gujarat (PPAG), Navsari Chapter on 30th December, 2021.
60. Dr. K. D. Bisane participated in 10 days Short course on “Bioprospecting Plant Microbiome: A Novelty to Plant Health Management in Organic Production System” organized by Department of Plant Pathology, Assam Agricultural University, Jorhat, Assam from 19th to 28th January, 2022.
61. Dr. A. P. Patel, Dr. P. K. Modi and Dr. K. D. Bisane participated in Orientation cum Training Programme on “Conduct of Event Selection Trials of GE Banana Events” organized by ICAR-NRCB, Trichy (Tamil Nadu) from 1st and 2nd February, 2022.
62. Dr. K. D. Bisane and B. M Naik participated in State Level Seminar on “*Pakrutic Pakoma Pak Sanrakshan*” organized by Plant Protection Association of Gujarat (PPAG) and Anand Agricultural University, Anand (Gujarat) on 5th April, 2022.
63. Dr. A. P. Patel, Dr. P. K. Modi and Dr. K. D. Bisane participated in 2nd Indian Horticulture Summit-2022 organized by Society for Horticultural Research and Development (SHRD) at NAU, Navsari from 27th to 29th April, 2022.
64. Dr. K. D. Bisane participated in National Seminar cum workshop on “Food for Thought: Applied Statistics and its Implications” organized by Department of Agricultural Statistics, NMCA & Centre for Advanced Agricultural Science and Technology, NAHEP at NAU, Navsari on 29th and 30th June, 2022.
65. Dr. K. D. Bisane participated in 7th National Conference on “Biological Control: 75 Years of Biological Control of Pests and Diseases in Agriculture: Challenges and Way Forward” organized by Society for Bio-control Advancement & ICAR-National Bureau of Agricultural Insect Resources, Bengaluru from 15th to 17th December, 2022.
66. Dr. K. D. Bisane participated in West Zone Seminar on “Innovative Approaches For Sustainable Agriculture Under Changing Climates” organized by Department of Plant Physiology, NMCA and Indian Society for Plant Physiology at NAU, Navsari on 22nd and 23rd December, 2022.
67. Shri. K. V. Makwana participated ISMP 42nd Annual Conference and National Symposium on “Plant Health Management: way Forward for Food Safety, Security and Sustainability” organized by Indian Society of Mycology and Plant Pathology Maharana Pratap University of Agriculture and Technology Udaipur, Rajasthan held at NAU, Navsari during 10th to 12th May, 2023.
68. Dr. K. D. Bisane and Dr. P. K. Modi participated in Global Conference on “Precision Horticulture for Improved livelihood, Nutrition and Environmental Services” organized by ASM Foundation, New Delhi and Jain Irrigation Systems Limited held at JISL, Jalgaon (Maharashtra) during 28th to 31st May, 2023.
69. Shri. K. V. Makwana participated in a Parisanvad on “Pak Sarankshan Ane Bajar Vyavasthapan Samsya Ane Samadhan” was organized by PPAG Silver Jubilee celebrated at College of Agriculture, AAU, Anand on 30th September, 2023.
70. Shri. K. V. Makwana participated in National Conference on “Transformation of Agro-Technologies for Enhancing Production under Diverse Agro-Ecosystem” organized by College of Agriculture, Waghai, Navsari Chapter- Indian Society of Agronomy, NAU, Navsari held at Saputata during 12th to 14th October, 2023.

71. Dr. K. D. Bisane participated in International Conference on “Next-Gen Preparedness for Food Security and Environmental Sustainability” held at Assam Agricultural University, Jorhat (Assam) during 22nd to 24th November, 2023.
72. Dr. K. D. Bisane attended ICAR Sponsored Short Course on “Value Chain Management of Phytomicrobiome for Sustaining Crop Health” held at Assam Agricultural University, Jorhat (Assam) during 1st to 10th February, 2024.
73. Shri. K. V. Makwana attended training on “The art and science of video production technology” jointly organized by Krushi Vigyan Kendra, NAU, Navsari and EEL, AAU Campus, Anand at KVK, NAU, Navsari during 29th to 31st July, 2024.
74. Dr. A. P. Patel and Dr. P. K. Modi attended MIDH Sponsored training on “Scientific approach towards production & processing of *kamalam* fruit” held at Center of Excellence for *Kamalam* Fruit, ICAR-IIHR, Experimental Farm, Hirehalli, Bengaluru (Karnataka) during 18th to 29th September, 2024.
75. Dr. K. D. Bisane participated in International Conference on “Plant Protection in Horticulture (ICPPH-2024): Advances and Challenges” held at ICAR-IIHR, Bengaluru (Karnataka) during 25th to 27th September, 2024.
76. Dr. P. K. Modi participated in Conference on “Fostering Agri Innovation and Entrepreneurial Ecosystem” held at NAU, Navsari during 16th January, 2025.
77. Dr. K. D. Bisane and Dr. Sonal S. Patel participated in State Level Seminar on “Honey bee breeding and Mushroom Production: Problem and Solution” held at Plant Protection Association of Gujarat (PPAG) at NAU, Navsari during 3rd September, 2025.
78. Dr. A. P. Patel and Dr. K. D. Bisane participated in 11th Indian Horticulture Congress – 2025 and International meet on Horticulture for Inclusive, Equitable and Sustainable Growth held at IAHS, New Delhi at UAS, Bengaluru (Karnataka) during 6th to 9th November, 2025.

મુદ્દા નં ૨૩. કેન્દ્ર ખાતે વાવેતર પાકોની (Good Agricultural Practices) આધારિત ખેતી પદ્ધતિ:

કેળની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ

પ્રસ્તાવના :

ભારતમાં આંખાના પાક પછી કેળનો પાક વાવેતર વિસ્તારમાં મોખરાનું સ્થાન ધરાવે છે. દુનિયાના ઉષ્ણકટિબંધના તમામ દેશોમાં કેળનો પાક વત્તા ઓછા પ્રમાણમાં ઉગાડવામાં આવે છે. જેમાં ભારત, દ. અમેરીકા, આફ્રિકા અને ફિલીપાઈન્સ મોખરે છે. કેળ ઉત્પાદનમાં ભારત વિશ્વમાં પ્રથમ સ્થાન ધરાવે છે. કુલ ઉત્પાદનમાં ૨૮-૨૯ ટકા જેટલા કેળા ભારતમાં ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે. ભારતમાં તામિલનાડુ, કેરાલા, મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, આંધ્રપ્રદેશ, કર્ણાટક અને પ. બંગાળ કેળ ઉગાડતા મુખ્ય રાજ્યો છે. ગુજરાતમાં કેળનો પાક આશરે ૬૦ હજાર હેક્ટરમાં લેવામાં આવે છે. ગુજરાતની કેળની ઉત્પાદકતા ૬૫ ટન/હેક્ટર છે. કેળના છોડના દરેક ભાગનો કોઈને કોઈ ઉપયોગ થતો હોય છે. જેથી તેને “કલ્પતરુ” કહેવામાં આવે છે. તેના પર્ણ દંડ અને થડમાંથી નીકળતા રેસાનો ઉપયોગ કાગળ, દોરડા તથા સેલ્યુલોઝ બનાવવા માટે થાય છે. દ. ભારતમાં પાનનો ઉપયોગ જમવામાં પતરાળા તરીકે થાય છે. થડના મધ્ય ભાગમાંથી કેન્ડી બનાવવામાં આવે છે. ફળને પકવીને અને રાંધીને ખાવામાં તેમજ સુકવીને વેફર, ફ્રિગ અને પાવડર બનાવવામાં થાય છે.

પ્રચલિત જાતો :

ગુજરાતમાં ખાસ કરીને ગ્રાન્ડ નૈન, બસરાઈ, લોખંડી, રોબુસ્ટા, શ્રિમંતી, ગણદેવી સીલેક્શન વિગેરે જાતો પ્રચલિત છે. જેમાં વધુ વિસ્તાર ગ્રાન્ડ નૈન જાતનો છે.

ગ્રાન્ડ નૈન : કેવન્ડીશ ગ્રુપમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતી ધરાવતી જાત છે. હાલમાં ભારતના તમામ કેળ ઉગાડતા રાજ્યોમાં વાવેતર થાય છે. છોડની ઉંચાઈ ૧.૭૫ થી ૨.૨૫ મી. હોય છે. લુમનું સરેરાશ વજન ૨૨ થી ૨૫ કિ. ગ્રા. હોય છે. લુમમાં કાતરાની સંખ્યા સરેરાશ ૧૦ જેટલી હોય છે. લુમમાં બે કાતરા વચ્ચેનું અંતર વધારે હોય છે. ફળો કદમાં બસરાઈ કરતા મોટા હોય છે. ફળની ગુણવત્તા અને ટકાઉ શક્તિ સારી છે. ફળો ૧૨ થી ૧૩ માસમાં તૈયાર થાય છે.

બસરાઈ: આ જાત લોટણ, કાબુલી, ભુસાવળ તથા જહાજી જેવા નામથી પણ ઓળખાય છે. ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, પ. બંગાળમાં વ્યવસાયિક ધોરણે વવાતી હતી. જેનું સ્થાન હાલમાં ગ્રાન્ડ નૈન જાતે લીધું છે. બસરાઈ જાતની ઉંચાઈ ૧.૫ થી ૨.૦ મી. હોય છે. ફળો મોટા વળેલા અને છાલનો રંગ લીલાશ પડતો પીળા હોય છે. લુમનું સરેરાશ વજન ૨૦ કિ. ગ્રા. હોય છે. લુમને તૈયાર થતાં ૧૩ થી ૧૪ માસનો સમય લાગે છે. આ જાત સુકારાના રોગ સામે પ્રતિકારક છે.

ગણદેવી સીલેક્શન:

આ જાત દક્ષિણ ગુજરાત ના નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારી ના ફળ સંશોધન કેન્દ્ર, ગણદેવી ખાતેથી બહાર પાડવામાં આવેલ છે. આ જાતના છોડની ઉંચાઈ મધ્યમ ૨.૦ મીટર તથા થડની જાડાઈ ૮૦.૦ સેમી. હોય છે. આ જાત માં લુમનું સરેરાશ વજન ૨૫ થી ૨૮ કિ. ગ્રા. હોય છે. લુમને તૈયાર થતાં ૧૬ થી ૧૭ માસનો સમય લાગે છે.

હવામાન :

કેળનો પાક ગરમ અને ભેજવાળા હવામાનમાં સારો થાય છે. પાકના ઉત્તમ વિકાસ માટે ૨૭° સે.ગ્રે. ઉષ્ણતામાન માફક આવે છે. વાર્ષિક ૨૦૦૦ થી ૨૫૦૦ મી.લી. વરસાદવાળા વિસ્તારમાં પિયતની સગવડ હોય તો આ પાક સારો થાય છે.

જમીન :

કેળને માટે સારા નિતારવાળી, ફળદ્રુપ, ગોરાડુ અને મધ્યમ કાળી જમીન ખાસ અનુકૂળ આવે છે. કાળી ચીકણી તથા રેતાળ જમીનમાં કેળનો પાક સારો થતો નથી.

રોપણી નો સમય :

કેળની રોપણી માટે ૧૫ મી જુનથી ૧૫ મી ઓગસ્ટ સુધીનો સમય ઉત્તમ છે. તેમ છતાં હવે ટીસ્યુકલ્ચર છોડ ઉપલબ્ધ થતાં બજારભાવ મુજબ રોપણીનો સમય રાખી શકાય.

રોપણીનું અંતર :

કેળની રોપણી ૧.૮ × ૧.૮ મીટર અંતરે (૩૦૮૬ છોડ/હે) કરવાની ભલામણ છે. રોપણીના અંતરે ૩૦ × ૩૦ × ૩૦ સે. મી ના ખાડા કરવા. ખાડા ૧૫ દિવસ તપવા દેવા. ખાડા દીઠ ૧૦ કિલો સાફ કોહવાયેલું છાણિયું ખાતર માટીમાં મિશ્ર કરી ખાડા ભરી દેવા. ત્યારબાદ જૂન માસમાં ગાંઠ અથવા ટીસ્યુકલ્ચર છોડની રોપણી કરવી. બસરાઈ જાતનું ૧.૦ × ૧.૨ × ૨.૦ મીટરે જોડીયા હાર પધ્ધતિથી ત્રિકોણાકારે રોપણી કરવાથી હેક્ટરે ૬૨૫૦ છોડની સંખ્યા મળતાં સરેરાશ ૮૭ ટન/હે. કેળાનું ઉત્પાદન મળેલ છે. બસરાઈ કરતાં ગ્રાન્ડ નૈન જાતની ઉંચાઈ વધુ હોવાથી તેની રોપણી ૧.૨ × ૧.૫ × ૨.૪ મીટરે જોડીયા હાર પધ્ધતિથી કરી શકાય અને તેમ કરતાં હેક્ટરે ૪૬૦૦ છોડનો સમાવેશ થાય છે.

રોપણી માટે પીલાની પસંદગી :

કેળની રોગમુક્ત વાડીમાંથી તંદુરસ્ત પીલા ૫ થી ૮ મહિનાનાં હોય તેવા પસંદ કરવા. કેળની રોપણી માટે અણીદાર પાનવાળા જુસ્સાદાર ૫૦૦ થી ૧૫૦૦ ગ્રામ વજનના તાજા તલવાર પીલા પસંદ કરવા. ટીસ્યુકલ્ચર છોડ રોપવા હોય તો સારા તંદુરસ્ત હાર્ડનીંગ થયેલા ૨૦ થી ૨૫ સે. મી. ઉંચાઈના, ૪ થી ૬ પાનવાળા હોય અને રોગમુક્ત છોડ રોપવા. મેક્રોપ્રોપોગેશન પધ્ધતિથી તંદુરસ્ત કેળના ગાંઠમાંથી ટીસ્યુ કલ્ચર જેવાજ કેળના છોડ ખેડૂત અને નર્સરીધારકો પોતાના ખેતર કે નર્સરીમાં તૈયાર કરી શકે છે. આ પધ્ધતિથી રોપણી સામગ્રી પાછળ થતો ખર્ચ ઘટાડી શકાય છે. આ પધ્ધતિમાં પ્રતિ ગાંઠ વામ અને ટ્રાયકોડમાં વિરીડી બંને ૩૦ ગ્રામ મુજબ આપવાથી પાંચથી છ માસમાં એક ગાંઠમાંથી વધુમાં ૨૦ (વીસ) જેટલા રોપવા લાયક છોડ મળી શકે છે.

રોપ તૈયાર કરવાની મેક્રો પ્રોપોગેશન પધ્ધતિ :

- સારી ગુણવત્તાવાળી ૫૦૦ થી ૧૦૦૦ ગ્રામ વજનની ગાંઠો પસંદ કરવી.
- ગાંઠનો ઉપરનો ભાગ થડની શરૂઆત થાય ત્યાંથી કાપી નાંખવો.
- ગાંઠની વચ્ચેથી ૪ સે. મી. ઉંડાઈ અને ૨ સે. મી. પહોળાઈ જેટલો ભાગ કોતરીને મુખ્ય આંખ દુર કરવી.
- ગાંઠના ઉપરના ભાગે છ કે આઠ ભાગ થાય તે પ્રમાણે આડા કાપા મુકવા.
- આ રીતે તૈયાર થયેલ ગાંઠોને નેટ હાઉસમાં ૧×૧ ફુટના અંતરે ગોઠવી લાકડાના વ્હેરથી ઢાંકી દેવી.
- ગાંઠ દીઠ વામ અને ટ્રાયકોડમાં વિરીડી બંને ૩૦ ગ્રામ મુજબ ગાંઠની ફરતે આપવું.
- ગાંઠમાંથી નીકળતી પ્રાથમિક અને દ્વિતીય કળીઓને કોતરીને દુર કરવી.
- ત્યારબાદ નીકળતી તૃતીય કળીઓનો વિકાસ થવા દેવો અને જ્યારે ચાર થી પાંચ પાન ધારણ કરે ત્યારે છોડને છૂટા પાડી માટી, રેતી અને છાણિયા ખાતરના સમ પ્રમાણમાં તૈયાર કરેલ ઉછેર માધ્યમને પ્લાસ્ટીક બેગમાં ભરી તેમાં રોપવા.
- તૈયાર થયેલ રોપાને સખ્તાઈ માટે નેટહાઉસમાં રાખવા.
- સમગ્ર પધ્ધતિ દરમિયાન જરૂરિયાત મુજબ ઝારાથી નિયમિત પિયત આપવું.

ખાતર :

ખામણ પધ્ધતિ દ્વારા : છોડ દીઠ ૨૦૦ ગ્રામ નાઈટ્રોજન , ૮૦ ગ્રામ ફોસ્ફરસ અને ૨૦૦ ગ્રામ પોટાશ બસરાઈ, હરિછાલ, રોબુસ્ટા જાતમાં આપવા ભલામણ છે. કેળની ગ્રાન્ડ નૈન જાત માટે ૩૦૦ ગ્રામ નાઈટ્રોજન, ૮૦ ગ્રામ ફોસ્ફરસ અને ૨૦૦ ગ્રામ પોટાશ નીચેની ટેબલ મુજબ આપવા.

આપવાનો સમય	પોષક તત્વો નો જથ્થો (ગ્રામ)			ખાતરનો જથ્થો (ગ્રામ/છોડ)		
	નાઈટ્રોજન	ફોસ્ફરસ	પોટાશ	યુરીયા	એસ. એસ. પી.	મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ
રોપણીના એક માસ પછી	—	૮૦	—	—	૫૬૦	—
રોપણીના ત્રણ માસ પછી	૧૦૦	—	૬૭	૨૧૭	—	૧૧૦
રોપણીના ચાર માસ પછી	૧૦૦	—	૬૭	૨૧૭	—	૧૧૦
રોપણીના પાંચ માસ પછી	૧૦૦	—	૬૭	૨૧૭	—	૧૧૦
	૩૦૦	૮૦	૨૦૦	૬૫૦	૫૬૦	૩૩૦

કેળમાં અવસ્થાના આધારે ખાતર પ્રબંધન : આ પદ્ધતિથી કેળમાં ખાતર આપવાથી કેળના પાકમાં કુલ ભલામણના ૮૦ ટકા ખાતરની જ જરૂર પડે છે અને ખાતરનું કાર્યક્ષમ ઉપયોગ થાય છે.

ખાતર આપવાનો સમય અને અવસ્થા	તત્વોનું જથ્થો (ગ્રામ/છોડ)			ખાતરનું જથ્થો (ગ્રામ/છોડ)		
	નાઈટ્રોજન	ફોસ્ફોરસ	પોટાશ	યુરીયા	એસ.એસ.પી.	મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ
રોપણી એક મહિના પછી	૦૦	૮૦	૦૦	૦૦	૫૬૦	૦૦
રોપણીના ત્રણ મહિના પછી (વાનસ્પતિક વિકાસની અવસ્થા)	૮૬	૦૦	૪૦	૨૧૦	૦૦	૭૦
રોપણીના પાંચ મહિના પછી (પુષ્પ બંધવાની અવસ્થા)	૭૨	૦૦	૫૬	૧૬૦	૦૦	૮૦
રોપણીના સાતમાં મહિના પછી (ફુલ નિકલવાની અવસ્થા)	૭૨	૦૦	૪૦	૧૬૦	૦૦	૭૦
રોપણીના નવમાં મહિના પછી (લુમના વિકાસની અવસ્થા)	૦૦	૦૦	૨૪	૦૦	૦૦	૪૦
કુળ જથ્થો	૨૪૦	૮૦	૧૬૦	૫૩૦	૫૬૦	૨૭૦

કેળની ખેતીમાં જમીનની તથા પાકની તંદુરસ્તી જાળવવા તથા રાસાયણિક ખાતરની ભલામણના ૫૦% નાઈટ્રોજન અને ફોસ્ફોરસની બચત માટે સ્થાનિય એજેટોબેક્ટર (NAUAZN-૧) સીએફયુ-૧૦૮/મિલિ ૧૦ મિલિ/છોડ અને પી.એસ.બી. (NAUPSB-૧ સીએફયુ-૧૦૮/મિલિ (૧૦ મિલિ/છોડ) સાથે ૫૦૦ ગ્રામ છાણિયું ખાતર/છોડ બે હપ્તામાં છાણિયા ખાતર સાથે મિશ્ર કરી વાવેતર સમયે તેમજ ત્રીજા મહિને જમીનમાં આપવું.

સેન્દ્રીય ખેતીની બીજી એક ભલામણ મુજબ રોપણી સમયે છોડ દિઠ ૩ કિ.ગ્રા. બાયોકંપોસ્ટ + ૪ કિ.ગ્રા. વર્મિકમ્પોસ્ટ + ૧ કિ.ગ્રા. દિવેલી બોળ + ૧૦ મી.લી. દરેક એજેટોબેક્ટર, પી.એસ.બી. અને કે.એમ.બી. અને ૧.૫ કિ.ગ્રા. બાયોકંપોસ્ટ + ૨ કિ.ગ્રા. વર્મિકમ્પોસ્ટ + ૫૦૦ ગ્રામ દિવેલી બોળ રોપણીના ૨ અને ૪ માસ બાદ આપવા. ઉપરાંત છોડ દિઠ કેળના થડનો રસ ૮ લી./ છોડ મુજબ રોપણીના એક માસ બાદ દર મહિને ૮ સરખા હપ્તામાં આપવું. લૂમો નીકળી ગયા બાદ ૨ ટકા યુરીયા (૧૦ લીટર પાણીમાં ૨૦૦ ગ્રામ યુરીયા) નો છંટકાવ કરવાથી ફળના કદ અને વજનમાં વધારો થાય છે.

પિયત :

કેળપાકમાં એટલે વર્ષ દરમિયાન કુલ ૩૦૦ મિ.મી. જેટલો પાણી જોઈયે. પાકના વિકાસ દરમિયાન કેળાના પાકને પાણીની જરૂરિયાત કોઠા મુજબ હોય છે.

ક્ર.સ.	પાકના વિકાસની અવસ્થા	સમય (અઠવાડિયા)	પાણીની જરૂરિયાત (લીટર/છોડ)
૧.	કેળાની રોપણી પછી/લામ પાકમાં	૧ થી ૪	છુટ્ટો પાણી
૨.	નાની અવસ્થા	૫ થી ૮	૮ થી ૧૦
૩.	ખાસ વિકાસની અવસ્થા	૧૦ થી ૧૮	૧૨ થી ૧૪
૪.	ફુલ બનવાની અવસ્થા	૨૦ થી ૩૨	૧૬ થી ૨૦
૫.	ફુલ આવવાની અવસ્થા	૩૦ થી ૩૭	૨૦ થી વધારે
૬.	લુમના વિકાસની અવસ્થા	૩૮ થી ૫૦	૨૦ થી વધારે

ટપક પદ્ધતિ દ્વારા પિયત :

શિયાળામાં ૧૨ થી ૧૮ લીટર અને ઉનાળામાં ૨૦ થી ૨૨ લીટર પાણી છોડ દીઠ એકાંતરે દિવસે આપવું. જે માટે કલાક ૪.૦ લીટરની ક્ષમતાવાળા ૨ ડ્રીપર છોડના થડથી બંને બાજુ ૩૦ સે. મી. દુર ગોઠવી ટપક પદ્ધતિ શિયાળામાં ૮૦ થી ૧૩૫ મિનિટ અને ઉનાળામાં ૧૫૦ થી ૧૬૫ મિનિટ ચલાવવી. રાડના આવરણ સાથે ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિથી પિયત આપી ૧.૫ × ૧.૫ મીટરના અંતરે કેળની રોપણી કરવામાં આવે તો પૃષ્ઠ પદ્ધતિ થી ૧.૮ × ૧.૮ મીટરના અંતરે રોપેલ કેળ કરતાં ૩૦ ટકા પાણીની બચત સાથે ૩૦ ટકા નાઈટ્રોજન બચાવી શકાય છે.

કેળમાં આંતરપાક :

સંશોધન આધારે કેળના પાક સાથે હળદર પાક વધારે અનુકુળ માલૂમ પડેલ છે. હળદરનો આંતરપાક તરીકે લેવો હોય તો કેળ અને હળદરની રોપણી મે માસમાં કરવી. આ ઉપરાંત કેળની રોપણી સપ્ટેમ્બર માસમાં કરી સાથે ટુકાગાળાના શાકભાજી પાકો જેવા કે ટામેટી, રીંગણ, કોબીજ અને ફલાવર પણ આંતરપાક તરીકે ઉગાડેલ જે પૈકી કોબીજનું ઉત્પાદન અને આવક વધુ મળેલ છે.

રોપણી પછીની કાળજીઓ :

૧) આંતરખેડ અને માટી ચઢાવવી : દર ત્રણ થી ચાર પિયત પછી ગોડ કરવું ખાસ જરૂરી છે. છોડના ફરતે ૧.૫ ફુટ અને ૧૫-૨૦ સે. મી. ઉંચાઈ સુધી માટી ચઢાવવી.

૨) નિંદામણ નિયંત્રણ : કેળ રોપી પિયત આપી ત્રણ થી ચાર દિવસ બાદ ડાયુરોન ૧ કિ. ગ્રા. ૬૦૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળી હેક્ટર

દીઠ છોડ બચાવી છંટકાવ કરવો. કેળ રોખ્યા પછી ૭૫ દિવસે ૬૦૦ લીટર પાણીમાં ગ્રામોક્ષોન ૩.૬ લીટર હેક્ટરે પ્રથમ છંટકાવ કરવો અને બીજો છંટકાવ પાળા ચઢાવ્યા પછી ૩૦ દિવસે કરવો.

૩) પીલા દૂર કરવા : મુખ્ય થડની બાજુમાંથી નીકળતા પીલા સતત દૂર કરવા ખાસ જરૂરી છે. જે દાતરડાથી કાપીને દુર કરી શકાય છે. કાપેલા પીલાને ફરીથી ઉગતા અટકાવવા માટે ૧ લીટર પાણીમાં ૬૦ ગ્રામ ૨,૪-ડી (ફર્નોક્ઝોનનો ૮૦ ટકા સોડિયમ સોલ્ટ) નું દ્રાવણ બનાવી તેના ફક્ત ૩ થી ૫ ટીપાં કાપેલા પીલાના મધ્યભાગ માં નાંખવાથી પીલા ફરીથી ઉગશે નહિં. ૨,૪-ડી ના વિકલ્પે કેરોસીનનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે.

૪) અન્ય માવજત : કેળના ખેતરની ફરતે પવન અવરોધક વાડ કરવી ખાસ જરૂરી છે. જે માટે ઝડપી વૃદ્ધિ કરતી શેવરી અનુકૂળ છે. કેળના છોડ પરથી નીચેના ભાગના રોગીષ્ટ પાન અવારનવાર કાઢતા રહેવું અને તેને બાળી નાંખવા. કેળની લુમ પૂરેપૂરી નીકળી ગયા પછી નીચેનો લાલ રંગનો ડોડો કાપીને દૂર કરવો તથા કેળાની ટોચે રહેલો કાળો ભાગ દૂર કરવો જેથી ફળોના ફૂગજન્ય રોગો આવતા અટકાવી શકાય છે. લૂમને સૂર્યનો તડકો લાગતો હોય તો તેને કેળના બે પાન નમાવી ઢાંકેલી રાખવી. ચોમાસા દરમ્યાન કેળના બગીચામાં પાણી ન ભરાય રહે તે માટે નિતાર નીક બનાવવી. લુમ નિકળે તે દરમ્યાન કેળના થડને ટેકા આપવા.

૫) કેળમા પાણીની અછત (બૅચ) નિવારણ : કેળના છોડમાં પુષ્પ બંધાવવાની શરૂવાત (રોપણીના ૫ મહિના પછી) ના સમયે એક મહિના સુધી પાણીની અછત (બૅચ) ઉદભવવાની પરિસ્થિતિને નિવારવા માટે એસીટાઈલ સેલીસીલીક એસીડ (૧૮ મી.ગ્રામ/લિટર) નો છંટકાવ કરવાથી કેળના છોડને પાણીની અછત (બૅચ) ની ઓછી અસર થવાથી સંતોષકારક વિકાસ, ઉત્પાદન અને વધુ ચોખ્ખો નફો મેળવી શકાય છે.

૬) આવરણ : જમીનમાં ભેજનું પ્રમાણ જાળવી રાખવા માટે પરાળ, સૂકું ઘાસ, સૂકા પાંદડા, શેરડીની રાડ (પતારી), ઘઉંનું ભૂસુ, સેન્દ્રિય ખાતર તથા ખેતીની વિવિધ આડ પેદાશો અને કાળુ પ્લાસ્ટીક(૫૦ માઈક્રોન) નો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આવરણ જમીનમાં ભેજ અને તાપમાન જાળવી રાખે છે જેથી પિયતનો સમય ગાળો લંબાવી શકાય છે. આવરણ પદ્ધતિથી ૪૦ ટકા જેટલી પાણીની બચત થાય છે, જમીનજન્ય રોગ ઓછા થાય અને ગુણવત્તા સભર ઉત્પાદન મળે છે.

લુમનું સંરક્ષણ :

કેળાની ઉંચી ગુણવત્તા, વધુ ઉત્પાદન અને વધુ વળતર મેળવવા માટે કેળાની લૂમ સંપૂર્ણ ખુલ્લા બાદ તેના પર જીબ્રેલીક એસિડ ૧૦૦ મીલી ગ્રામ પ્રતિ લીટરના દ્રાવણનો છંટકાવ કરી ૧૬ થી ૧૮ માઈક્રોનની ભુરી/ સફેદ પ્લાસ્ટીકની બાંચ (બંને બાજુ ખુલ્લી) ચઢાવવાની ભલામણ કરવામાં આવેલ છે. આ બેગથી વરસાદ, ભારે પવન અને હીમથી ફળોનું નુકસાન થતું અટકે છે અને રોગ જીવાત સામે રક્ષણ મળે છે. પ્લાસ્ટિક બેગ લુમને એક સરખું વાતાવરણ પુરૂ પાડે છે તેથી ફળો જલ્દી મોટા થાય છે. આ બેગની કિંમત આશરે રૂ. ૬ થી ૮ જેટલી થાય છે.

ન્યુટ્રીઅન્ટ પાઉચ : પૂરેપૂરા ફળ બેસી ગયા પછી અને નર ફૂલનો દોળો તોડી નાંખ્યા પછી લુમને નીચેથી પોષણ આપવા માટે ન્યુટ્રીઅન્ટ પાઉચ સાથે બાંધવામાં આવે છે જેથી લુમમાં રહેલ કેળાના ફળનાં વજનમાં વધારો થાય. આ માટે ૮ થી ૧૦ સે.મી. જેટલો લુમનો નીચનો ભાગ ન્યુટ્રીઅન્ટ પાઉચમાં ડુબેલો રહે તે રીતે મજબૂત દોરી સાથે બાંધવાનો હોય છે. ન્યુટ્રીઅન્ટ પાઉચ બનાવવા માટે તાજુ ગાયનું છાણ ૩૦૦ ગ્રામ, એમોનિયમ સલ્ફેટ ૨૦ ગ્રામ અને પોટેશિયમ સલ્ફેટ ૧૦ ગ્રામ પ્રતિ પાઉચ લેવો. યા ન્યુટ્રીઅન્ટ પાઉચ બનાવવા માટે યા ત્રણ મુજબની વસ્તુઓ ૧૦૦ મી.લી. પાણીમાં મીક્ષ કરીને બનાવવી. આ સ્લરીને ૨૦૦ ગેઈજ વાળી પ્લાસ્ટીકની કોથળી જેની સાઈઝ ૧૫ સેમી × ૨૫ સેમી હોય તેમાં ભરવી અને લુમ પર બાંધવી.

રોગ અને તેનું નિરાકરણ :

૧) અપરિપકવ કેળાનું પાકી જવું : આ રોગથી કેળના પાન પીળા પડી જાય છે. પાન ઉપર પીળા રંગની કિનારીવાળા લાલ ડાઘ પડે છે. પાનનાં ટપકાનાં રોગની તિવ્રતા વધવાથી કેળા વહેલા પાકી જાય છે. કેળા કસમયના વહેલા પાકી પોચા પડી જાય છે તથા ગુણવત્તા ઘટે છે.

નિયંત્રણ : પાનના ટપકાનાં રોગવાળા પાન અવારનવાર કાપી બાળીને નાશ કરવો. પાનનો ટપકાનો રોગ અટકાવવા માટે મેન્કોઝેબ ૨૦ ગ્રામ અથવા પ્રોપીકોનાઝોલ ૧૦ મિ. લી./૧૦ લીટર પાણીમાં દ્રાવણ બનાવી સાથે સ્ટીકર નો ઉપયોગ કરી છંટકાવ કરવો.

૨) બન્યી ટોપ : વિષાણુજન્ય આ રોગમાં પાન નાના અને સાંકડા બને છે તથા જથ્થામાં નીકળતા જોવા મળે છે. લુમો નાની આવે છે.

નિયંત્રણ : રોગવાળા છોડ ઉપાડીને નાશ કરવો. આ રોગ ફેલાતો અટકાવવા માટે શરૂઆતમાં જંતુનાશક દવા ડાયમીથોયેટ ૦.૦૩% ૧૦ મિ. લી./૧૦ લીટર પાણીમાં દ્રાવણ બનાવી છંટકાવ કરી મોલોમશીનું નિયંત્રણ કરવું.

૩) સીગાટોકા : આ કેળના પાન પર ટપકાનો રોગ છે જેમાં પાન ઉપર ત્રાકીયા ટપકા પડે છે અને પાન સુકાય જાય અને લાલ જાંબલી રંગના ડાઘ પડે છે. રોગની તિવ્રતા વધવાથી કેળા વહેલા (કાચા) પરિપકવ થાય અને ગુણવત્તા ઘટે છે.

નિયંત્રણ : રોગ ફેલાતો અટકાવવા પાન કાપી નાંખવા અને મેન્કોઝેબ (૨૦ ગ્રામ/૧૦ લી. પાણી) અથવા પાયરાકલોસ્ટ્રોબિન (૧૫ ગ્રામ/૧૦ લી. પાણી) સાથે સ્ટીકરનો ઉપયોગ કરી છંટકાવ કરવો.

નોંધ:- સામાન્ય રીતે રોગો નિયંત્રણ માટે વપરાતી દવાનો છંટકાવ તજજ્ઞની સલાહ લઈ કરવો.

જીવાત અને તેનું નિરાકરણ :

૧) કેળના થડનું ચાંચવું : નુકશાનની શરૂઆત પાકની ૬ થી ૮ મહિનાની અવસ્થાએ થાય છે. પર્ણદંડ ઉપર કાણાં જોવા મળે જેમાંથી જેલી જેવું ચીકણું પ્રવાહી નીકળતું જોવા મળે. જે આ જીવાતની હાજરી સુચવે છે. ઉપદ્રવ વધતા થડમાં અસંખ્ય કાણાં જોવા મળે અને થડમાં ગેલેરી જોવા મળે છે થડ નબળું પડી ભાંગી પડે છે. આ કીડો સતત થડની અંદર કોરાણ કરી પેશીઓ ખાય છે. તે થડની અંદર પેશીઓ ભેગી કરી કોશેટા અવસ્થામાં જાય છે. લૂમોમાં ફળોની સાઈઝ નાની થઈ જાય. ઉપદ્રવિત છોડ અંદરથી નબળો થતા સામાન્ય પવનમાં ઢળી પડે છે. આ કીડાનો ઉપદ્રવ જુન થી નવેમ્બર મહીનામાં જોવા મળે છે. આમ આ જીવાતનું નુકસાન પાકની

પાછલી અવસ્થાએ થતું હોવાથી ઉત્પાદન ઉપર ગંભીર અસર થાય છે.

નિયંત્રણ: રોપવા માટે તંદુરસ્ત ગાંઠો પસંદ કરવી. દર મહિને બાજુમાં નીકળતા પીલાને કાપી નાંખવા. કેળના થડમાંથી ૧૦ સે.મી. જાડા ગોળ ચક્રાં કાપીને પુખ્ત કીટકોને આર્ષકવા માટેના હેક્ટરે ૧૦ ટ્રેપ મુકવા. ટ્રેપમાં ભરાઈ ગયેલા કીટકોનો નાશ કરવો. લૂમ ઉતાર્યા બાદ શેષ ભાગનો વ્યવસ્થિત નિકાલ કરવો.

૨) ગાંઠના ઢાલવાળા ચાંચવું : આ જીવાતની માદા થડમાં ગાંઠની બાજુમાં ઈડા મુકે છે. ઈડામાંથી નીકળેલી ઈયળ કેળની ગાંઠોમા કોરાણ કરી ખાય છે. પુર્ણ વિકસિત ઈયળ ગાંઠોમા કોરાણ કરી બોગદા જેવું બનાવી ગાંઠની અંદરનો ભાગ કોરી ત્યાં જ કોશેટોમાં રૂપાંતર પામે છે. જ્યારે પુખ્ત કીટક કોરેલ બોગદામા ભરાય રહે છે. ઉપદ્રવિત છોડના પાન ફીકકા પીળાં રંગના થઈ સહેલાઈથી ખેંચાઈ આવે તેવા બની જાય છે. આ ઉપદ્રવ જો પાછલી અવસ્થાએ થાય તો છોડના પાનની સંખ્યામાં ઘટાડો થઈ લૂમ નાની રહે છે અને ફળોની સંખ્યા ઓછી થઈ જાય છે.

નિયંત્રણ: પાક પૂરો થયેથી જમીનની ઊંડી ખેડ કરાવી. કેળની વાડીની ચોખ્ખાઈ રાખવી તથા ઉપદ્રવિત ગાંઠોનો વાવેતર માટે ઉપયોગ કરવો નહિ. કેળના નકામા ભાગોનો નાશ કરવો. રોપવા માટેની ગાંઠોને આશરે ૫૫° સે.ગ્રે. ગરમ પાણીમાં ૫ થી ૧૦ મિનિટ રાખીને રોપવું. કાર્બોફ્યુરાન ૩ જી ૧૦ ગ્રામ/ગાંઠ મુજબ જમીનમાં આપવું.

૩) લાલ રસ્ટી શિપ્સ : આ કેળના ફળ ઉપર લાલ રંગના ડાઘા પડે છે. પાન પીળા પડે છે. કેળા લાલ રંગના થઈ જાય છે જેથી ગુણવત્તા અને બજાર કિંમત ઘટે છે.

૪) મોલોમશી : આ જીવાત ખાસ કરીને કેળની આજુબાજુના પીલા ઉપર મોટી સંખ્યામાં જોવા મળે છે. મશી પાન અને છોડ ઉપરથી રસ ચૂસે છે જેનાથી વૃદ્ધિ અટકે છે. આ જીવાત ખાસ તો વિષાણુજન્ય રોગ “બંચી ટોપ” નો વાહક છે.

નિયંત્રણ: રોગગ્રસ્ત આખા છોડ ઉખેડી અને નાશ કરવો. મોલોમશીના ઉપદ્રવને અટકાવવા માટે શરૂઆતમાં જંતુનાશક દવા ડાયમીથોએટ ૦.૦૩ % ૧૦ મિ. લી./૧૦ લીટર પાણીમાં દ્રાવણ બનાવી છંટકાવ કરી નિયંત્રણ કરવું.

૫) કેળના પાન ખાનારી ઈયળ : આ એક બહુભોજી જીવાત છે. આ જીવાતના ઈડા જથ્થામાં પાનની નીચેની બાજુએ મુકાયેલા હોય છે. જેમાંથી નીકળેલી નાની ઈયળો સમુદમાં પાનના હરિતદ્રવ્ય ખાય છે જેથી પાન પર પાતળા જાળા બની જાય છે.

નિયંત્રણ: ઈડા તથા નાની ઈયળના સમૂહ તથા નુકશાન પામેલ પાનનો નાશ કરવો.

૬) ઘોડિયા ઈયળ : સામાન્ય રીતે ૨ થી ૪ માસના કેળના તલવાર પીલાને નુકશાન કરે છે. ગોળ પીલાને એક બાજુથી કાપીને ખાય છે. પાન ખુલે ત્યારે સમાંતર કાણાં જોવા મળે છે. વધુ ઉપદ્રવ સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર માસમાં જોવા મળે છે.

૭) પાન કથીરી : કેળના પાકમાં છોડની પાછલી અવસ્થાએ પાક પાનની નીચેની બાજુએ પાન કથીરીના બચ્ચાં અને પુખ્ત પાનમાંથી રસ ચૂસીને નુકસાન કરે છે. જેથી પાનની નીચેની બાજુએ સમાંતર પીળા પટ્ટા પડેલા જોવા મળે છે.

૮) કૃમિ : છોડના મૂળમાં રહી કૃમિ પાકને ઘણું નુકશાન કરે છે. મૂળ કાળા પડી જાય છે. તિરાડ પડે છે અને સડો પેદા કરે છે.

નિયંત્રણ: છોડ દીઠ ૧૦ ગ્રામ કાર્બોફ્યુરાન ૩ જી રોપણી વખતે અને રોપ્યા પછી ચોથા માસે આપવાથી નિયંત્રણ થાય છે.

નોંધ : સામાન્ય રીતે જીવાતો નિયંત્રણ માટે વપરાતી દવાનો છંટકાવ તજજ્ઞની સલાહ લઈ કરવો.

કાપણી :

સામાન્ય રીતે ૧૧ થી ૧૨ મહિના પછી કેળના ઉપરની ધાર ગોળ થઈ જાય અને રંગ ઘેરા લીલા માંથી આછો લીલો થાય ત્યારે લુમની કાપણી કરવી.

આશરે હેક્ટર દીઠ ઉત્પાદન :

આધુનિક ખેતી પદ્ધતિ અપનાવવાથી અંદાજે ૭૦ થી ૧૦૦ ટન/ હે. ઉત્પાદન મેળવી શકાય. કેળની ખેતીમાં ટીસ્યુના રોપા, ટપક, ફર્ટીગેશન તથા આવરણ એકજ પેકેજમાં અપનાવવાથી ૨૦ થી ૪૦ ટકા ખાતરની બચત, ૩૦ થી ૪૦ ટકા પાણીની બચત, ૨૫ થી ૪૦ ટકા ઉત્પાદનમાં વધારો તથા ૪૦ દિવસ ઉત્પાદન વહેલું મળેલ છે. કેળનું ઉત્પાદન ૮૦ થી ૧૧૦ ટન પ્રતિ હેક્ટર જમીનના પ્રકાર પ્રમાણે મળી શકે છે.

કેળ પાકમાં મુલ્ય વૃદ્ધિ :

કાચા કેળામાંથી વેફર્સ અને ફ્લોર બનાવી શકાય. કેળાનો ફ્લોર બિસ્કિટ, કેક, પાપડ, બેબી ફુડ તેમજ હેલ્થ ડ્રીંકમાં વાપરી શકાય છે. પાકા કેળામાંથી ફીંગ, રેડી ટુ સર્વ, જામ, કેચઅપ, ચીઝ, પુરી તેમજ બાર બનાવી શકાય છે. લુમ ઉતાર્યા પછી કેળના થડમાંથી છુટા પડાયેલા રેસામાંથી હાથ વણાટથી તૈયાર થતી સુશોભનની વસ્તુઓ, ઘાગા, કાપડ, કાગળ, દોરડા, ઔષધિય માર્ફકો ક્રીસ્ટલાઈન સેલ્યુલોઝ બનાવી શકાય છે. નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારી ખાતે કેળના થડમાંથી રેસા (નોન વુવન/વુવન ફેબ્રિક્સ), સારી ગુણવત્તાવાળા પેપર, પ્રવાહી સેન્ડિચ ખાતર, વર્મી કમ્પોસ્ટ, કેન્ડી, અથાણાં અને પીણાઓ વગેરે ચીજ વસ્તુઓ તૈયાર કરવામાં આવે છે.

ચીકુની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ

પ્રસ્તાવના :

ચીકુ ભારતમાં કેરી, કેળા, લીંબુ, સફરજન અને જમરૂખ પછી છઠ્ઠા ક્રમનું સ્થાન ધરાવે છે. ભારતમાં તેની ખેતી ખાવાના ફળ માટે થાય છે. જ્યારે દક્ષિણ અમેરિકામાં ચ્યુઈંગમ બનાવવાના પાયાના પદાર્થ તરીકે ચીકલ (ગુડ્ડા પચ્યા) મેળવવા માટે થાય છે. આપણા ગુજરાત રાજ્યમાં દક્ષિણ ગુજરાતના વલસાડ, નવસારી, સુરત, તાપી, ભરૂચ અને નર્મદા તેમજ જુનાગઢ જિલ્લામાં ચીકુની ખેતી થાય છે. ગુજરાતમાં આશરે ૨૬ હજાર હેક્ટરમાં ચીકુની ખેતી થાય છે અને તેમાંથી પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ મેટ્રિક ટનની ઉત્પાદકતા સાથે આશરે ૨.૫૭ મેટ્રિક ટનનું વાર્ષિક ઉત્પાદન થાય છે. ચીકુ ખાવામાં ખુબજ મીઠાં, માવો પોચો અને કણીદાર હોય છે. પાકા

ચીકુમાંથી સુકવણીથી ચીપ્સ, ચીકુ હલવો, ચીકુ મુરબ્બો, ચીકુ જયુસ, સ્કવોશ, સિરપ, જામ, ટ્રોફી, કેન્ડી અને મિલ્ક શેક બનાવી શકાય છે.

જાતો :

ગુજરાત રાજ્યમાં મુખ્યત્વે કાલીપત્તી જાતનું વાવેતર જોવા મળે છે. શિયાળામાં વધુ ફળો ઉતરે છે. ફળ સ્વાદે મીઠા અને ટકાઉ શક્તિ ધણી જ સારી છે. ચીકુની મુરબ્બા, ક્રિકેટબોલ, ભૂરીપત્તી, પીળીપત્તી, જેવી જાતોનું છુટ્ટવાયું વાવેતર જોવા મળે છે. ગુજરાતમાં ખાસ કરીને વલસાડ અને નવસારી જિલ્લામાં ચીકુનો સવથી વધારે વાવેતર થાય છે અને તેમાં પણ કાલીપત્તી જાતનું પ્રમાણ સવથી વધારે છે. કાલીપત્તીજાતના પાન ઘેરા લીલા રંગના, પોહળા અને જાડા હોય છે. ફળ લંબગોળ અથવા ગોળ આકારના, મીઠા અને સુંગધી માવો ધરાવે છે. ફળનું સરેરાશ વજન ૮૦ ગ્રામ જેટલો હોય છે.

હવામાન અને જમીન :

દરિયા કિનારાનું ગરમ અને ભેજવાળું હવામાન ખૂબજ માફક આવે છે. ૧૮° થી ૩૫° સે.ગ્રે. ઉષ્ણતામાન ખૂબજ અનુકૂળ રહે છે. ૧૦° સે. ગ્રે. થી નીચા તાપમાને ચીકુના ઝાડનો વિકાસ અટકે છે તેમજ ફળો નાના રહે છે અને મોડા પરિપક્વ થાય છે. ૪૦ સે. ગ્રે. તાપમાને ચીકુના ફૂલ તથા નાના ફળ ખરી પડે છે. ચીકુને સારા નિતારવાળી, ઉડી, ગોરાડુ, બેસર કે મધ્યમ કાળી જમીન વધુ અનુકૂળ છે.

સંવર્ધન :

ચીકુનું સંવર્ધન બીજ, ગુટી, ભેટકલમ અને નૂતન કલમ પદ્ધતિથી કરી શકાય છે. અભ્યાસના પરિણામો પરથી ચીકુની કલમ રાયણના મુલકાંડ ઉપર કરવાની ભલામણ કરવામાં આવેલ છે. આ ઉપરાંત મહુડા, બાવા બદામ અને મીટ્રી નો પણ મુલકાંડ તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય છે.

રોપણી :

ચીકુનીરોપણી ૧૦ × ૧૦ મીટરના અંતરે કરવાની ભલામણ છે. ચીકુની કાલીપત્તી જાત ઉપર લેવામાં આવેલ વાવેતર અંતરના અખતરના પરિણામો દર્શાવે છે કે શરૂઆતના ૧૩ વર્ષ સુધી એકમ વિસ્તારમાંથી વધુ ઉત્પાદન મેળવવા માટે ઝાડની રોપણી ૫ × ૫ મીટરના અંતરે કરવાથી વધુ ઉત્પાદન મળે છે.

ચીકુની રોપણી કરવા માટે ઉનાળામાં ભલામણ કરેલ અંતરે ૧×૧×૧ મીટરના ખાડા કરવા. ખાડાઓને ૧૫ દિવસ તપવા દેવા, ત્યાર બાદ ખાડા દીઠ ૨૦-૨૫ કિ.ગ્રા. છાણિયું ખાતર માટી સાથે મિશ્ર કરી ખાડા પૂરી દેવા અને ખાડાની વચ્ચેવચ નિશાની કરી રાખવી. ચોમાસામાં સારો વરસાદ થયા બાદ પસંદ કરેલી કલમો નિશાની કરેલ જગ્યાએ રોપવી. સામાન્યરીતે ચીકુની રોપણી જૂન થી ડિસેમ્બર મહિના સુધી કરી શકાય છે.

ખાતર :

પ્રથમ વર્ષે વાવેતર કરેલ ચીકુના ઝાડ દીઠ ૧૦ કિ.ગ્રા. છાણિયું ખાતર જૂન માસમાં અને પૂર્તિ ખાતર તરીકે ૧૦૦ ગ્રામ નાઈટ્રોજન (૨૧૬ ગ્રામ યુરિયા), ૫૦ ગ્રામ ફોસ્ફરસ (૩૦૦ ગ્રામ એસ.એસ.પી.) અને ૫૦ ગ્રામ પોટાશ (૮૦ ગ્રામ મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ) ત્રણ સરખા હપ્તામાં જૂન, ઓક્ટોબર અને ફેબ્રુઆરીમાસમાં આપવું. ત્યારબાદ દર વર્ષે ઉપરોક્ત જથ્થો ઉમેરીને નવ વર્ષ સુધી આપવો.

ચીકુની કાલીપત્તી જાતના પુખ્ત વયના ઝાડોની વાડી ધરાવતા ખેડૂતોને નવી ભલામણ કરવામાં આવે છે કે ચીકુના ઝાડનાં ફરતે થયેલી ૧ થી ૧.૫ મીટર ની પોહળી અને ૧૫ સેમી. ઉંડાઈ ની રીંગ બનાવવી અને તેમાં રાસાયણિક ખાતરો ૧૦૦૦-૫૦૦-૫૦૦ ગ્રામ ના.ફો.પો. / ઝાડ બે સરખા હપ્તામાં જૂન અને ઓક્ટોબર માસમાં આપવાને બદલે ત્રણ હપ્તામાં ૨૫ ટકા (૨૫૦-૧૨૫-૧૨૫ ગ્રામ ના.ફો.પો./ઝાડ) સાથે ૧૦૦ કિ.લો./ઝાડ દીઠ છાણિયું ખાતર જૂન માસમાં, ફરીથી ૨૫ ટકા (૨૫૦-૧૨૫-૧૨૫ ગ્રામ ના.ફો.પો./ઝાડ) ઓક્ટોબર માસમાં અને ૫૦ ટકા (૫૦૦-૨૫૦-૨૫૦ ગ્રામ ના.ફો.પો./ઝાડ) ફેબ્રુઆરી માસમાં આપવાથી શિયાળાની ઋતુમાં ઉનાળાની ઋતુની સરખામણીમાં વધુ ઉત્પાદન સહીત વધ નફો મળે છે.

આપવાનો સમય	તત્વના આપવાના (ટકા)			ખાતરનું જથ્થો (કિ.ગ્રા./છોડ)		
	નાઈટ્રોજન	ફોસ્ફરસ	પોટાશ	યુરિયા	એસ. એસ. પી.	મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ
જૂન	૨૫	૨૫	૨૫	૦.૫૦૦	૦.૭૫૦	૦.૨૫૦
ઓક્ટોબર	૨૫	૨૫	૨૫	૦.૫૦૦	૦.૭૫૦	૦.૨૫૦
ફેબ્રુઆરી	૫૦	૫૦	૫૦	૧.૦૦	૧.૫૦૦	૦.૫૦૦
				૨.૦૦	૩.૦૦	૧.૦૦

ચીકુની કાલીપત્તી જાતના પુખ્ત વયના ઝાડને રાસાયણિક ખાતરની ભલામણના ૮૦ ટકા (૮૦૦ : ૪૦૦ : ૪૦૦ ગ્રામ એન. પી. કે. પ્રતિ ઝાડ) ચાર હપ્તામાં જુલાઈ, સપ્ટેમ્બર, નવેમ્બર અને ફેબ્રુઆરી માસમાં નીચેની ટેબલ મુજબ અને ૧૫ કિલો વમી કાંપોસ્ટ સાથે જૈવિક ખાતર એજોટોબેક્ટર અને પી.એસ.બી. ૧૦૦ મી.લી. પ્રતિ ઝાડ જુલાઈ માસમાં અને ગ્રેડ-૪ મલ્ટીસૂક્ષ્મ પોષક તત્વોનો ૦.૫ ટકાનો છાંટકાવ ઓક્ટોબર માસમાં કરવાથી શિયાળુ ઋતુમાં ઉત્પાદન મળે છે અને આવકમાં વધારો થાય છે.

રાસાયણિક ખાતરની ભલામણનો ૮૦% જથ્થો				
ખાતર આપવાનો સમય અને અવસ્થા	નવી કુપણ નિકળે ત્યારે (જુલાઈ)	ફળ બેસે ત્યારે (સપ્ટેમ્બર)	ફળનો વિકાસ થાય ત્યારે (નવેમ્બર)	નવા ફૂલ આવે અને ફળનો વિકાસ થાય ત્યારે (ફેબ્રુઆરી)
એન.પી.કે. (ટકકા)	૩૨ : ૪૦ : ૨૦	૧૬ : ૦૦ : ૨૦	૧૬ : ૪૦ : ૨૦	૧૬ : ૦૦ : ૨૦
એન.પી.કે. (ગ્રામ/ઝાડ)	૩૨૦ : ૨૦૦ : ૧૦૦	૧૬૦ : ૦૦ : ૧૦૦	૧૬૦ : ૨૦૦ : ૧૦૦	૧૬૦ : ૦૦ : ૧૦૦
યુરીયા (ગ્રામ/ઝાડ)	૭૦૦	૩૫૦	૩૫૦	૩૫૦
સિંગલ સુપરફોસ્ફેટ (ગ્રામ/ઝાડ)	૧૨૫૦	૦૦	૧૨૫૦	૦૦
મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ (ગ્રામ/ઝાડ)	૧૭૦	૧૭૦	૧૭૦	૧૭૦

બિનપિયત વિસ્તારમાં ઝાડ દીઠ ૧૫૦૦ ગ્રામ નાઈટ્રોજન (૩ કિ.ગ્રા. યુરિયા) વરસાદ શરૂ થાય કે તૂર્તજ આપવો. ફોસ્ફરસ અને પોટાશ યુક્ત ખાતરો જમીનના પૃથક્કરણના આધારે જરૂરિયાત મુજબ આપવા. ચીકુના સેન્દ્રીય ખેતી માટે પુખ્તવયના ઝાડને ૨૦૦ કિ.ગ્રા. છાણિયું ખાતર + ૫૦ કિ.ગ્રા. વર્મિકમ્પોસ્ટ આપી શકાય.

પિયત :

ચીકુના પુખ્ત ઉમરના ઝાડને શિયાળામાં ૩૦ દિવસે અને ઉનાળામાં ૧૫ દિવસના અંતરે પિયત આપવાની ભલામણ કરવામાં આવેલ છે. ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિમાં શરૂઆતના બે વર્ષ સુધી થડથી ૫૦ સે. મી. દુર પ્રતિ કલાકના ૪ લીટરની નિષ્કાષ ક્ષમતાવાળા ૨ ડ્રીપર અને બે થી પાંચ વર્ષ સુધી ૪ ડ્રીપર થડથી ૧ મીટર દૂર ગોઠવી શિયાળામાં ૪ કલાક અને ઉનાળામાં ૭ કલાક સુધી આંતરે દિવસે ચલાવવી. જ્યારે ૮ થી ૧૨ વર્ષના ઝાડ માટે નળીઓ થડથી એક મીટર દૂર ગોઠવી પ્રતિ કલાકના ૮ લીટરની નિષ્કાષ ક્ષમતાવાળા ૮ ડ્રીપર એકબીજાથી ૪૦ સે. મી. દુર ગોઠવી શિયાળામાં ૨ કલાક અને ઉનાળામાં ૩ કલાક આંતરે દિવસે ચલાવવી.

પાછલી માવજત :

પુખ્ત વયના ઝાડમાં રોગિષ્ઠ, ચપટી, પાકટ અને જમીન સાથે અડી ગયેલ ડાળીઓની છાંટણી કરવી તેમજ વાંદા જેવી પરોપજીવી વનસ્પતિની વૃદ્ધિ ડાળીઓ ઉપર જોવા મળે તો તે કાપી નાંખવી. ફળવધારે બેસે તે માટે વૃદ્ધિ નિયંત્રકો જેવા કે એન.એ.એ. ૫૦ પી.પી.એમ. (૧ લીટર પાણીમાં ૫૦ મિ.ગ્રા. પાઉડર) નું પ્રવાહી ફૂલ આવવાના સમયે ૧૫ દિવસના અંતરે ત્રણ વખત છાંટવાથી ૩૦ ટકા જેટલું ફળન વધુ જોવા મળે છે.

આંતરપાક :

૧૦ × ૧૦ મીટરના અંતરે રોપણી કરેલ ચીકુના ખેતરમાં ૧૦ વર્ષ સુધી અને ૫ × ૫ મીટરે રોપણી કરેલ ખેતરમાં ૫ વર્ષ સુધી શાકભાજીના પાકો જેવા કે રીંગણ, મરચી, ટામેટી, સુરણ, રતાળુ, શકકરિયા, આદુ વિગેરે તથા ફળપાકો જેવાકે કેળ અને પપૈયા આંતરપાકો તરીકે લઈ વધારાની પૂરક આવક મેળવી શકાય છે.

ફળધારણ અને ફળવિકાસ :

સપ્ટેમ્બર માસ દરમ્યાન નરી આંખે જોઈ શકાય તેવી કળીથી શરૂઆત કરી તોડવા લાયક પરિપક્વ ફળો તૈયાર થવા ૩૩૪ દિવસ જેટલો સમય લાગે છે, જેમાં ૧૫ ટકા જેટલો જ ફલન છે. એ સમય દરમ્યાન તૈયાર થયેલા ફળોનો આકાર લંબગોળ જોવા મળેલ છે. આ ફળો જુલાઈ ઓગસ્ટ માસમાં જોવા મળે છે.

ફરીથી ઉપર મુજબનો અભ્યાસ માર્ચથી શરૂ કરતા બીજા વર્ષે ૩૦૦ દિવસ બાદ જાન્યુઆરી માસમાં ફળો તૈયાર થાય છે. જેમાં ૧૦ ટકા જેટલા ફળો બેસે છે. એ સમયગાળા દરમ્યાન તૈયાર થયેલ ફળોનો આકાર ગોળ જોવા મળેલ છે. આ ફળો જાન્યુઆરી – ફેબ્રુઆરી માસમાં જોવા મળે છે.

ચીકુના પાકમાં વૃદ્ધિ નિયંત્રકોની અસર :

ચીકુના પુખ્ત વયના ઝાડ ઉપર સી સી સી ૧૦૦ મિલી ગ્રામ/લિટર (૧૦ ગ્રામ/૧૦૦ લીટર પાણીમાં) નો એપ્રિલ માસમાં અને જીબ્રેલીક એસીડ ૫૦ મિલી ગ્રામ/લિટર (૧૦ ગ્રામ/ ૧૦૦ લીટર પાણીમાં) નો સપ્ટેમ્બર અને નવેમ્બર માસમાં છંટકાવ કરવાથી ચીકુના ફળનું ઉત્પાદન અને ગુણવત્તા સારી થાય છે.

ચીકુની ૪૦ વર્ષથી વધુ ઉમરના કાલીપત્તી જાતના વાડી ધરાવતા ખેડૂતોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે ઝાડના ટોચના ૧ મીટર ભાગને એક વખત ડિસેમ્બર મહિના દરમ્યાન કાપીને દૂર કરવામાં આવે તો ક્રમશઃ ઉત્પાદન અને ચોખ્ખી આવકમાં વધારો થાય છે.

પાક સંરક્ષણ :

જીવાતો :

૧) ચીકુની કળી કોરનાર ઈયળ : આ જીવાત ની ઈયળ રતાશ પડતી ઘેરા બદામી રંગના માથાવાળી ચીકુની કળી તથા ફૂલમાં કાણાં પાડી અંદરનો ગર્ભ કોરી ખાય છે પરિણામે ફળો બેસતાં નથી. નુકસાનવાળી કળીની ઉપર ફુદા તથા ઈયળની હગાર જોવા મળે છે. નવી પીલવણી વખતે કુમળા પાનને બાઈને પણ નુકશાન કરે છે. આ જીવાતનો ઉપદ્રવ આખા વર્ષ દરમ્યાન જોવા મળે છે. પરંતુ માર્ચ થી જૂન મહિના દરમ્યાન નુકશાન વધતું જાય છે.

નિયંત્રણ: કાળી તુલસીના પાનના રસ સાથેની ઝેરી પ્રલોભીકા નર આકર્ષક માં રાખી ઉપયોગ કરવાથી આ જીવાતના ઉપદ્રવને ઓછો કરી શકાય છે.

૨) ચીકુ મોથ : આ જીવાતની ઈયળ ઝાંખા લીલા અથવા બદામી રંગની હોય છે. સામાન્ય રીતે પાનનાં ઝૂમખાં બનાવી તેમાં ભરાઈને પાનનું હરિત દ્રવ્ય ખાઈને નુકશાન કરે છે. ખાસ કરીને કળી તથા ફૂલોને નીચેથી કાણું પાડી કોરી ખાઈને વધુ નુકસાન કરે છે. નાના ફળોમાં ડીટા આગળ કાણું પાડીને પણ નુકસાન કરે છે. આ જીવાતનો ઉપદ્રવ આખું વર્ષ જોવા મળે છે. મે-જૂન તથા ઓક્ટોબર-નવેમ્બર મહિનામાં ઉપદ્રવ વધુ જોવા મળે છે.

નિયંત્રણ: ઉપદ્રવિત પાનના ઝૂમખા ઈયળ સહિત તોડીને નાશ કરવો.

૩) ફળમાખી : ફળમાખી રંગે બદામી અને રંગીન ડાઘા ધરાવતી પારદર્શક પાંખોવાળી હોય છે. માદા ફળમાખી પરિપક્વ થવા આવેલાં ફળોમાં પોતાનું અંડનિષ્કેપક દાખલ કરી ફળમાં ઈંડા મૂકે છે. ઈંડામાંથી નીકળેલા કીડા ફળની અંદરનો ગર્ભ ખાઈને નુકશાન કરે છે. એપ્રિલ થી જૂલાઈ માસ દરમિયાન ઉપદ્રવ વધુ જોવા મળે છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં આંબા અને ચીકુના ભેગું વાવેતર થતું હોવાથી કેરીમાં નુકશાન કર્યા પછી ચીકુમાં નુકશાન કરે છે.

નિયંત્રણ: વાડીમાં સ્વચ્છતા રાખવી અને સડેલાં ફળો ખાડામાં દાટી મિથાઈલ પેરાથિયોન પાઉડરનાંખવો. નોરોજી મિથાઈલ યુજીનોલ યુક્ત ટ્રેપ દર ૧૦ ઝાડ દીઠ એક પ્રમાણે અથવા હેક્ટરે ૧૦ ટ્રેપ મૂકવાથી નર ફળમાખીને આકર્ષીને વસ્તી વધતી અટકાવી શકાય છે. સામૂહિક રીતે આ ટ્રેપો મૂકવાથી અસરકારક નિયંત્રણ થઈ શકે છે. આ ટ્રેપ જમીનથી ચાર ફુટ ઉંચાઈએ મૂકવા અને દર ત્રણ મહિને બ્લોક બદલવા.

૪) બીજ કોરી ખાનારી ઈયળ : આ જીવાતની ઈંડામાંથી નીકળેલી ઈયળ ફળની અંદર કાણું પાડી મીજ સઘી પહોંચી જાય છે અને મધ્યમથી મોટા કદના ફળોનાં બીજનો અંદરનો ભાગ ખાય છે. ઈયળ અવસ્થા પુરી થતાં ફળમાં કાણું પાડી બહાર આવી પાન પર કોશેટો બનાવે છે. ફળ પરનાં આવા કાણાંમાંથી ફૂગ તથા અન્ય જીવાતો ફળમાં દાખલ થઈ નુકશાન કરે છે. ઓક્ટોબર થી ડીસેમ્બર દરમિયાન ઉપદ્રવ વધુ જોવા મળે છે.

૫) ચીકુનું પાનકોરિયું ઈયળ : ઈંડામાંથી નીકળેલી ઈયળ કૂમળા પાનના બે પડ વચ્ચે દાખલ થઈ અંદરની પેશીઓ ખાઈ પાન પર સર્પાકાર પારદર્શક રેખાઓ ઉપસાવે છે. આ ઉપરાંત ઈયળ પાનના ડીટા તરફથી ઘાર વાળી તેમાં ભરાઈને પાનના હરીતદ્રવ્ય ખાઈને નુકશાન કરે છે. કોશેટો વાળેલ પાનની ધારની અંદર બનાવે છે. આ જીવાતો નવી પીલવણી ને વધતાં ઓછા પ્રમાણમાં નુકશાન કરતી હોય છે. આ જીવાતનો ઉપદ્રવ ખાસ કરીને સપ્ટેમ્બર થી ડીસેમ્બર દરમિયાન વધુ જોવા મળે છે.

નિયંત્રણ: નાની ઈયળના સમૂહ તથા નુકશાન પામેલ પાનનો નાશ કરવો.

૬) ચીકુના પાન વાળનારી ઈયળ : નાની ઈયળ શરૂઆતમાં કૂમળાં પાનને મધ્યનસથી કોતરી ખાય છે. બીજી અવસ્થા પછી ઈયળ પાનને મધ્યનસથી વાળી દઈ બે ધારો વચ્ચે જાળુ બનાવે છે. ઈયળ આવા વાળેલા પાનમાં જ રહીને પાનના હરીતદ્રવ્ય ખાઈને નુકશાન કરે છે.

૭) ચીકુ ફળની કથીરી : કથીરીખુબ જ નાની હોય છે જે લખોટા જેવા ફળોથી મોટા ફળોને નુકસાન કરે છે. આ કથીરીફળો પર ઘસરકા પાડી તેમાંથી નીકળતો રસ ખાય છે. પરિણામે ફળો ખરબચડા અને કાળા રંગના થઈ જાય છે અને ફળોની ગુણવત્તા ઘટે છે.

નોંધ:- સામાન્ય રીતે જીવાતો નિયંત્રણ માટે વપરાતી દવાનો છંટકાવ તજજ્ઞની સલાહ લઈ કરવો.

રોગો :

૧) સુકારો: આ રોગ ફૂગથી થાય છે. શરૂઆતમાં ઝાડ ઝાંખા પીળા અને ફીકકા થઈ ધીમે ધીમે સુકાવા લાગે છે. પાન તોડતા દુધ ન નીકળે. રોગવાળી ડાળી તોડતા વચ્ચે બદામી રંગની લીટી જોવા મળે છે. ખાસ કરીને વરસાદ બંધ થયા પછી સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર માસમાં છૂટાછવાયાં ઝાડોને અસર જોવા મળે છે. સમય જતાં આખું ઝાડ સુકાઈને મરી જાય છે.

નિયંત્રણ: વાડીમાં પાણી ભરાવા ન દેવું. પાણીનો યોગ્ય નિકાલની વ્યવસ્થા કરવી.

નોંધ:- સામાન્ય રીતે રોગો નિયંત્રણ માટે વપરાતી દવાનો છંટકાવ તજજ્ઞની સલાહ લઈ કરવો.

ફળ ઉતારવાં :

ચીકુના ઝાડ ઉપર લગભગ બારેમાસ વધતા ઓછા પ્રમાણમાં પુષ્પો અને ફળો જોવા મળે છે. સામાન્ય રીતે ઓક્ટોબર થી જાન્યુઆરી માસના ગાળા દરમિયાન વધુ ફળ મળે છે. ત્યારબાદ મે માસ સુધી ફળો મળતા રહે છે. ફળની છાલ લીલાને બદલે પીળાશ પડતી જણાય, ફળ ઉપર હાથ ઘસવાથી રેતી જેવો ઝીણો ભૂકો હાથમાં ચોટે અને ફળની ટોચ પરનો કાંટો સહેજ અડકતાં ખરી પડે ત્યારે ફળો ઉતારવા લાયક ગણાય છે. ઉતારેલ ફળોને કોથળામાં નાખી હલાવવા જેથી ફળ સ્વચ્છ અને ચળકાટ આપશે. કોથળામાં નાંખીને હલાવવાના વિકલ્પે ફળોને પાણીમાં ઘોઈ સૂકવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ કદ પ્રમાણે વર્ગીકરણ કરીને બજારમાં મોકલવામાં આવે છે.

ઉત્પાદન :

સામાન્ય રીતે પુખ્ત વય (૧૨ થી ૧૫ વર્ષ) ના ઝાડ પ્રતિવર્ષ ૧૨૦ થી ૧૫૦ કિ. ગ્રા. જેટલું ફળનું ઉત્પાદન આપે છે.

મુલ્યવૃદ્ધિ :

ફળોને ઉતાર્યા બાદ ૧૫૦ પી.પી.એમ. જીબ્રેલીક એસિડના દ્રાવણમાં ૮ થી ૧૦ મિનિટ બોળ્યા બાદ કાગળના બોક્ષમાં ભરવાથી તેની ટકાઉશક્તિ વધે છે. નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારી ખાતે થયેલ અભ્યાસ મુજબ ચીકુને ઉતાર્યા બાદ ૧% યુનાના દ્રાવણમાં ૫ મિનિટ સુધી ડૂબાડી સુકાયા બાદ પાણીમાં ધોવાથી ફળોના દેખાવમાં સુધારો થાય છે અને ટકાઉશક્તિ વધે છે. બીજા એક અભ્યાસ મુજબ ફળોને ઉતાર્યા બાદ ૧૦° સે. ગ્રે. તાપમાને ૮ કલાક સુધી પ્રિકુલીંગની માવજત આપીને ૫૦ માઈક્રોનની ૧.૨ ટકા કાણાવાળી બેગમાં ભરી સીએફબી બોક્સમાં મૂકી ૧૨°સે. ગ્રે. તાપમાને કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં રાખવાથી ફળોની ગુણવત્તાને અસર થયા વગર ૧૫ દિવસ સુધી સંગ્રહ કરી શકાય છે.

પપૈયાની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ

પ્રસ્તાવના :

ફળપાકોમાં પપૈયાનો પાક પાંચમાં નંબરનો અગત્યનો ટૂંકાગાળાનો રોકડીયો પાક છે. તેની વ્યાવસાયિક ખેતી વધુ પ્રચલિત છે અને એકમ દીઠ વધુ આર્થિક વળતર આપતો મહત્વનો પાક છે. પપૈયાના કાચા ફળોમાંથી મળતું પેપીન મુખ્યત્વે ઔષધો અને ઔદ્યોગિક બનાવટમાં વપરાય છે. ભારત સહિત દુનિયાના શ્રીલંકા, બર્મા, તાઈવાન, પેરુ, ફ્લોરીડા, ટેક્સાસ, કેલીફોર્નીયા, દ. આફ્રિકા અને કેન્યામાં પપૈયાની ખેતી થાય છે. ભારતમાં આંધ્ર પ્રદેશ, તામીલનાડુ, કર્ણાટક, બિહાર, ઝારખંડ, ઉત્તર પ્રદેશ અને ગુજરાત રાજ્યમાં પપૈયાની ખેતી થાય છે. ભારતમાં કુલ ફળપાકોના વિસ્તારમાં પપૈયાનો હિસ્સો ૫ ટકા છે. અત્યારે ગુજરાતમાં ૨૦,૩૧૦ હેક્ટર વિસ્તારમાં પપૈયાનું વાવેતર થાય છે અને ૬૧.૮૬ ટન/હેક્ટરની ઉત્પાદકતા સાથે કુલ ઉત્પાદન ૧૨,૫૬,૫૧૦ ટન છે.

હવામાન અને જમીન :

ફળદ્રુપ, સારા નિતારવાળી અને વધારે સેન્દ્રિય તત્વ ધરાવતી જમીનની જરૂરીયાત રહે છે. ગોરાડું, બેસર અને મધ્યમ કાળી જમીનમાં પપૈયા સારા થાય છે. પપૈયાને સુકું હવામાન માફક આવે છે. આ પાક વધુ પડતી ઠંડી તેમજ ખૂબ વરસાદ સહન કરી શકતો નથી. પપૈયાનો પાક ઉષ્ણ તેમજ સમશિતોષ્ણ કટિબંધના ગરમ અને ભેજવાળા હવામાનમાં સફળતા પૂર્વક ઉગાડી શકાય છે.

જાતો :

૧. રેડ લેડી-૭૮૬ : જે તાઈવાન રેડ નામથી જાણીતી છે. આ જાતમાં બધા છોડ ઉભયલીંગી હોવાથી બધાજ છોડમાં ઉત્પાદન મળે છે. ફળ મધ્યમ મોટા, માવો નારંગી લાલ રંગનો અને મીઠો હોય છે. આ જાતના છોડ વધુ પડતા ભેજ કે વરસાદ પ્રત્યે સંવેદનશીલ હોય છે. ઉત્પાદન શક્તિ સારી છે. ફળ લગભગ ૩૦-૪૫ સેમી ઉંચાઈએથી બેસવાના શરૂ થાય છે.

૨. મધુબિંદુ : ગુજરાતમાં વવાતી આ જાત બીજામાં નર છોડ નીકળવાનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે. છોડ મધ્યમ ઉંચાઈના અને ઉત્પાદન શક્તિ ઘણી સારી, ફળમાં બીજનું પ્રમાણ ઓછું, ફળનું ડીટું પણ લીલું અને ફળ જમીનની સપાટીથી ૩૦ થી ૪૫ સે. મી. ઉંચાઈથી બેસે. ફળ મીઠાં અને સ્વાદીષ્ટ હોય છે. હેક્ટરે ૩૦ થી ૩૫ ટન જેટલું ઉત્પાદન મળે છે.

૩. વોશિંગ્ટન : આ જાતના છોડ પ્રમાણમાં ઉંચા થાય છે. પાનની ઢાંડી જાંબુડીયા રંગની તેમજ પ્રકાંડ ઉપર જાંબુડીયા રંગની રીંગો હોય છે. જે આ જાતની વિશેષતા છે. ફળ ગોળથી લંબગોળ, મધ્યમ થી મોટા કદના, મીઠાશવાળા સ્વાદીષ્ટ હોય છે. ફળ લગભગ ૨ કિલો વજનનું થાય છે.

૪. પુસા ડેલિસિયસ : આ જાતમાં છોડ મજબૂત જુસ્સાદાર અને મધ્યમ ઉંચાઈના થાય છે. ઉત્પાદનમાં અને ગુણવત્તામાં ચઢિયાતી છે. આ જાતમાં માદા અને ઉભયલીંગી છોડ હોવાથી ઉત્પાદન શક્તિ ૧૦૦ ટકા ગણી શકાય. આ જાતમાં બીજનું પ્રમાણ ખૂબજ ઓછું હોય છે.

૫. સી. ઓ.-૨ : નીચાથી મધ્યમ ઉંચાઈની વધુ ઉત્પાદન આપતી આ જાતમાં નર છોડનું પ્રમાણ બીજી જાતોની સરખામણીમાં ઓછું છે. પેપીન ઉત્પાદન માટે આ જાત ખૂબજ અનુકૂળ છે.

૬. સી. ઓ.-૪ : સી. ઓ.-૧ અને વોશિંગ્ટન જાતના સંકરણથી તૈયાર કરેલ છે. ફળ મોટા, માવો દળદાર, પીળા રંગનો અને ફળ સ્વાદમાં મીઠાં હોય છે. ફળની ટકાઉ શક્તિ સારી છે.

આ ઉપરાંત સી. ઓ.-૫, ૬ અને ૭ જાતો પણ તામિલનાડુ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલ છે.

રોપણી :

રોપણી માટે ૨.૧ × ૨.૧ મીટરના અંતરે (૨૨૬૮ છોડ) ૩૦ × ૩૦ × ૩૦ સે. મી. ખાડા ઉનાળામાં તૈયાર કરી ૭ થી ૧૦ દિવસ ખુલ્લા રાખી તેમાંથી નીકળેલ માટી સાથે ૧૦ કિલો છાણિયું ખાતર ભેળવી ખાડા પૂરી દેવા. ઘનિષ્ઠ વાવેતર માટે ઓછા અંતરે ૨ × ૧.૮ મીટરે અથવા ૨.૪ × ૧.૫ મીટરે વાવેતર કરવાથી હેક્ટરે છોડની સંખ્યા વધારી શકાય. ૨૨ સે. મી. ઉંચાઈના વધુ તંતૂમૂળવાળા રોપ પસંદ કરવા. પપૈયાના ધરૂણી ફેર રોપણી જુલાઈ થી ઓગસ્ટ માસ દરમિયાન છોડ ત્રીકોલા આકારે સરખું અંતરે રાખી કરવી.

રોપતી વખતે ટોચના ૨-૩ પાન રહેવા દઈ બાકીના પાનનું ડીટું રહેવા દઈ કાતરથી કાપી નાંખવા જેથી છોડમાંથી ભેજ ઉડી જતો અટકાવી શકાય. આ પાકમાં જો ગાદી ક્યારા પર મલ્ટીંગ પ્લાસ્ટીકનો આવરણ તરીકે ઉપયોગ કરી વાવેતર કરવામાં આવે તો ખૂબજ સારા પરિણામ મળે છે. આ માટે ૨.૪×૧.૫ મીટરે વાવેતર કરવું. જેના માટે ૩ ફુટના ગાદી ક્યારા બનાવવા અને તેની ઉપર ૧.૨ મીટરનું પ્લાસ્ટીક મલ્ટી પાથરવું. જેમાં ૧.૫ મીટરના અંતરે ગોળ કાણાં પાડી તેમાં પપૈયાના છોડ રોપવા. મલ્ટીગનું આવરણ કરતા પહેલાં ડ્રીપ સીસ્ટમ ફીટ કરી લેવી જેથી પાણી આપવામાં સરળતા રહે. શરૂઆતમાં છોડને પોષણ આપવા માટે જૈવિક ખાતર (એજેટોબેક્ટર, ફોસ્ફેટ સોલ્યુબીલાઈઝીંગ બેક્ટેરીયા, પોટાશ મોબીલાઈઝીંગ બેક્ટેરીયા) નો ઉપયોગ કરવો. જેનું પ્રમાણ છોડ દીઠ ૧૦ ગ્રામ પ્રમાણે ઉપયોગ કરવાથી શરૂઆતમાં છોડને પોષણ મળી શકે.

ખાતર :

પપૈયાના પાકને છાણિયું તેમજ રાસાયણિક ખાતરો પૂરતા પ્રમાણમાં અને સમયસર નીચે દર્શાવેલ કોઠા મુજબ છોડ દીઠ આપવા.

ખાતર આપવાનો સમય	છાણિયું ખાતર (કિ.ગ્રા./છોડ)	તત્વના આપવાના ટકા (ગ્રામ/છોડ)			તત્વનો જથ્થો (ગ્રામ/છોડ)		
		નાઈટ્રોજન	ફોસ્ફરસ	પોટાશ	યુરિયા	એસ. એસ. પી.	મુરેટ ઓફ પોટાશ
રોપણી સમયે	૧૦	—	—	—	—	—	—
રોપણી બાદ બીજા માસે	—	૫૦	૫૦	૬૨.૫	૧૦૮	૩૧૩	૧૦૪

રોપણી બાદ ચોથા માસે	—	૫૦	૫૦	૬૨.૫	૧૦૮	૩૧૩	૧૦૪
રોપણી બાદ છ માસે	—	૫૦	૫૦	૬૨.૫	૧૦૮	૩૧૩	૧૦૪
રોપણી બાદ આઠમા માસે	—	૫૦	૫૦	૬૨.૫	૧૦૮	૩૧૩	૧૦૪
કુલ ખાતરનો જથ્થો	૧૦	૨૦૦	૨૦૦	૨૫૦	૪૩૨	૧૨૫૨	૪૧૬

ઉપરોક્ત જથ્થો તત્ત્વ રૂપમાં આપેલ છે એટલે કે સ્થાનિક ઉપલબ્ધ ખાતરો અને તેમાં રહેલ પોષક તત્ત્વોના સપ્રમાણમાં ખાતરો આપવા. ખાતરો થડથી ૧૫-૨૦ સે. મી. દુર અને ૧૫ સે. મી. ઉડાઈ સુધીમાં આપવા. ત્યારબાદ તુરંતજ પાણી આપવું. શક્ય તેટલા વધારે સેન્દ્રિય ખાતરો વાપરવા અને તે મુજબ રાસાયણિક ખાતરો ઘટાડવા. પપૈયાના પાકમાં સુક્ષ્મ તત્ત્વોની ઉણપ જોવા મળે છે. તેની પૂર્તિ માટે રોપણી બાદ ચોથા અને આઠમા માસે ૦.૫૦ ટકા ઝીંક સલ્ફેટ અને ૦.૧ ટકા બોરીક એસિડ નો છંટકાવ કરવો. (૧૦૦ લીટર પાણીમાં ૫૦૦ ગ્રામ ઝીંક સલ્ફેટ અને ૧૦૦ ગ્રામ બોરીક એસિડ).

પિયત :

સ્થાનિક હવામાન અને જમીનના પ્રકાર પ્રમાણે શિયાળામાં ૧૦ થી ૧૨ દિવસે અને ઉનાળામાં ૬-૮ દિવસે પાણી આપવું. પપૈયાના છોડને વધારે પડતું પાણી આપવું નહીં. પાણીની ખેંચને લીધે ફળ ખરી પડવાની શક્યતા રહે છે.

ટપક સિંચાઈ સાથે ખાતર વ્યવસ્થા (ફર્ટીગેશન) :

પપૈયાની મધુબિંદુ જાતમાં ભલામણ કરેલ નાઈટ્રોજન અને પોટાશ ખાતરના ૮૦% (૧૬૦-૨૦૦ ગ્રામ ના.પો./છોડ) ૧૨ સરખા હપ્તામાં ફેરરોપણી પછી ૪૫ દિવસે શરૂ કરી ૧૫ દિવસના ગાળે ટપક સિંચાઈ ધ્વારા આપવો. ખામણા દીઠ ૧૦ કિ. ગ્રા. છાણિયું ખાતર પાયામાં તેમજ છોડ દીઠ ૧૦૦ ગ્રામ ફોસ્ફરસ જમીનમાં બે હપ્તામાં ફેરરોપણી બાદ ૪૫ અને ૮૦ દિવસે આપવો. ટપક પદ્ધતિમાં પ્રતિ કલાક ૮ લીટરની ક્ષમતાવાળા ૨ ટ્રીપર થડની બંને બાજુ ૩૦ સે. મી. દુર ગોઠવી પદ્ધતિ એકાંતરે દિવસે ઓગસ્ટ થી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન (વરસાદના દિવસો સિવાય) ૫૦ મિનીટ, ઓક્ટોબરથી ફેબ્રુઆરી દરમિયાન ૭૦ મિનીટ અને માર્ચ પછી દર એકાંતરે દિવસે વરસાદની શરૂઆત સુધી ૨ કલાક મુજબ ચલાવવી.

પાછલી માવજત :

પાકને નીંદણ મુક્ત રાખવા માટે જરૂર પ્રમાણે આંતરખેડ, ગોડ અને નીંદામણ નિયમિત કરતા રહેવું. મુખ્ય થડ ખુલ્લું રહે તેવી રીતે માટી ચઢાવવી, જેથી પાણી સીધું થડના સંપર્કમાં ન આવે અને થડના કોહવારોનો રોગ આવવાની શક્યતા ઘટાડી શકાય.

આંતરપાક :

પાકની શરૂઆતની અવસ્થામાં બે હાર વચ્ચે અને બે છોડ વચ્ચેની જમીનમાં ટૂંકાગાળાના શાકભાજી, રીંગણ, મરચા, ટામેટા જેવા પાકો વાવીને વધારાની આવક મેળવી શકાય. જો મલ્ટીંગ સીટમાં પપૈયાનું વાવેતર કરવું હોય તો વધારાની આવક લેવા માટે જાન્યુઆરી માસમાં જમીનની તૈયારી કરી લેવી અને તેમાં તરબુચનું વાવેતર કરવું. આ ઉપરાંત પપૈયાના વાવેતર સાથે આંતરપાક આદુનો પાક લેવામાં આવે તો સારું વળતર મળે.

નર છોડ દૂર કરવા (મધુબિંદુ જેવી જાતો માટે) :

કુલ આવવાની શરૂઆત થયેથી વાડીમાં ૮-૧૦ ટકા નર છોડ રાખી બીજા નર છોડ કાઢી નાંખવા. વાડી ફરતે નર છોડ રાખવા પ્રયત્ન કરવો. જો ઉભયલીંગી પ્રકારની જાતના છોડ હશે તો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત નહીં થાય. (નર કુલ લાંબી દાંડી સાથે જ્યારે માદા કુલ થડની કક્ષામાં આવે છે.)

જીવાતો :

૧) ભીંગડાવાળી જીવાત અને ચીકટો (સ્કેલ અને મીલીબગ) : ઉપદ્રવ ફળ, થડ અને પાન ઉપર જોવા મળે. આ જીવાત ફળ તથા પાનમાંથી રસ ચૂસે છે જેથી ફળ કાળા રંગના થઈ જાય અને ફળની ગુણવત્તા ઘટે છે.

૨) એફીડ અને સફેદમાખી : પપૈયાની જીવાતોમાં મોલો (એફીડ) અને સફેદમાખી ખુબજ અગત્યની છે. આ બંને જીવાત અનુક્રમે પપૈયાનો પંચરંગિયો અને પપૈયાના પાનનો કોકડવા નામના વાયરસથી થતા રોગના વાહક તરીકે કામ કરે છે.

નિયંત્રણ : પપૈયાના પાકમાં આ જીવાતનું નિયંત્રણ ખુબજ મહત્વનું બની રહે છે. નિયંત્રણ માટે વાડીને નિંદામણથી મુક્ત રાખવી.

રોગ :

૧. થડ અને મૂળનો કોહવારો : આ રોગ જમીનજન્ય ફૂગથી થાય છે. ઘરૂવાડિયામાં પણ આ રોગ જોવા મળે છે તેથી તેને 'ઘરૂમૃત્યુ' નો રોગ પણ કહે છે. આ રોગ મધ્યમ તાપમાન તથા જમીનમાં ભેજનું પ્રમાણ વધુ હોય ત્યારે વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. આ રોગમાં પપૈયાના થડના જમીન પાસેના ભાગ પર પાણી પોચા કથ્થઈ રંગના ડાઘ પડે છે જે ધીમે ધીમે ઉપર તરફ વધતાં થડનો ભાગ પોચો પડી તેમાંથી પાણી ઝરે છે અને છેવટે થડ નબળું પડી છોડ ત્યાંથી ભાંગી પડે છે. રોગગ્રસ્ત ખેતરમાં રોગનો ફેલાવો કરવામાં પિયત અગત્યનો ભાગ ભજવે છે.

નિયંત્રણ : પપૈયાનો મૂળ અને થડનો કહોવારો ઘરૂવાડિયામાંથી પણ શરૂ થઈ શકતો હોય અને ભેજના વધુ પડતા પ્રમાણથી રોગની શક્યતા વધતી હોય ઘરૂવાડિયું બનાવવા હંમેશા સારા નિતારવાળી, ઉચી જગ્યાએ ગાદી ક્યારા બનાવવા જેથી પાણીનો નિતાર અને નિકાલ થઈ શકે. પપૈયાના ખેતરમાં પાણીનો ભરાવો થવા દેવો નહીં. આ માટે પપૈયાની ફેરરોપણી શક્ય હોય તેટલા ઉંચા પાળા પર કરવી.

૨. પપૈયા રીંગ સ્પોટ વાયરસ (પીઆરએસવી) રોગ : આ રોગની શરૂઆતમાં કુમળા પાન પીળા પડી અને નસ ઉપસેલી દેખાય છે. ઘાટા લીલા રંગની લાઈન અને ગોળ રીંગ પાનના દાંડી તથા થડ ઉપર જોવા મળે છે. ફળ ઉપર પણ ઘણી રીંગ તથા અંત્રજી 'C' આકારનું ચિન્હ દેખાય છે. છોડનો વિકાસ અને ફળો બેસવાનું ઓછું થાય છે. ફળની ગુણવત્તા બગડે છે. પાન નાના અને છોડનો વિકાસ

અટકી જાય છે. પાન ટોચ આગળથી બુટની દોરી જેવા થઈ જાય છે.

નિયંત્રણ : રોગવાળા છોડ ઉપાડીને નાશ કરવો. આ રોગ ફેલાતો અટકાવવા માટે શરૂઆતમાં જંતુનાશક દવા છંટકાવ કરી મોલોમશીનું નિયંત્રણ કરવું.

નોંધ : સામાન્ય રીતે જીવાતો નિયંત્રણ માટે વપરાતી દવાનો છંટકાવ તજજની સલાહ લઈ કરવો.

ફળ ઉતારવા :

ફેરરોપણી પછી ૯-૧૦ મહિના પછી પપૈયાના ફળ પાકવાની શરૂઆત થાય છે અને ફળો ઉપર નખ મારવાથી દૂધના બદલે પાણી જેવું પ્રવાહી નીકળે ત્યારે ફળ ઉતારવા માટે યોગ્ય ગણાય છે. ફળો ઉપર સહેજ પીળો પટો દેખાવાની શરૂઆત થાય ત્યારે ફળ ઉતારવા. તૈયાર થયેલ ફળોને હાથથી ઉતારવા અને પેકીંગ કરતી વખતે નાના-મોટા નુકશાનવાળા તેમજ રોગિષ્ટ ફળોનું અલગ-અલગ વર્ગીકરણ કરવું. ફળોના પેકિંગ માટે વાંસના ટોપલા, પ્લાસ્ટીક ક્રેટમાં નીચે પરાળ, કાગળ અને પપૈયાના પાન પાથરી તેના પર ચોકસ સંખ્યામાં ફળ ગોઠવી બજારમાં વેચાણ માટે મોકલવા. લાંબા અંતરે મોકલવા માટે દરેક પપૈયાના ફળને ન્યુઝ પેપરમાં વીટાળી ક્રેટમાં ગોઠવી વહન કરવાથી ફળને ખૂબ જ ઓછું નુકશાન થાય છે.

ઉત્પાદન :

ઉત્પાદનનો આધાર જાત, માવજત, જમીનનો પ્રકાર તેમજ પાણીનો પ્રકાર અને હવામાન ઉપર છે. સામાન્ય રીતે છોડ દીઠ ૪૦-૫૦ કિલો ફળ મળે છે.

મુલ્યવૃદ્ધિ :


કાચા ફળોમાંથી દુધ ભેગું કરી સુકવવામાં આવે છે તેને પેપીન કહે છે. જેનો ઉપયોગ આલ્કોહોલ અને સૌંદર્ય પ્રસાધનોના શુદ્ધીકરણ માટે તેમજ ચર્મ ઉદ્યોગમાં તથા માંસ માછલીને નરમ બનાવવા માટે થાય છે. જુદી જુદી બીમારીઓમાં ઔષધ તરીકે પણ ઉપયોગ થાય છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં પેપીનની ખુબજ માંગ છે.

પેપીન તરીકે દુધ કાઢી લીધા બાદ ફળોનો ઉપયોગ ટુટી ફ્રૂટી, અથાણાં અને ચીપ્સ બનાવવા તથા શાકભાજી તરીકે થાય છે. પાકા ફળોનો ઉપયોગ જામ, જેલી, ટોફી, બાર, સ્કવોશ પીણા અને પાવડર બનાવવા થાય છે.

મુદદા નં ૨૪. કેન્દ્ર ખાતેના પાકની સેન્દ્રિય ખેતી પદ્ધતિ :

- નીલ

મુદદા નં ૨૫. ફાર્મની નકશા :



મુદદા નં ૨૬. ફાર્મની પાકનું પૃથ્થકરણ રેકૉર્ડ:

Sr. No.	Properties	Units
I.	Physical Properties :	
1.	Soil type	Clay loam
2.	Clay content	36%
3.	Bulk density	1.2 g/cc
4.	Moisture holding capacity	60.55%
5.	Moisture at field capacity	33%
6.	Moisture at wilting	15%
II.	Chemical Properties :	
7.	pH (1:2.5)	6.80
8.	EC (1:2.5)	0.13 dS/m
9.	Organic carbon	0.34%
10.	Available N	261.3 kg/ha
11.	Available P ₂ O ₅	59.43 kg/ha
12.	Available K ₂ O	279.0 kg/ha



સહ સંશોધન વૈજ્ઞાનિક (ફળ)
ફળ સંશોધન કેન્દ્ર,
ન. કૃ. ય., ગણદેવી



એનેક્સર-બી (B)

(સામાન્ય વહીવટ વિભાગના તા.૦૧.૦૫.૨૦૦૯ ના પરિપત્ર ક્રમાંજ: પીએડી-૧૦-૨૦૦૭-૩૩૫૩૬૪-
આરટીઆઇસેલનું બિડાણ)

પ્રમાણપત્ર

આથી પ્રમાણિત કરવામાં આવે છે કે માનનીય સાહેબશ્રી, વડી કચેરી (પ્રોપર) તથા માનનીય સાહેબશ્રી, વહિવટી કાર્યક્ષેત્રનાં આ સાથેની યાદી મુજબનાં જાહેર સત્તામંડળો દ્વારા માહિતી અધિકાર અધિનિયમની કલમ-૪ અંતર્ગત સ્વયં જાહેર કરવાની બાબતો " પ્રોએક્ટીવ ડિસ્ક્લોઝર " (P.A.D.) તૈયાર કરવામાં આવી છે. તા. ૧/૫/૨૦૨૬ની સ્થિતિએ તે સહ સંશોધન વૈજ્ઞાનિકશ્રી (ફળ), ફળ સંશોધન કેન્દ્ર, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, ગણદેવી દ્વારા અદ્યતન કરવામાં આવેલ છે. જેનું અમારા દ્વારા માહે : મે/જુન ૨૦૨૬(વર્ષ) દરમિયાન ઈન્સપેક્શન -કમ - ઓડિટ કરવામાં આવ્યું છે અને જે બાબતે ક્ષતિ જણાઈ હતી અગર અપુરતી વિગતો જણાઈ હતી તેની પુર્તતા કરવામાં આવી છે.

(૨) તા. ૩૦/૬/૨૦૨૬(વર્ષ) ની સ્થિતિએ હવે કોઈ જાહેર સત્તામંડળનાં (પ્રોએક્ટીવ ડિસ્ક્લોઝર) ઈન્સપેક્શન -કમ - ઓડિટ બાકી રહેલ નથી.

તારીખ : ૨૬/૦૫/૨૦૨૬
મુખ્ય મથક: નવસારી

સંશોધન નિયામક અને
અનુસ્નાતક વિદ્યાશાખાધ્યક્ષ,
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી,
નવસારી.